

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.




Primae Decadis Supplementum III.

LIPSIAE MDCCLXVIII.

APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud
Briasson, Patauii apud I. Manfré, Holmiae apud L. Saluium.



I.

Opere postume del Conte GIUSEPPE GINNANNI Ravennate. Tomo secondo, nel quale si contengono testacei marittimi paludosi e terrestri dell' Adriatico e del territorio di Ravenna da lui osservati e descritti. In Venezia, appresso Guglielmi Zerletti, 1757. fol. pl. 18. tab. aen. 38.

i. e.

Opera posthuma Comitis IOSEPHI GINNANNI, Tom. II, quo testacea marina paludosa et terrestria maris Adriatici et territorii Rauennensis ab eo obseruata et descripta comprehenduntur.

Cum de primo volumine operum horum, quae post mortem Ill. Auctoris publicata sunt, iam alio loco a nobis expositum sit *), supereft, vt de altero volumine agamus, quo testacea maris Adriatici et territorii Rauennatensis describuntur. Praemissum vero est huic volumini elogium Ill. Auctoris, a secretario societatis litterariae Rauennatensis

Bb 2

tenfis

p. I.

*) Comment. hor. Vol. V. p. 109.

tenfis conscriptum, eiusdemque societatis actis insertum, de quo ad lectores referre, vix operae pretium erit, cum praecipua momenta vitae Ill. Auctoris iam eo loco enarrata a nobis sint, quo de priore operum horum volumine egimus, cui scilicet vita Cel. GINANNI praenissa est. Omnia ver-

testacea tam marina, quam terrestria, quae Cel. Auctor ex mari Adriatico et territorio Rauennaten colligere potuit, ita in hoc libro disposita sunt, v-

- p. 1. prima classis comprehendat testacea univaluia marina, in 20 ordines disposita, qui 113 species
- p. 21. varietates comprehendunt. Secunda classis bivaluium 20 ordines et 58 species continet, vti terti-
- p. 38. quam multivaluia componunt, 4 ordinibus et 1
- p. 45. speciebus constat. Sequuntur testacea, quae in paludibus et stagnis viuunt, univaluium 6 ordines
- p. 54. 29 species, atque bivaluium 7 species, tandemque testaceorum terrestrium vnica classis, quam 5 ordines 30 species efficiunt, ita vt in vniuerso hocce opere circa 250 diuersae species aut varietates, additis synonymis, ex ALDROVANDO et BONANI sumt descriptae satisque accurate depictae sint. Attamen non nuda descriptio corporum naturalium traditur, sed hinc inde quoque variae observationes satis curiosae insertae, operis huius praestantiam augent. Ita enim v. c. docet, nonnulla ex corporibus, a Cl. BIANCHI descriptis, non conchas esse sed nodos variarum plantarum in aqua crescentium
- p. 16. inprimis *equiseti foetidi sub aqua repentis*, atque alium in loco ventriculum animalis noui, vt videtur, qui sanguisugam marinam dicit, mira sollertia describit. Modus quoque, quo variae conchae alia minora testacea et insecta capiunt et iis vescuntur, dum v-
- p. 25. cum respiratione ea attrahunt, et experimenta, habere ab Ill. Auctore facta, accurate explicantur. coitu quoque et generatione buccinorum, quae

acubus viuunt, Noster exponit, vt alias obserua- p. 47.
 tiones, hinc inde interspersas, quae leuioris momenti
 sunt, taceamus. Adnexae tandem sunt tres aliae obser- p. 61.
 uationes, Ill. MAFFEI dedicatae, quarum prima ad
 quandam locustae speciem eiusque generationem,
 altera quoque ad insecti alicuius historiam, vltima
 vero ad vermes, a cane excretos, pertinet, quorum
 multi minores vnum longiorem, catenae quasi in
 speciem inter se vniti, formabant, atque ab aliis spe-
 ciebus vermium a Cl. Auctore diuersi deprehensi
 sunt.

II.

CAROLI LE ROI, e Regia Scient. Societ.
 Monspeliensi, de aquarum mineralium na-
 tura et vsu propositiones, praelectionibus
 academicis accommodatae. Monspeli, ap.
 August. Francisc. Rochard, 1758. 8. pl. 6½.

Quum paruus hicce libellus paulo tardius ad no-
 stras peruenerit manus, multa tamen eruditione
 et cognitione chemica elaboratus sit; merito sibi
 locum in nostris *Supplementis* vindicat. Per apho-
 rismos compositus est, qui ad numerum centum et
 septuaginta nouem ascendunt, et ita comparati sunt,
 vt medico chemico et clinico satisfaciant. Propo-
 sitiones, quae ibi leguntur, breuiter sunt enuncia-
 tae, et aquarum mineralium scrutatori scitu neces-
 sariae atque vtilis. Hinc optandum, vt nostratium
 quidam bibliopola hunc libellum recudendum cura-
 ret, et in nostris oris redderet notiozem. Recte
 monet Cl. LE ROI in prooemio, eos, qui medici-
 nae clinicae operam darent, in praescribendis aquis
 mineralibus incertos diu fluctuare atque ancipites,

nisi perfectam, et vniuersaliorem quidem, cognitionem notissimarum aquarum mineralium, praesertim indigenarum, haberent. Propterea, vti ex eodem prooemio cognouimus, summus Archiatrorum regis Galliae comes id sibi muneris imposuit, vt aquarum mineralium doctrinae corpus, vt vulgo dicitur, conderet: et Cl. VENEL, medico in chemicis exercitato, et Cl. BAYEN pharmacopaeo chemiae peritissimo, aquarum mineralium totius Galliae analysin, auctoritate regia, commisit; sibi autem praestaticam operis partem sumsit.

In quatuor sectiones libellus diuisus est. *Prior* inscribitur: aquarum mineralium definitio ac distributio: *secunda*, de aquis mineralibus salinis: *tertia*, de aquis martialibus: *quarta*, de aquis mineralibus sulphureis. Quum praeterea libellus, vti iam diximus, ex aphorismis constat, breuem conspectum exhibere nequimus: hinc praecipuas Cl. Auctoris sententias cum lectoribus communicabimus. **P. 1.** Secundum praemissam definitionem, aquae minerales Cl. Auctori dicuntur eae aquae, quae principiis impraegnatae sunt mineralibus, eo quidem gradu, vt effectus sensibiles ab aquae communis effectibus diuersos in humano corpore exserere valeant. Diuiduntur autem in frigidas et calidas seu thermales. Porro sunt vel sulphureae, quae sulphure; vel martiales, quae marte; vel salsae, quae tantum salibus abundant. Dantur denique aliae, quae de sulphure, sale et ferro simul participant.

De salinis incipiens, hae Cl. Auctori vocantur, quae salibus praegnantibus nec ferrum continent, nec sulphur. **P. 3.** Interim tamen sequentia elementa ex iis interdum quoque eruuntur: 1) scilicet spiritus, vt aiunt, elasticus: 2) sal marinus: 3) sal Ebshammensis: 4) sal alcali mineralis: 5) terra absorbens: 6) terra selenitica: 7) sal marinus, basi terrea, crystallatio-

lificationem refugiens: 8) oleum quoddam minerale, seu bitumen; 9) in quibusdam, sed raris admodum, alumen.

Aquae minerales, quae spiritu elastico dotatae sunt, omnes sunt frigidae. Spiritus elasticus aeri per omnia est similis, particulis tamen, nares ferientibus, diues videtur. Quae autem harum particularum sit natura, definiri non potest. Aqua communis pariter gaudet aere contento ac aquae minerales, sed hic leui de causa mox auolat, si aquae modo aeri libero exponuntur; ille autem multo difficilius, nec nisi ope antliae pneumaticae, aut caloris efficacis separatur. P. 4.

Per experientias scimus, acida aquis mineralibus affusa, efferuescentiam ciere, cuius causam Cel. quondam HOFFMANNUS in alcali volatili, facile aufugiente; alii in conflictu acidi cum terra absorbente, qua fere omnes aquae minerales abundant, quaerebant: sed Cl. Auctor ab aere, qui acidorum affusione, a sua cum aquis coniunctione liberatur, recte deriuat. Hinc huic spiritui acido, quo aquae minerales turgent, multum tribui debere virtutis, Cl. Auctor iudicat. p. 6.

Alterum elementum, quod aquae mineralis compositionem ingreditur, est sal marinus. Hic sapore et crystallis cubicis, quas sistit, cognoscitur. *Tertium* est sal *Ebshammensis*, qui pariter in multis aquis mineralibus reperitur, et salis neutrius species est, ex acido vitriolico et basi alcalica salis marini constans. Salem *Ebshammensem* Cl. Auctor sine dubio vocat, quod ei sal neutri, qui ex fonte *Ebsham*, iis *Epsom* dicto, in Anglia paratur, perfecte similis est. Quum vero scimus salem *Ebshammensem*, qui apud nos venditur et in nostris officinis prodest, non esse salem naturalem, sed imitatum, et ex acido vitriolico et parte alcalina salis marini

compositum, ab hac melius abstineremus denominatione, eumque magis vel falem neutrum amarum, vel cum plurimis nouissimis systematum conditoribus, *Natrum*, appellaremus. Cum hoc salis genere perfectam quoque, vt chemici norunt, similitudinem habet sal mirabilis GLAUBERI, qui ex iisdem partibus constat; hinc nonnulli aquarum mineralium scriptores falem hunc fontium medicatorum sali mirabili GLAUBERI similem dixerunt, quam denominationem non magis probamus, praesertim

p. 8. quum Cl. Auctor dicat: falem *Ebshammensem* ad salis mirabilis GLAUBERI naturam permultum quidem accedere, sed ab hoc in eo discrepare, quod aeri expositus deliquescat, id quod nosmetipsi, qui huiusmodi falem saepe ex fontibus mineralibus parauimus, quidem obseruauimus, sed statim mutauimus atque correximus, si tantummodo prius acceptas crysallos a residua et pertinaciter adhaerente parte terrea salis marini diligenter abluimus, quod reiterata, vt vocant, crysallisatione obtinetur *).

Hoc etiam iam sensisse visus est Cl. Auctor, dum dubitanter (§. 38) scribat: *an propter pertinacem partis terreae salis marini admixtionem aeri expositum deliquescat?*

Quartum elementum aquae mineralis praebet sal alcali mineralis, seu basis alcalica salis marini quae a basi terrea probe distinguenda est. Hoc salis genus, secundum Cl. Auctorem, qualitatibus praecipuis salis tartari naturam aemulatur; ab hoc tamen in eo differt, quod crysallisationem non recusat.

*) Alii alio artificio, quo scilicet partem terream salis marini alterant, vtuntur, quod tamen curiose ce-
lant, dum nempe solutioni sales, seu lixiuio, alumi-
nis solutionem ad saturationem, vt aiunt, admiscunt
et maiores crysallos, sali mirabili GLAUBERI simi-
les acquirunt, cuius rationem periti intelligent.

eruet, nec aeri expositum, deliquescat; quodque
 alias cum acidis iunctum figuras crystallorum exhi-
 beat. Detegitur autem in aquis mineralibus sapore
 fixiuoso, et efferuescentia cum acidis: caueamus
 tamen, ne a visa efferuescentia statim ad salis alcalici
 mineralis praesentiam concludamus, quia illa etiam
 a contento spiritu elastico, vt supra vidimus, et a
 terra absorbente, sali neutri iuncta, oriri potest:
 ad quem errorem euitandum Cl. Auctor nonnulla P. 9.
 adminicula subministrat. Postea asserit in illo fonte,
 qui alcali minerale vehit, frustra quaeri salem neu-
 trum deliquescentem, et vice versa: quae tamen
 assertio, quia nimis generalis est, pluribus, vti nos
 quidem opinamur, adhuc experiētiis egere vide-
 tur, antea, quam aliquid vniuersale in hac re defi-
 niamus. Transit ad horum salium virtutes, quas in
 soluendo, stimulando et abstergendo ponit.

Quintum et sextum elementum fontium medica- P. 10.
 torum constituunt terra absorbens et selenitica,
 quae ambae naturam terrae seruant, vbi semel co-
 ctione concreuerunt: denuo enim solui in aqua
 simplici nequeunt. Interim terra absorbens cum
 acidis ebullit, et in salem neutrum abit: selenitica
 autem ab acidis solui renuit. Praeterea eas quoque
 distinguit crystallorum, si ita nominare licet, figura,
 quam post coctionem exhibent. Terra enim absor-
 bens in lamellas, selenitica autem in aciculas tenues
 lenta euaporatione coit, illa etiam prius, et haec
 posterius. Quod ad vires harum terrarum in cor-
 pus humanum attinet, si absorbentium vim, acidum
 in primis viis corrigendi, excipias, eas nos plane ad-
 huc ignorare Cl. Auctor fatetur.

Septimum elementum, quod sibi examinandum
 sumit, est sal marinus basi terrea, qui ex acido salis
 marini et terra absorbente, in salem neutrum vni-
 tis, oritur, et peculiare salis genus constituit, quod,

crystallisationem, vt vocant, refugiens, non nisi magno calore ficcum redditur; aeri autem libero per breue tantum tempus expositum, statim rursus liquefcit. A chemicis oleum calcis, ab Anglis *Bittern* *), a nostratibus autem *Mutterlauge* dicitur et in omnibus salinarum officinis, vbi sal coquitur sub finem cocturae obtinetur, salique cocto ita pertinaciter adhaeret, vt etiam caussam contineat, cui sal coctus semper vñus reperiatur, et in aere humido facillime liquefcit. Saepius cum alcali minerali confunditur, a quo tamen differt, vt statim in aere libero deliquefcit, illud autem ficcum maneat. Virtutes huius salis priorum salium virtuti aequiparant.

Octauum elementum, quod quidam fontes medicati vehunt, est bitumen, seu oleum minerale, salibus solutum, quod sapore se prodit, et, affuso spiritu vini, superficiem petere dicitur. *Nonum* et vltimum elementum sistunt fontes alumine praegnantest, qui vero rarissimi sunt, vt Cl. Auctor ipse monet. Hoc salis genus detegitur sapore suo stiptico, et additione olei tartari per deliquium, quo terra aluminosa deiicitur. Cl. Auctor huiusmodi aquam se reperisse dicit prope Neapolim, vbi etiam, externe tantum, in morbis cutaneis adhibetur.

P. 13. Vt autem propositiones suas praemissas exemplis probet, aquas nunc duas minerales salinas Galliae, *Bellilucanas* nempe et *Borboniacas* ad examen reuocat, earumque partes componentes per reagentia, vt vocant, determinat. Reagentia vero illi dicuntur materiae, siue fluidae, siue solidae, quae aquis admixtae praecipitationem operantur, aut efferuescentiam, aut coloris mutationem ipsae patiuntur, aut aquae inferunt. De virtute et vsu aquarum mineralium quaedam monet, et catharticas robustis; non catharti-

*) In Commentar. nostr. Supplement. I. p. 14.

charticas, martiales tenues et sulphureas, delicatulis, hypochondriacis et melancholicis commendat. Nunc morbos quoque memorat, quibus hae vel p. 26, illae aquae magis conducunt, aut nocent. Denique rationes et methodum adducit, secundum quam aquis mineralibus tam interne, quam externe utendum sit, qua occasione nonnullas, non contemnendas, cautelas adiicit.

Aquas salinas excipiunt martiales. Huc refert Cl. Auctor non solum aquas, quae ferro prae-gnantes sunt, sed et eas, quae aliis elementis gaudent, nomen tamen a ferro, quod vehunt, mutuuntur. Ad ferrum in aquis mineralibus detegendum solum nucem gallam laudat, asseritque, quod, si aqua mineralis, hoc tentata experimento, nullum ferri vestigium praebeat, eam pro martiali non esse habendam, licet etiam diligenti quidem, magis tamen curioso, quam utili examine ferrei elementi atomi in ea possint demonstrari. Praeter ea duas dari fontium martialium species perhibet Cl. Auctor, ab invicem multum discrepantes: in aliis nempe ferrum sub forma vitrioli martis inveniri non tantum, sed et manere semper dissolutum, ut etiam saporem tramentosum post annum retinuerint eiusmodi fontes: in aliis autem ita teneram esse illam solutionem ferri, ut ferrum leuissimo liberi aeris vel caloris accessu brevi praecipitetur. Huc refert aquas *Spadanas*, *Parmontanas*, *Passiacas* etc. Quum in priori specie verum vitriolum ferri detexerint aquarum scrutatores, etiam hoc de altera specie affirmant, quod tamen ei abnegat Cl. Auctor, quicquid etiam de acido quodam vitriolico-volatili praedicaverint iidem scriptores. Id vero, quod in auras abit, dum aquae martiales, spiritu aereo diuites, libero aeri exponuntur, cum iis comparat particulis, quae in salium contrariorum mixtione cum efferuescentia

scientia attolluntur, quarum naturam chemici adhuc ignorant. Interim quod ad modum solutionis ferrum in aquis mineralibus, eiusque in eis disiunctionem attinet, ei explicationi assentitur Cl. Auctor, quae mediante aere, qui vinculi vices gerit, id fieri probat. At non tantum ferrum continere aquas martiales, sed et de sale marino, sale *Ebshammensi*, sale marino basi terrea, terra absorbente, selenite plumbinusue saepius participare, exemplo *Passiacarum* demonstrat. Hinc quum de martialium aquarum viribus atque usu differit, praeter virtutes, quae cum salinis communes habent, praesertim earum virtutem stimulantem ac roborantem, quam a ferro mutuuntur, extollit, et in omnibus morbis, qui fibra laxa et debili ortum habent, praesertim in deprauiato viscerum abdominalium tono, quo plerumque hypochondriaci laborant, commendat: addit prudenti hac cautione; quo homo magis delicatulus sit, quo facilius, ut aiunt, irritabilis, quo pectus minus firmum habeat; eo leuiiores aquas martiales esse seligendas. **p. 38.** Superfunt quaedam de aquis mineralibus sulphureis. Sulphureae dicuntur, quae sulphure, vel vapore quodam sulphureo tenuissimo dotatae sunt. Duplici ratione se manifestant, vel colore, quo argentum inficiunt, vel odore, solutioni hepatis sulphuris simili. Cognoscuntur praesertim, dum eiusmodi aquae argentum, in aqua fortissolutum, vel salem saturni nigro colore praecipitant. Praeter sulphur etiam sales et terras plumbinusue continent, ita ut etiam earum virtutes inde aestimandae sint. An sulphureae quaedam aquae existant, quae simul sint aereae, seu elasticae? quaerit Cl. Auctor. Tales frigidas reperiri scimus, sed de calidis, seu thermis dubitamus, licet Cl. Auctor aquas *cauterets* et *calidas* ex Cl. BORDEU litteris editis huc referat. Sulphur in quibusdam fontibus

in moles sensibiles concrefcit; in aliis in flores sublimatum conspicitur, vti *Aquisgrani*; in aliis superficiem aquarum tantum cuticula tegit. Interim artificium, quo sulphur ex aquis sistatur, chemicis adhuc latet. Ad sulphur tamen in quibusdam aquis P. 40. detegendum et demonstrandum multum iuuare credit Cl. Auſtor, obſervationem a Cl. SPRINGSFIELD in *itinere medico ad thermas Aquisgranenses* *) communicatam, quae eo redit, vt parietes canaliculorum, qui aquas *Aquisgranenses* vehunt, sulphuris accretionem respuant, nisi terreo concremento, quod aqua ipsa praebet, prius tecti sint. Modum vero, quo aquae sulphure dotentur, partim ex Cl. LEMERY notissimo experimento, quo limaturam ferri et sulphur miscuit: partim ex modo dicti Cl. SPRINGSFIELD **) experimento cum oleo terebinthinae et vitriolo ferri aequali portione mixtis, instituto, explicari posse arbitratur. Ad caloris igitur procreationem et communicationem sulphuris cum aquis plurimum conferre pyritas martiales et lithanthraces, qui oleo minerali et acido vitriolico abundant, plus quam probabile Cl. Auſtori videtur.

Tandem ad virtutes, quas in vrina mouenda, in incitanda sanguinis circulatione, in augenda perspiratione et acuendo appetitu ponit, Cl. Auſtor procedit et ad vsum tam internum, quam externum aquarum sulphurearum transit, simulque nonnullos morbos commemorat, quibus subleuandis eas salutares censet. Inter eos praesertim nominat ventriculi et intestinorum affectus frigidos, icterum, mensium atque haemorrhoidum vitia, fluorem album, chlorosin, pectoris et pulmonum morbos, in quibus ne asthma tuberculosa quidem, nec phthisis pulmo-

*) pag. 22.

**) ibidem pag. 49.

pulmonalem excipit. In plurimis recensitis morbis internum vsum multum adiuuari ab externo, balneis nempe temperatis, adhuc monet. Balnea autem imprimis vtilia reperit in vlcerum calloforum, fistulorum et inueteratorum sanatione, si debita ratione adhibeantur, depuratio, iniectiones, stillicidia in vsum trahantur, et vsus internus, si opus, adiungatur.

III.

Differt. inaugural. medica, sistens nouae methodi surdos reddendi audientes physicas et medicas rationes, quam Praeside D. ANDREAE ELIA BÜCHNERO etc. defendet Auctor IOANNES IORISSEN, Vefalia-Cliuensis. Halae-Magdeburg. 4. 1757. pl. 7².

Ad scriptum hoc academicum euulgandum praebuit Cl. Auctori opportunitatem triste parentis sui exemplum, sensu auditus prorsus priuati, et, methodo forte fortuna detecta, denuo iterum praediti. Cuius morbi historiam Noster primum recenset, et singula phaenomena, eam notatu dignam reddentia, paullo post explicare studet. Relationis vero summa haec est. Pater Cl. Auctoris anno aetatis suae vigesimo, in auditus sensu leuem aliquam primum percepit molestiam, cuius caussam, quantum ipsi recordari licuit, vel magnae narium haemorrhagiae, vel grauiori cuidam ex alto lapsui adscripsit. Non solum vero optima quaeuis medicamina malum hoc respuit, verum potius successiue magis magisque exacerbatum fuit, ita, vt aegrotus non nisi proxime ad aures exclamata verba intelligere potuerit, illeque inde coactus fuerit, celeberrimorum Germaniae
et

et Bataviae medicorum consilia implorare. - Sed
 ne spe, multo minus auxilio quodam, subleuatus ex-
 citatusque fuit. Et quamuis varia adminicula ten-
 tauerit, et praecipue tubis sic dictis acusticis, qui-
 bus et sibi et adstantibus suis aliquod emolumentum
 atque subsidii producere putauit, usus sit, tamen
 et hos non sufficientes inuenit. Contigit tandem
 inopinato et satis curioso euentu, ut ipse aeger,
 dum filiam filiumque fides manu pulsantes (*Clavier
 spielen*) videret, suasu iussuque musices magistri,
 tenuem bacillum prehendat, vnum eius finem den-
 tibus superioribus atctissime admoueat, alterum ve-
 ro versus trabeculam contignationis resonantis ad-
 aplicet, et ita sonos musicos exquisita quadam distin-
 ctione percipere potuerit. Sed nullam adhuc arti-
 culatam vocem ipsi distinguere fuit concessum; do-
 nec tandem alio experimento cum tuba stentoria
 instituto, cuius vni orificio ipse aeger dentes supe-
 riores admouit, alterum vero, quod latius est, ut
 in dentibus aplicet, et verba quaedam loquatur,
 patrem rogauit, et ita cuncta distincte percepit ae-
 ger. Idem illud cum instrumento fumiductorio
 eadem ratione tentauit, et exoptato euentu nun-
 quam fuit destitutus. Ex recensita hac morbi histo-
 ria varia nunc explicare, et praecipue surdidatis in-
 tolem exponere Noster suscipit. Quam vel in ipso p. 15.
 organo auditus, vel in nexu eius cum sensorio com-
 muni, quaerendam esse putat. Partes dein, organon
 hoc constituentes, anatomice recensere tentat, et
 quomodo ex harum laesione, vario modo induc-
 ta, varii quoque surditatis gradus produci possint, dis-
 quirat. Eam enim pro diuerso vitio ipsi applicato, p. 17.
 vel in surdidatem plenariam, vel in auditum gra-
 uem, vel in susurrum s. tinnitum aurium dispescit.
 Neatus auditorii morbos primum contemplatur, et,
 quomodo ille partim per membranam praeternatu-
 ralem

ralem obtegi, partim a nimia ceruminis copia impleri, partim in praeternaturali statu cavitatem vel nimis amplam vel nimis exiguam accipere, partim quoque a rebus heterogeneis male adfici possit, docet. Membranam tympani aut nimis relaxari, aut nimis adstringi, aut prorsus rumpi, et inde ex varia hac laesione vario modo auditus sensum laedi, Cl. Auctor docet. Ipsius vero tympani cavitatem atque labyrinthum propter osseam eorum substantiam non quidem multum ad auditus morbum conferre putat, interim tamen dolorem istum, omnium ferendissimum, otalgiam nempe, perioestio, quo dictae hae partes circumcinguntur, male adfecto, adscribit.

p. 23. Neruo acustico laeso, auditus quoque sensum facile aboleri recte Noster docet, quamvis ipsum neruum vix ab interna causa, fluido scilicet nerueo spissius reddito et canalem obstruente, sed ab externa tantum pressione laedi posse statuatur. Tubam Eustachianam tandem duplici ratione vitari, et ea, aut obstructa aut erosa, surditatem producere posse recenset. Postquam itaque varias illas causas, sensum auditus adficientes, exposuit, ad ipsius parentis exemplum progreditur, et quatenam huius fuerunt causae, et detecti remedii natura et indoles, disquiri.

p. 26. Non vero haereditarium malum adfuisse, ex organo huius habitu usque ad vigesimum annum sano vegetoque concludit, sed potius largam narium haemorrhagiam, et lapsum ex alto praegressum, ut causas mali huius occasionales assumit Noster. In remedii tandem natura et indole explicanda, eo praecipue Cl. Auctor respicit, ut ex physicis disciplinis demonstret, cur vox articulata a parente suo tandem percipi potuerit, quando corpus durum etque elasticum, neququam vero molle, pro adminiculo, malum hoc levando, fuerit adhibitum. Haec vero rem ita exponit, ut ad omnem percipiendum sonum

onum, necessario opus esse medio quodam, minias aeris particulas trementes, versus aurem proellendi, iudicet. Et medium illud esse aerem, unquam corpus elasticum, cui vero quodliet aliud elasticitate praeditum posse substitui, ex doctrinis musicae et praecipue machinarum, sonos musicos efficientium exemplo comprobatur. Quod P. 36.
 vero sonus non solum per auditus organon propagari atque percipi, verum etiam per alia corpora, elasticitate quadam praedita, produci possit, ex partum praecipue duritiae et apto ad suscipiendos motus aeris tremulos situ declarat. Et cum dentes alia sint corpora, machinae nostrae durissima, solum ope tubuli cuiusdam non solum facile suscipi-entia, verum etiam curiosissima ratione tandem cum ipso auditus organo aliquam connexionem habentia, et inde sonum versus hanc partem propagantia, eos quoque ut media, sordiditatem subleuant, Noster considerat. Quoniam vero inferioris P. 39.
 maxillae dentes nulla cum osse temporum continuitate gaudent, tubulo quoque iis adplicato, nullum soni sensationem oriri posse demonstrat. Quia nam tandem sint requisita medii illius, solum in auditus organo producentis, porro perpendicularis, et parentis sui exemplo comprobatur, illud de-esse esse in omnibus suis partibus continuum, elasticum, et determinata quadam densitate praeditum, tremor aeris iusto sufficiens imprimi et per illud versus dentes propagari possit. Metalla minus apta P. 45.
 hoc adminiculo iudicat, quoniam nimia horum densitas, rigiditas et fragilitas iusto maiorem requirit aeris tremantis vim quae, dum longe validius continuatur, nimis quoque validam dentibus adplicandi actionem, et hinc distinctionem necessariam praestat. Assertum medicorum quorundam et physicorum, ipsum sonum per tubam Eustachianam
Supplement. III. Cc distin-

distinctius posse percipi, aperto ore non assumit. Noster, nisi levis quaedam auris structurae laesio adsit, cum in grauiori organi huius vitio tale adnuncium frustra expectetur. Quae vero phaenomena in exemplo parentis sui obseruata adhuc restant, ea ita Cl. Auctor explicat, ut semper ad corpus quoddam molle, digitos e. g. vel labia intermedia, aut saltem ita adplicata, ut omnem tremoris quantitatem recipere possint, et sonum intercipient, porro quoque ad tubulum, dentibus tantum admotum, respiciat. Duo tandem adhuc argumenta monet, primum, quod in artificiali hac audiendi methodo necessario requirantur dentes maxillae superioris firmi, nec vacillantes, quoniam ad propagandum sonum continuas partium requiratur, qua vacillantes destituuntur dentes. Alterum est, quod ostendat, sonum tali ratione impressum, non in aure, sed in ipsius cerebri postica parte iuxta medullam oblongatam percipi eam ob causam, quoniam acusticus neruus ex medullae oblongatae basi et quidem superiori parte oritur, ibique spirituum animalium impressionem in cerebrum et animum fieri oportet. Qui vero locus ab iis tantum accurate possit distingui, quibus nocturna consuetudo, sed minus consueta quaedam sensatio contigit.



IV.

De ratione audiendi per dentes. Programma.

Auctore IO. HENRICO WINCKLERO,
Ordinis Philosophici h. t. Procancellario.
Lipsiae, 1759. 4. pl. 1.

Ob argumenti similitudinem huius quoque scripti mentionem facere, non inutile putamus, praecipue cum in eo Cl. Auctor non solum rationem, qua sonus per dentes ad aurem propagatur, egregie ex physicis illustret, verum quoque ad osum paullo ante a nobis commemoratum exemplum IORISSENI prouocet illudque adducat. Quo itaque comprobet, dentes, et ad percipiendum sonum, et ad intelligendas voces atque sermones, esse idoneos, experimentum describit, cum horologio viatorio instituendum. Illud in baculo, ex ligno liaceo confecto, quadrangulo, quinque lineas lato, et septem pedes Parisinos longo, collocatur. Obturatis nunc auribus, admouetur istius extremum alterum dentibus nudis, et crepitans horologii tinnitus adeo distincte percipietur, ut in ipso baculi extremo inter dentes videatur excitari. Ex qua methodo apparet, sonum horologii, dentibus exceptum, validius sentiri, quam si aures ipsae vni baculi adplicarentur. Baculus, pluribus suis extremitatibus brachiatus, tinnitum horologii ad plures quoque dentes, finibus istis simul admouentes, propagat. Quod si voces humanas ope dentium percipere cupimus, opus esse Cl. Auctor docet baculo quodam immobili, cuius extrema ita aptata sunt, ut adplicata dentibus anticis superioribus, vocum formationem non impedian; in vnum baculi extremum, itidem superioribus dentibus adiunctum, verba quis dimittit, quae alter, auribus antea occlusis,

clare intelliget, et si respondet, prior quoque responsionem audiet. Viam nunc, qua sonus per dentes in aurem internam propagatur, Cl. Auctor disquirens, primum ipsius soni generationem explicat, eamque motibus tremulis, quibus partes corporis sonantis disiunguntur rursusque coeunt, adscribit. Talis partium collisus atque concussio tympani membranam adficiunt, quippe quae, cum aëreque corpus sit sonorum et aëri contiguum, similem motus accipit, concutitur, et concussionem hanc cum tenerrimis istis ossiculis, malleo, incude, stylo pedis, et ope huius cum fenestra ovali, et inde cum nervo acustico communicat.

Ultimo tandem Cl. Auctor exponit, cur nervus auditorii sonum per corpus quoddam dentibus superioribus adplicatum aequè clare percipiant, a quo ope ipsius organi auditus. Scilicet, tanta est inter dentes et ossa temporalia ossium connexio, ut vnum quasi os constituent, per quod aeris tremores, a corpore sonante orti, dentium ope ad labyrinthum pervenire possunt. Cur hoc ita eveniat, causas in firmitate et duritie ossium ponit, quae ab aëre contremiscente comprimuntur, et propria vi iterum se dilatant, elasticitate sua itaque sonum per baculum aequè elasticum accipiunt dentes, eumque ad contigua ossa promouent, inde nervuli, canales semicirculares labyrinthi circumeuntes, sentiuntur.



V.

Diff. inaug. sistens experimenta quaedam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem, in vivis animalibus instituta. Praeside ALBERTO de HALLER. Respondente et Auctore IOANNE GODOFREDO ZINN, Suabacensi. Gottingae, 1749. 4. pl. 7.

Cum diuersae sint medicorum, inprimis recentiorum, sententiae in variis phaenomenis, quae ad corpus callosum, cerebellum et duram matrem pertinent, b. ZINNIUS, suasu Ill. HALLERI, qui tunc temporis in academia Gottingensi professoris munere fungebatur, varia experimenta circa has partes in vivis animalibus instituit illaque loco dissertationis inauguralis, quam eo tempore moliebatur, descripsit.

Ea vero ratione primum de corpore calloso, deinde de aliis partibus agit, ut ante omnia experimenta accurate enarret, deinde subiiciat scholia, in quibus phaenomena explicantur conclusionesque variae inde formantur. Quod vero primo attinet ad corpus callosum, ad quod septem priora experimenta pertinent, notum est, Cl. Viros, LANCISIUM, MAZINI, et maxime Cl. DE LA PEYRONIE, posuisse animi sedem in eo corpore, eamque hypothese confirmasse variis argumentis, inprimis ex morte, quae, illo corpore laeso, in variis morbis confestim sequitur, sumtis. Hoc vero assertum minime verum esse, Nostri tentamina probant, cum in canibus et columba illud corpus pertusum et discissum sit, sensu motuque integerrimis, atque animalia ad unum alterumue diem adhuc vixerint. Addidit vero Cl. Auctor alia, quibus vel Cl. DE LA PEYRONIE

p. 4.

argumenta refellit, vel ex paruitate corporis callosi, vel ex variis historiis morborum, in quibus, eo laeso vel compresso, tamen aegri vixerunt, vel ex anatome comparata probat, neutiquam animi sedem in eo corpore collocari posse, quod magis anatomica inspectio confirmat, quae docet, multos nervos, vti tamen de omnibus Cl. DE LA PEYRONIE asseruit, non ex corpore calloso, sed ex aliis cerebri locis oriri, quae cum corpore calloso parum coniuncta sunt.

p. 24. Ipsum vero usum huius corporis cum HALLE-RO in eo ponit, vt sit communicatio motuum et sensuum inter vtrumque hemisphaerium. Ex narratis quoque experimentis patet, vulnera medullae oblongatae non tam subito esse lethalia, vti nonnullis visum est, atque nulli singulari cerebri particulae eam posse adscribi monarchiam, vt, ea laesa, statim quoque vita tollatur, sed Noster cum HAL-LE-RO putat, vbique esse animi sedem, vbi initium est nervi cuiuscunque, atque omnium nervorum iunctas primas origines efficere verum sensorium commune. Reliqua huius sectionis ad lethali-
tatem vulnerum sinuum cerebri spectant: Noster enim ostendit, sinu longitudinali laeso, mortem non eodem temporis momento secutam esse, sed exem-
pla vulnerum eiusmodi sanatorum, apud auctores inueniri.

p. 25. Reliqua huius sectionis ad lethali-
tatem vulnerum sinuum cerebri spectant: Noster enim ostendit, sinu longitudinali laeso, mortem non eodem temporis momento secutam esse, sed exem-
pla vulnerum eiusmodi sanatorum, apud auctores inueniri.

p. 28. Altera huius dissertationis sectio agit de cerebel-
lo, dura matre, et nervis diaphragmatis, et

p. 32. quinque experimenta continet. Ex iis patet, 1) ce-
rebello vehementer laeso, vitam per multas horas superesse, ita vt nervi, organa inuoluntaria adeun-
tes, minime ex solo cerebello oriantur, quod ma-
gis adhuc variae morborum historiae confirmant, in quibus, cerebello morbo affecto, tamen vitales

p. 38. functiones integerrimae persisterunt. 2) Vitalitatis
sedem

sedem non quaerendam esse in cerebello, atque ipsa medullaris cerebri substantiae vascula per anastomosis inter se iungi. 3) Neruis phrenicis ligatis P. 39. vel abscissis, iisque deinde infra ligaturam vel locum amputatum irritatis, diaphragma manifeste constringitur. Hinc neruis, omni cum cerebro commercio sublato, tamen inest vis excitandi motus, si irritatio quaedam accesserit. Atque hac occasione Cl. Auctor de irritabilitate in vniuersum disputat, et ad effectus eius alternum pulmonum motum in respiratione refert. Putat enim, sanguine in vasis pulmonum stagnante, neruos pulmonum irritari eamque irritationem ope intercostalis nerui transire in musculos, respirationi dicatos, eorundemque perennem motum hac ratione produci. 4) Duram P. 43. matrem sensu destitutam esse, neque illam neruos habere, sed ex cellulosa tela stipata constare, atque in phrenitide corticem cerebri ipsum esse inflammatum, non membranas. 5) Laesa medulla cerebri, p. 51. maximum oriri dolorem, non tamen in omni medullae laesione statim conuulsiones subsequi.

VI.

Disput. med. de irritabilitate, Praefide GEORGIO CHRISTIANO OEDER, M.D. Respondente PETRO ASCANIO. Hafniae, 1752. 4. pl. 3½.

Cum inter primos auctores, qui de nouo tunc temporis irritabilitatis argumento scripserunt, Cl. OEDER omnino referendus sit, de eius dissertatione hic loci ad lectores referre omnino pretium esse duximus. Scripta vero illa est ante, quam Cl. ZIMMERMANNI de irritabilitate libellus ad OEDERUM peruenisset. Primo vero Noster probare P. 1.

bare annititur, *irritabilitatem* siue *stimulum*, vti ab antiquis dicitur, ex parte veteribus iam fuisse cognitum. Deinde experimenta profert, quae demonstrant, irritabilem fibrarum muscularium vim inter *principia*, vnde phaenomenorum ratio petenda est, referendam esse. Ea partim ab aliis sumta, partim ab Auctore Cl. ipso instituta sunt. Notum illud in phrenicis nervis instituendum experimentum

- P. 5. Auctori Cl. non perfecte successit. Ex experimentis vero concludit: *fibris muscularibus eam datam esse facultatem, ut ad contactum omnium fere corporum, quibus non semper continguntur, moueantur: hanc facultatem musculos a nervis habere: in musculis tamdiu irritabilitatem superesse, quamdiu fluidi neruei aliqua pars in iis supersit, neque ad singulas musculorum actiones singulis influxibus nouae portiois spirituum animalium opus esse, vti BOERHAAVIUS in explicatione respirationis assumfit. Addit, irritabilitatem maiorem ab aliis corporibus, ab aliis e contrario minorem oriri et reperiri corpora, quae irritabilitatem tollant. Deinde ostendit, irritabilitatem a nervis provenire, quia, nervis irritatis, musculus contrahitur,*
- P. 13. *hincque animalibus tantum propriam esse. Tandem actiones vitales rationemque illarum ope irritabilitatis simili fere modo explicat, circulationem scilicet sanguinis, et respirationem, vti Cl. ZIMMERMANNUS fecit, atque in fine huius libelli plures eiusdem argumenti dissertationes promittit.*



VII.

Sulla insensitivita ed irritabilita Halleriana opuscoli di vari Autori raccolti da GIACINTO BARTOLOMEO FABRI, Fisico Chirurgo. P. I. nella quale si contengono tutte le cose favorevoli al sistema del Chiar. Sign. HALLER. P. II. nella quale si contengono tutte le cose opposte al sistema del Chiar. Sign. HALLER. Con Supplemento. In Bologna, per G. Corciolani, 4. Tom. I. 1757. Alph. 2. tab. aen. 1. T. II. 1757. Alph. 2. tab. aen. 6. Supplem. 1759. Alph. 1. pl. 22.

i. e.

Variorum Auctorum de insensibilitate et irritabilitate opuscula collecta, ab H. B. FABRI. P. I. continet ea scripta, quae systemati Cl. HALLERI fauent. P. II. ea, quae contra illud pugnant. Cum Supplemento.

Licet aliquot iam anni praeterlapsi sint, ex quo haec auctorum, qui de irritabilitatis et sensibilitatis doctrina, ab Ill. HALLERO nostro demum denuo proposita, scripserunt, collectio publici iuris facta est, nosque variis in locis horum commentariorum de plurimis libellis, in ea contentis, exposuimus, operae tamen pretium esse duximus, etiam de vniuerso illo opere denuo ad lectores referre. Est enim in vniuersum huius argumenti summa dignitas, cum ea re multis capitibus doctrinae physiologicae, pathologicae et chirurgicae accensa sit, atque praeterea multa adhuc in ea collectione supersunt scripta, de quibus consulto antea non

exposuimus. Ne vero, quae isto tempore, quo primum scribebantur isti libelli, noua erant et lectu iucunda, nunc vero nimis nota et vulgaria, praeter necessitatem atque sine lectorum usu et voluptate repetamus, breuius in istis nouis libellis indicandis versabimur, quam postulare dignitas huius doctrinae videri posset. Suscepit vero, vt primo de hacce collectione in vniuersum exponamus, versionem variorum scriptorum, gallice antea editorum, atque collectionem totius huius operis Cl. FABRI, medicus et chirurgus Bononiensis, post editionem aliquam primorum auctorum de irritabilitate et insensibilitate auctorum, quae etiam Italica lingua conscripta Romae anno huius seculi quinquagesimo quinto prodiit studio Cl. I. V. PETRINI, professoris philosophiae et matheos in collegio Nazareno Romano, ita tamen, vt Cl. FABRI in altera hac editione scriptores, a Cl. PETRINI ex Gallica lingua translato, denuo in Italicam linguam verteret.

T.I.p.1 Praemissa vero est ipsa Cl. PETRINI praefatio ex Romana editione, in qua ille de dignitate huius inuenti in vniuersum exponit.

p. 15. Hanc excipit Cl. TISSOT praefatio, praefixa Lausannensi editioni *dissertationis* Ill. HALLERI *de partibus sensilibus et irritabilibus*, quae anno 1755 prodiit, de qua iam alibi exposuimus *).

p. 33. Sequitur nunc *commentarius* ille, qui in commentariis societatis Gottingensis ad annum 1752 continetur, et de quo **) atque de *supplemento* contra Cl. LE CAT, eidem a Cl. TISSOT in editione Lausannensi adnexo ***), aliis in locis fusa ad lectores retulerimus. Adnexa est brevis HALLERI
differ-

*) vid. Commentar. hor. Vol. V. p. 695 seq.

**) vid. Comment. Vol. II. p. 695 seq.

***) vid. Comment. Vol. V. l. citato.

dissertatio de motu cordis a stimulo nato, volumini p. 71.
 primo commentariorum societatis Gottingensis in-
 ferta, cuius praecipua contenta iam enarraui-
 nus *).

Cl. I. G. ZIMMERMANNI *de irritabilitate* dis- p. 74.
 sertatio Gotting. 1751 publicata **).

Cl. P. CASTELL *experimenta, quibus varias cor-* p. 125.
poris humani partes sentiendi facultate carere consti-
*git ***)*, quae Gottingae anno 1753 prodierunt.

Cl. VRBANI TOSSETTI, professoris phil. et p. 164.
 mathes. in collegio Nazareno Romano patrum scho- 173.
 larum piarum, *epistolae tres ad Cl. IOS. VALDAM-* 189.
 RINI, medicum Cortonensem, *de insensibilitate va-*
riarum partium in animalibus, in editione Romana
 anno 1755 publicatae. Licet Cl. TOSSETTI ipse
 non sit medicus, tamen in quorumque corporum
 naturalium disquisitione occupatus atque Ill. HAL-
 LERI experimentis excitatus, illa primus forte in
 Italia repetiit eorumque summam hic declarat.
 Experimenta vero in prima epistola ad insensibilita-
 tem tendinum et durae matris pertinent, et illa,
 quae ab HALLERO proposita erant, magis confir-
 mant. In altera epistola haec planius explicantur,
 quibus tamen varia addita sunt, quae ad motum
 cordis in animalibus diu post mortem superstitem et
 insensibilitatem pericranii pertinent. Tendo Achil- p. 181.
 is discissus in cane post triginta dies gummosa
 quasi substantia iterum conglutatus erat. In ter-
 tia epistola aliorum Cl. Virorum PALIANI, GRA-
 TIANI, VARI, MORANDO et BIANCHI de in-
 sensibilitate tendinum, pericranii, durae matris pleu-
 raeque experimenta enarrantur, quae Halleriano-
 rum

*) vid. Commentar. hor. Vol. II. p. 19 seq.

**) vid. Comment. Vol. II. p. 323 seq.

***) vid. Comment. Vol. III. p. 101 seq.

- p. 192. rum experimentorum veritatem confirmant. Tendinum sensum obscurum esse, GALENUS iam proposuit, ac varia, quae ad insensibilitatem tendinum et ligamentorum pertinent, ante auctorem, varii alii auctores Italici habent.
- p. 201. Cl. FABRI editoris huius collectionis *litterae ad Patrem Lectorem Anonymum*, quae forte tantum ob responsionem iisdem subnexam huic volumini insertae sunt, cum proprie, quia contra HALLERII systema directae sunt, ad alterum volumen, quod aduersariorum scripta continet, pertineant. Varium exitum experimentorum, quae inprimis Noster ad sensibilitatem durae matris declarandam instituit, fuisse asserit, eamque omnino sensu praeditam esse contendit.
- p. 210. *Responsio Patris Lectoris Anonymi* ad Cl. FABRI, quae Halleriano systemati ita fauet, ut in ea theoria irritabilitatis ad vniuersam naturam extendatur, et varia, quae in aliis corporibus naturalibus obueniunt, phaenomena eius ope explicentur.
- p. 230. Cl. CAES. POZZI, mathes. profess. *litterae* ad Cl. THOM. LAGHI, latino idiomate scriptae. Cl. POZZI Florentiis experimenta de tendinum insensibilitate instituit, et cognouit, dolores, qui nonnunquam in animalibus, quorum tendines irritantur, obseruari solent, a cute simul tacta produci. Pericranium quoque et duram matrem omnino sensu esse destitutam, expertus est, illaque experimenta omnia coram multis aliis eruditis aliquoties repetiit.
- p. 237. *Quarta epistola* Cl. TOSETTI ad Cl. VALDAMBRINI, quae inprimis contra Cl. Virorum LAGHI et BIANCHI experimenta directae est. Maxime vero in ea notatu dignae sunt Cl. PALIANI observationes, quibus declaratur, neque nervos ad tendines distribui, sed tantum ad eorum inuolucra, id quod

quod de tendine Achillis adiecta figura explicatur, neque ad duram matrem. Epistola vero haec in instituto Bononiensi anno 1756 mens. nov. praelecta est.

CL. MARC. ANT. CALDANI litterae ad Ill. HAL-P. 269.
LERUM, de insensibilitate et irritabilitate nonnullarum partium in animalibus scriptae, et praelectae in instit. Bononiensi mens. nov. 1756. Elegantes omnino sunt magnumque experimentorum continent numerum, quae CL. CALDANI summa cum diligentia instituit. In vniuersum autem in hac epistola confirmatur, tendines, si in experimentis nullae aliae partes simul irritentur, omnino sensu destitui, animaliaque, tendine vulnerato, nulla doloris signa edere. Confirmatur quoque, nullos nervos ad ipsorum tendinum substantiam transire, nec pericranium, nec duram matrem, si pertunditur, sentire. Attamen in inserta alia CL. CALDANI ad HALLERUM epistola, ille, narrato quodam experimento, probare p. 293. annitur, internam durae matris laminam sensu aliquo praeditam esse, quod vero HALLERUS in adiecta responsione se obseruasse negat. Nullos etiam CL. CALDANI in dura matre nervos vel microscopio detegere potuit. Animal quoque cerebri vulnera sentire, experimentis Noster probat, si vero vlcera aut aliae laesiones cerebri non dolorem excitauerint, id adscribendum fuisse callositati et inflammationi partium circumiacentium, asserit. Peritoneum non sentire, experientia, occasione herniae cuiusdam curationis per ferrum facta, probatur. Reliqua pertinent ad irritabilitatem cordis, cuius motus nunquam sponte, sed semper ab alio stimulo aut aere reuocatur, intestinorum porro, ventriculi et vesicae, quae partes intestinis minus irritabiles sunt, et iridis irritabilitatem, quam CL. CALDANI plane negat.

CL.

P. 337. Cl. I. FR. CIGNA, M. D. *theses de irritabilitate* mens. april. 1757 in academia Taurinensi defensae. Epitome est experimentorum, ab HALLERO eiusque discipulis institutorum, eaque ad praxin medicam et physiologiam a Cl. Auctore adplicantur. Distinctionem inter nervos vitales et animales plane reiicit, atque cuilibet parti propriam quandam irritabilitatem adscribit, irritabilitatemque vnius eiusdemque partis in diuersis indiuiduis differre contendit.

P. II. Altera huius collectionis pars, quae scripta, contra HALLERUM directa, continet, licet ex iis, quae euulgata sunt, varia adhuc deficiant, sequentibus libellis componitur.

P. I. *Epistola prima* Cl. IO. BA. BIANCHI ad Cl. BASSANI *super sensibilitate et irritabilitate partium in hominibus et brutis*. Cl. Auctor emeritus professor anatomiae in academia Taurinensi, senex suisque quondam cum Cel. MORGAGNI controuersiis clarus, iterum occasione Hallerianae sensibilitatis in arenam descendit, occasione litterarum Cl. BASSANI, quibus hic illum de suis et Cl. TOSETTI circa sensibilitatem et irritabilitatem experimentis certiores reddit. Putat autem, totum corpus ex nervis constare et sensum habere, sola epidermide excepta. Hinc tendines, duram matrem, peritoneum et corneam etc. sentire, quod magis ex doloribus, qui in his partibus morbose affectis oriuntur, v. c. in arthritide, malo ischiadico etc. probat. Varia quoque in animalibus experimenta instituta fuerunt, quorum tamen euentus incertus et varius fuit. Adiicit, omnes partes, quae sentiunt, etiam irritabiles totumque corpus irritabilitate praeditum esse, cum omnes eius partes, si dissecentur, in viuis se retrahant.

Secunda

Secunda EIUSD. Cl. BIANCHI *ad Collegas epi-* p. 24.
stola, in qua acrius systema Hallerianum perstringit,
 ostenditque neque irritabilitatis theoriam nouam
 esse, neque insensibilitatis, cum illam GALENUS
 iam cognouerit. Porro probare annititur, huius
 theoriae auctores inter se discrepare et contra
 se dicere, hancque theoriam in vniuersum, potissi-
 mum in medicina faciēda et chirurgia, nocere at-
 que per eam tirones confundi.

Cl. SYLVESTRI PONTIULLI *epistola* ad Cl. p. 53.
 BIANCHI. Breuissima est nihilque noui continet.

Octo obseruationes practicae Cl. IOA. MICH. p. 56.
 LAMBERTI, chirurgi Alexandrini. Ex iis quinque
 ad pericranium pertinent et confirmant, eo in-
 ciso, summos oriri dolores. Tres reliquae tendi-
 num sensibilitatem confirmant.

DOMINICI SANSEVERINI, medic. Neapo. p. 67.
tit. de fibrarum sensibilitate et irritabilitate pauca. Vix p. 70.
 ad hoc volumen pertinet. In experimentis enim
 hic enarratis dura mater sensu destituebatur, cere-
 brum ipsum indolens fuit, verum, vbi cerebellum
 tangebatur, statim animal conuulsionibus corri-
 piebatur.

Cl. CAIET. TACONI *diff. de gangraenis ela-* p. 79.
psis proxime annis visis curatisque: Plane illa ab hu-
 ius operis instituto aliena est, cum ne verbum qui-
 dem in ea de sensibilitate vel irritabilitate contineat-
 ur. Obseruatum vero est, ab a. 1749 annisque se-
 quentibus Bononiae omnes fere externas corporis
 partes vulneratas statim gangraena corripitur, ita vt
 morbus hic epidemicus quasi grassaretur et conta-
 giosus esset. De reliquo haec dissertatio multas
 notatu dignas obseruationes exhibet, fatisque de
 Auctoris Cl. doctrina testatur. Inter illas omnino
 referri meretur historia foeminae, in qua caries
 cranii magnam partem, atque gangraena duram
 matrem

matrem absumferat, quae tamen cranii portio maxima ex parte iterum restituta est, quod, figura adiecta, magis explicatur.

p. 110. Cl. THOM. LAGHI ad Cl. CAES. POZZI epistola. Afferit, experimenta se summa cum diligentia instituisse et deprehendisse, tendines omnino quidem sensum habere, nihil tamen in hac re perpetui esse, cum ne ipsa quidem cutis perpetuo sensitiva videatur. Obscurus euentus experimentorum circa pleuram et peritoneum fuit, duram vero matrem, pericranium et cerebrum ipsum sentire confirmat. In tabula adiecta prima nerui ex trunco cruralis potestici, tendinem Achillis adeuntes, atque in altera rami delineantur neruei, quos Cl. Auctor e trunco paris quinti et septimi ad duram matrem distribui putat.

p. 117. *Commentarius* Cl. CLAUD. NIC. LE CAT, *de sensibilitate durae et piaë matris etc. academiae Berolinensi transmissus et nunc Italice versus* *).

p. 131. Cl. ANTON. ARRIGONI *epistola* ad Cl. FABRI, *de irritabilitate et sensatione partium in viuis*. Irritabilitatis sedem in muco, partes iungente, ponit, negat vero, irritabilitatem a sensibilitate partium separari posse, ita, vt, sensu sublato, irritabilitas superesse possit.

p. 141. Cl. IO. BAPT. FE' *defensio* HERM. BOERHAAVII *aduersus* HALLERUM. Acrius Ill. HALLERUM discipulumque Cl. ZIMMERMANN impugnat. Disputatur vero in hac dissertatione potissimum, an BOERHAAVIUS dixerit, totum corpus nervis constare et sentire? atque HALLERUS reprehenditur, quod varia contra praeceptorem monuerit.

p. 178. *Series nouorum experimentorum circa sensibilitatem et irritabilitatem partium corporis animalis*, Auct. Cl.

*) vid. Comment. hor. Vol. III. p. 426 seq.

Cl. LORRY, ex diario Cl. VANDERMONDE *)
umta.

Cl. LUD. MAR. GIRARD DE VILLARS *differ*-p. 198.
ratio medica, an ut sensibilitas, sic irritabilitas a nervis?
arisiis, sub praesidio Cl. CAR. GEILLE DE SAINT
EGER defensa **). Confirmatur in ea, tendines,
o omni inuolucro separatos, nullum sensum habere,
que eadem res de ligamentis, glandulis mucilagi-
osis, periosteo, pericranio, visceribus et dura ma-
e confirmatur experimentis, in viuis animalibus et
ominibus captis, et argumentis ex variis morbis
epetitis. Cerebrum nullum sensum habere Noster
erit. Irritabilitatem vero a nervis esse, ut sensibi-
tas, Cl. Auctor affirmat, hoc usus argumento, sen-
tione in nervis excitata, fibras musculosas demum
l contractionem determinari.

Cl. DOM. VANDELLII *epistola ad* ANTON. p. 213.
ANDELIUM *de sensibilitate pericranii, periostei, me-*
ullae, durae meningis, corneae et tendinum, atque
IUSDEM *altera ad eundem epistola de sensibilita*-p. 231.
*et irritabilitate ***).*

Anonymi epistola ad anonymum. p. 244.

Doctōris medicinae anonymi animadversiones ana-p. 249.
micae ad dissertationem HALLERI. Ab aliis acce-
mus Auctorem huius libelli esse Cl. PETRIOLI,
auca tamen, uti praecedens epistola, noua con-
net.

Cl. CAR. MICH. LOTTERI, professoris chi-p. 278.
urgiae in academia Taurinensi, *sermo de sensibilitate*
et irritabilitate partium in brutis et hominibus. Elegans
est

*) vid. *Recueil periodique* 1756. mens. nov. et dec. et
mens. ian. 1757. conf. *Commentar. hor.* Vol. VII,
p. 483 seq.

**) vid. *Comment. hor.* Vol. VIII. p. 50.

***) vid. *Comment. hor.* Vol. VII. p. 506 seqq.

est huius argumenti tractatio, atque inprimis multas morborum historias continet, in quibus, ex Cl. Auctoris mente, dolor in iis partibus deprehensus est, quas HALLERUS sentire negat. Adeo late patere sensibilitatem per omne corpus Noster putat, ut ne ipsam quidem telam cellulosam sensu carere credat.

p. 307. Cl. MICH. LAMBERTI *nouae observationes circa sensibilitatem periostei, ligamentorum, membrarum etc. factae.* Ossa ipsa nervos habere ex sensibilitate carnearum illarum papillarum, quae ex ambitu vulnerati ossis ad callum formandum excrescunt, concludit. Varias deinde proponit observationes de pericranii sensu, de telae cellulosae et peritonaei sensibilitate, quam ex eo confirmat, quod in homine, cuius abdomini vulnus inflictum erat, observauerat, de ligamentorum, iridis, corneae et periostei sensu. Ipsas quoque membranas, quae viscera inuoluunt, sensu haud destitui, ex eo probat, quod illae peritonaei propagines sint.

p. 326. Cl. TH. LAGHI *sermo alter ad Cl. IAC. BARTH. BECCARI de sensibilitate atque irritabilitate Halleriana.* Incertam esse nervorum insensitiuitatem concludit, atque experimenta multum variare. Duram matrem vero sentire confirmat, e contrario peritonaeum, pleura et in nonnullis experimentis ipsi musculi, insensiles deprehensi sunt. In figura adiecta nervi, tendinem adeuntes, alique ad duram matrem ex trunco quinti paris nervorum cerebri protensi, delineantur. Multa quoque circa sensibilitatem medullae cerebri experimenta instituit, in primis ope cuiusdam peculiaris instrumenti, ad hunc scopum a Comite CASALIO inuenti, quod etiam hic depictum est. Tentamina vero illa eum docuerunt, cerebri compressiones ad sex

sex fere lineas et ipsius medullae vulnera non semper conuulsionibus stipari.

Cl. IOA. MICH. LAMBERTI epistola ad Cl. P. 346.
DOM. VANDELLI. Insertae sunt in illa epistola litterae anonymi cuiusdam, quae contra Cl. CIGNA-
potissimum, ni fallimur, directae esse videntur. Ad-
iecta tandem est epistola Cl. GIRARD DE VIL-P. 357.
ARS ad Cl. BIANCHI, in qua hic laudatur, quod
*venenatam HALLERI opinionem, cuius dominium iam
tius aequo patebat, achillaeo alexipharmaco generose
debellauerit.*

Supplementum huius collectionis, quod anno
huius saeculi 1759 prodiit, in duas partes diuisum
est, quarum prior scripta, quibus systema irritabi-
litis et sensibilitatis defenditur, posterior vero
scripta, quibus illud impugnatur, continet.

Initium facit *epitome secundi commentarii de parti-* P. I.
bus sensilibus et irritabilibus Cl. HALLERI ex Cl.
ANDERMONDE diario *).

Cl. ZINN *commentarius de inuolucris neruorum* p. 81.
insertus commentariis acad. Berolinensis ad annum
1753 **).

EIUSD. *experimenta quaedam circa corpus callo-* p. 94.
um, cerebellum et duram meningem, in ipsis viuis ani-
malibus instituta. Dissertationis inauguralis huius
ab Cel. HALLERI praesidio defensae epitomen
modo dedimus ***).

Cl. G. C. OEDER et Cl. P. ASCANII *disserta-* P. 127.
tio de irritabilitate ****).

D d 2

Cl.

*) vid. Comment. hor. Vol. V. p. 697.

**) vid. Comment. hor. Vol. V. p. 206.

***) vid. Comment. hor. Supplem. III. p. 405.

****) vid. Comment. hor. Supplem. III. p. 407.

p. 143. Cl. I. B. VERNA *litterae* ad Cl. HALLERUM.
Cl. VERNA, qui Taurini chirurgiam docet et nosocomii cuiusdam directionem habet, varia experimenta, ibidem in hominibus instituta, cum HALLE-RO communicat, quae periostei, durae matris et tendinum insensibilitatem confirmant. Observatio- nem quoque infantis proponit, in quo anus qui- dem aperturam naturalem habebat, intestinum ve- ro rectum paullulum supra anum contractum et clau- sum erat, ut faeces exire haud possent.

p. 154. Finem supplementi huius facit Cl. HORAT. MA-RIA PAGANI et Cl. CAMILL. BOINOLI *com-mentarius theoretico-practicus de partibus insensilibus et irritabilibus animalium*, contractus et adnotationi- bus illustratus, a C. M. M. Pertinent experimenta, in hoc libello contenta, potissimum ad tendinum, durae matris, peritonaei, pleurae et medullae in-

p. 177. sensibilitatem demonstrandam. Distinguunt porro Cl. Auctores inter irritabilitatem, quam vim cor, muscoli, ventriculus et intestina tantum habent, et inter vim mere contractilem, quam arteriae, ductus excretorii, venae, vesicula fellea, vesica urinaria, ureteres et uterus ostendunt. Additae ab anonymo adnotationes contra Cl. Auctores satis acres sunt, nihil vero novi continent, ita ut a Cl. Editore com- mode omitti potuissent.

p. 7. In supplemento, quod ad secundum volumen hu-ius sectionis pertinet, primum locum occupat *dis-sertatio altera* Cl. LE CAT, *de sensibilitate durae et piaae matris, membranarum, ligamentorum, tendinum, de insensibilitate cerebelli, et de irritabilitate Halleria-na*. Cl. LE CAT postquam sua dissertatione de motu muscolari praemium ab academia regia Beroli-nensi reportavit, alteram de sensibilitate durae et piaae matris dissertationem ei transmisit, quae volumi-

volumini secundo collectionis huius inserta est, et T. II. de qua alio loco fusius ad lectores retulimus *). P. 17. Ab eo vero tempore, quo primum illa in lucem edita est, multum illam auxit Auctor Cl. tum suis, tum aliorum experimentis, atque ad Cl. BIANCHI epitomen et adumbrationem secundae editionis huius commentarii longe auctioris transmisit, quo in hanc collectionem a Cl. Editore inseri possit. Agit vero primum de sensibilitate durae matris, atque ad varia dubia, ab Ill. HALLERO contra observationes, a Nostro in priore editione huius commentarii commemoratas, prolata respondet. Cerebelli compressionem non causam esse dolorum, qui, dura matre pressa, oriuntur, ostendit, multasque alias observationes ad durae matris sensibilitatem confirmandam in medium profert. Animaduersiones quoque ad objectiones HALLERI contra theoriam Auctoris deetano subiungit, atque membranas, ligamenta et tendines sentire, multis experimentis, in hominibus captis, morborumque historiis probat. Tandem P. 31. concedit, nonnullas ex his partibus per accidens insensiles fieri posse, nervo obstructo, vel eius actione laesa, aut sensatione *aequivoca* facta, id est, quae non respondeat dolori, in cute vel musculis excitato; cerebellum vero perpetuo sensu destitui confirmat. Ultima sectio varias animaduersiones in Halleria P. 37. nam theoriam de insensibilitate in uniuersum continet.

Cl. FABRI editoris huius collectionis *litterae* p. 42. ad Cl. HERC. CELLI. Continet experimenta, in negro quodam circa sensibilitatem tendinum instituta, ex quibus probatur, tendinum laesionem vel attactum acute sentiri.

D d 3

Cl.

*) vid. Comment. hor. Vol. III. p. 326.

- p. 51. Cl. DELII *animaduersiones in doctrinam de irritabilitate etc.* *).
- p. 73. *Eiusd. observatio de periosteo admodum dolente, ex diff. inaugurali* Cl. VILLESAYOYE *pentas obs. medico-chirurg. sumta est, atque in aegro, qui maximum circa tibiam vulnus acceperat, instituta est.*
- p. 76. Cl. DOM. VANDELLI ad Cl. LAMBERTI *epistola.* Corneae et durae matris sensibilitatem experientis probare annititur auctor, quae in viuis hominibus instituta sunt.
- p. 81. Cl. BIANCHI *litterae* ad Cl. LE CAT. Acerbius eae scriptae sunt, nulla vero experimenta continent.
- p. 92. *Medici cuiusdam anonymi litterae* ad Cl. FABRI. Animaduersiones varias ad Cl. ZIMMERMANN libellum inprimis comprehendit.
- p. 97. Cl. GAET. ROSSI *epistola* ad Cl. FERD. MARCHESEINI. Nihil noui in ea proponitur, sed fatetur tantummodo Cl. ROSSI, se plus fauere Cl. LAGHI, quam Cl. CALDANI.
- p. 105. *Litterae* Cl. IOS. BERTOSSI *ad amicum de sensibilitate et irritabilitate partium c. h.* De irritabilitate et sensibilitate in vniuersum definitioneque harum qualitatum disputat.
- p. 121. Cl. LE CAT. ad Cl. BIANCHI *epistola.* Continet varia tum Cl. LE CAT, tum variorum ex discipulis eius observationes, quae ad durae matris epericranii sensibilitatem spectant. Adnexa est Cl. BIANCHI ad hanc epistolam responsio.
- p. 127. Cl. CASALI ad Cl. TH. LAGHI *epistola* e *EIUSDEM* ad illam responsio, rectius, vti alia, omitti potuissent, cum iocos tantum tradant.

Anony

*) vid. Comment. hor. Vol. III. p. 98 seq.

Anonymi animadversiones ad epistolam Cl. 10. p. 133.
 A. VERNÆ. Varia contra experimenta et even-
 tum eorum, a Cl. VERNÆ descriptum, monet.

Cl. DU VERNEY *observatio de medullae sensibili* p. 141.
tate, ex actis acad. Parisinae a. 1700 sumpta.

VIII.

A Treatise on biliary concretions: or, Stones
 in the Gall-Bladder and Ducts. By THO-
 MAS COE, M. D. London, printed for D.
 Wilson and T. Durham, 1757. 8. Alph. 1.
 pl. 3. tab. aen. 2.

i. e.

Dissertatio de concretionibus biliosis, siue
 calculis in vesicula fellea et ductibus biliariis.
 Auctore THOMAS COE, M. D.

Animaduerverat Cl. Auctor, eruditorum ha-
 ctenus neminem satis, atque peculiari scri-
 to de calculis felleis, qui grauissimorum mor-
 borum causa haud raro esse solent, disputasse. Sum-
 it itaque sibi id argumentum tractandum ita, ut
 non solum aliorum auctorum, quos viderat omnium,
 sententias et observationes, sparsim prolatas, colli-
 eret, sed et, quae ipse hac de re in medicina fa-
 cienda expertus esset, adderet. Atque hac in re
 a versatum esse Virum doctissimum in libri huius
 perlustratione cognouimus, ut opus hoc omnium
 medicorum attentione omnino dignum, iudican-
 um sit.

Praefatio continet historiam et iudicium de scri-
 toribus pene omnibus, qui de calculis biliariis ege-
 rant. Neque possumus facere, quin cum Auctore

Cl. vehementer miremur, medicos antiquiores, in perscrutandis morborum caussis alias satis accuratos, nihil omnino de calculis istis adnotasse; ita vt FALLOPIUS, VESALIUS et FERNELIUS primi fuerint, qui illorum mentionem fecerint, a quo tempore medici magis ad hoc phaenomenon attenderunt. Verosimile autem videtur, veteres ideo de hisce calculis siluisse, quia mortuorum hominum corpora rarissime secarunt, licet in brutis quoque non raro obuios eosdem esse experientia doceat.

Ipsi tractationi autem praemissa est introductio, in qua Auctor Cl. de occultis morborum chronicorum caussis eleganter disputat, methodumque illas causas cognoscendi explicat, atque exemplo colicae declarat; qua occasione quoque de paraphrenitide et hepatitide, qui morbi haud raro cum colica confunduntur, differit, tandemque ad calculos bilarios transit, cum haud raro accidat, vt symptomata, per eos calculos excitata, pro colicis doloribus habeantur.

P. 49.

Caput primum agit de bile in vniuersum, saponacea eius indole et vsu, qui praecipue ex morbis a bilis vitiis oriundis cognosci potest. Inter morbosas vero degeneraciones eiusdem Cl. COE ad illam potissimum attendit, qua bilis, vti extra corpus facere solet, in eo iam ad concreciones formandas apta deprehenditur. Atque huius morbosae concrefcentiae causas praedisponentes et occasionales Noster ex HOFFMANNO potissimum et SWIENTENIO recenset. Inprimis autem ad calculorum horum genesin confert peculiaris quaedam corporis dispositio, profecta a causis, quae non explicari possunt, cum haud raro in iunioribus, atque eiusmodi hominibus reperiantur, qui corpus satis exercent. Omnino tamen notandum est, frequen-

tius

ius illos calculos post quinquagesimum annum, por-
o in foeminis crebrius, quam in viris inueniri,
ta vt quinque mulieres, citius vno viro, hoc morbo
aborent. Nunquam Cl. Auctor illos in pueris aut
dolescentibus vidit, alii tamen auctores, in his quo-
que obseruarunt.

Secundo capite de formatione et natura concre- p. 69.
tionum biliosarum disputatur. Ex omnibus calcu-

is, quibus corpus humanum obnoxium est, tantum
raesentia calculorum, qui in bilis et vrinae viis et
receptaculis deprehenduntur, per certa signa di-
gnosci potest, vti nulli quoque alii, praeter modo
dictos, atque intestinales et pancreatici ex corpore
eliminantur. Vt plurimum vero per intestina ex-
eunt, interim vomitu quoque illos reiici posse et
egros inde leuari, post HOFFMANNUM et RIVE- p. 73.

NUM probatur duabus obseruationibus, a Cl. HUX-
AMO cum Auctore communicatis. Adfunt ta-
men etiam obseruationes docentes, ex abscessu in
ypochondrio dextro nato, protractos quoque eos-
dem fuisse. Maxime in vesicula fellea et ductu cy-
stico, rarius in ductu hepatico eiusque ramis occur-
unt. Qui vero in hepatis substantia aut sub mem-
brana eius exteriori reperti sunt, calculi fellei,
in poris biliariis nati maioresque reddit, in car-
nosam visceris substantiam penetrarunt. Modus
vero ipse, quo calculi biliarii generantur, difficulter
cognoscitur, certum tamen est, maximam conue-
nientiam esse inter genesin horum calculorum, at-
que calculorum vrinariorum nec non tophorum po-
dagricorum, cum in vno eodemque aegro diuersae
illae species harum concretionum inueniantur. Ne-
que mirum est, sanguine ad eiusmodi concrementa
formanda disposito, talia circa hepar nasci, cum
circulatio sanguinis in hoc viscere lente tantum fiat.
Componuntur vero calculi ex tenacioribus bilis par-
ticulis,

- ticulis, nec non ex terrea materia, quae cum terra calculorum vrinariorum conuenit, atque ex ipso
- p. 83. sanguine fecernitur. Cum autem partes istae in diuersis calculis diuersam ad se inuicem rationem habeant, mira illa varietas horum calculorum oritur, qua magis aut minus terrestres vel inflammabiles, molliores et duriores deprehenduntur, pro vario gradu densitatis et qualitatis bilis ipsius, cuius color quoque cum colore calculorum, qui in ea sunt, semper conuenit. Plurimi ex iis, si in aquam iniiciuntur, fundum vasis non petunt, quod et in nigris nonnullis obseruatur. Maxima tamen illorum pars, si in minora frustula diffringuntur, subsidet. Fere omnes calculi crusta teguntur, quae vt plurimum laeuis est, et tactu examinata pinguis quasi apparet, atque ab ipsa calculorum substantia multum differt, quae nonnunquam in strata disposita est, nonnunquam vero irregularem massam ostendit. Saepius variegatum colorem ostendunt, venisque nonnullis haud raro satis regulariter ductis distinguuntur. In mollioribus calculis vt plurimum crusta, modo descripta, adest, quae molliora frustula continet, solidiores vernice tantum obducuntur. Neque adeo rarum est, in superficie illorum salina corpora crystallisata apparere. In aqua, spiritu vini et aqua calcis non soluuntur, solutionem tamen in nonnullis salis tartari lixiuium praestat. Siccati, exceptis albis terrestribus, omnes flammam concipiunt, figura multum variant. Oritur vero haec diuersitas a variis causis, inprimis vero a pressione, quam tunicae vesiculae in hos calculos, dum molliores adhuc sunt, exercere solent. Atque eadem varietas ratione magnitudinis et numeri horum calculorum deprehenditur. Nonnunquam cavitates quasdam habent, in quas eminentiae aliorum calculorum recipiuntur. In fine autem huius capitis Cl.
- p. 121. Auctor

Auctor de alio calculorum genere, qui a biliariis quidem differunt, sed etiam colicos dolores producunt, agit, de calculis scilicet intestinalibus. Hi ex faecum aluinarum partibus, mucos connexis, orti, circa nucleum, a nucleo pruni vel cerasi aut ossiculo quodam vel calculo biliario etc. formatum, in strata ita disponuntur, ut calculum forment, qui vel intestinorum membranis adhaeret, vel inflexu aliquo ad valvulam intestinorum crassorum retinetur. Per continuam vero intestinorum contractionem eiusmodi concretiones ita compinguntur, ut crusta in eis nascatur, cuius densitas resorptione particularum liquidarum magis adhuc augetur. Quae vero ex eiusmodi calculis proueniunt symptomata, et methodus curationis necessaria, ea omnia, fusius hic a Nostro descripta, inuenies. Signa eorum diagnostica maxime incerta sunt, interim Cl. Auctor monet, non omnibus colicis doloribus, qui saepius recurrunt, medicum ad eiusmodi calculi praesentiam attentum esse debere. Docet praeterea, inter signa referri p. 130. debere dolorem per omne paroxysmi tempus in uno loco fixum, aut tractum intestini coli sequentem: colicos dolores saepius sine manifesta quadam causa recrudescentes: absentiam signorum inflammationis vel obstructionis bilis, aut calculi vrinarii vel spasmi neruosi: dolorem subito sine sensibili euacuatione cessantem, tumorem denique et duritiem in parte affecta. Reliqua signa hic enarrata, descensum calculi per coli flexum finisteriorem ad intestinum rectum indicant.

Caput tertium de signis concretionum biliosarum p. 142. inscribitur. Eorum signorum alia calculum per ductum cysticum et choledochum ad intestinum duodenum transire indicant, alia praesentiam calculorum in vesicula fellea declarant. Inter priora referuntur: dolor acutus subitaneus et profundus ad

ad dextrum latus scrobiculi cordis perceptus, qui exacerbatur vel remittit, sine febris aut inflammationis signis, nullaue alia caussa euidente: nausea porro et vomitus, syncope et vehementes anxietates: obstructio aluina cum faecibus albis argillaceis: vrina et color cutis, vti in ictero, atque subitanea omnium symptomatum remissio. Inter omnia vero signa ista, aliaque ab Auctore relata, nullum est, quod vt vnum pathognomonicum considerari possit, sed nonnulla, simul sumta, colicam a calculis biliosis prouenire declarant. Color tamen cutis et faecum vti in ictericis, dolor vehementissimus et absentia febris, vt praecipua symptomata considerari merentur. Tempus durationis paroxysmi, spatiumque

p. 162. inter duos paroxysmos vehementer differt. Occasionalis vero caussa, quae paroxysmum tunc producit, quando calculi eius magnitudinis adsunt, vt per ductus transire possint, quaerenda est vt plurimum in vehementi quadam animi aut corporis commotione, vti pluribus Noster tradit, qui etiam de omnibus istis signis copiose agit, quibus colica talis ab hepatis, ventriculi et duodeni vel pleurae inflammatione, nec non a doloribus post venenum adsumtum, vel ictero post demorsum animalis venenati orto, distingui possit. Si dolor similis a spasmis prouenit, excrementa aluina non alba sunt, qui color tantum in eiusmodi aegris obseruatur, qui calculis biliariis laborant.

p. 178. Obscuriora vero sunt adhuc signa, quae calculos tales in vesicula latere ostendunt, cum saepe nulla symptomata producant. Adest tamen nonnunquam tumor in hypochondrio dextro, ponderis sensus, et dolor punctorius: nonnunquam icterus quoque accedit, atque in nonnullis aegris, qui calculos in vesicula fellea gestabant, Cl. Auctor peculiarem quendam dolorem in humero et brachio dextro, rheumaticis doloribus similem, obseruauit.

Quarto

Quarto capite Noster de effectibus, quos con- p. 193.
 retiones tales, in vesica latentes, in totum corpus
 xferunt, disputat. Quodsi enim vel ob nimiam
 magnitudinem, vel ob alias causas ex corpore elimi-
 nari non possunt, cacochymia, icterus chronicus,
 abes et hydrops in eiusmodi aegris oriuntur. In
 is vero, qui, licet eiusmodi calculos habeant, tamen
 atis bona de reliquo sanitate gaudent, vel ductus
 non perfecte clausus est, vt aliqua bilis pars ad duo-
 enum transire possit, vel bilis hepatica, acrior red-
 ita, cysticae bilis vicem supplet. Subitanam mor-
 em ex calculis talibus oriri posse, Cl. Auctor con-
 ra Cl. BIANCHI negat, licet bilis vitia ad apople-
 iae varias species quodammodo praedisponere pos-
 e negandum non sit. In vniuersum vero Cl. Auctor
 eos anatomicos reprehendit, qui vel omnia corporis
 eliqua vitia, si calculi simul fellei reperti sint, ex istis
 deducere volunt, vel si nulla icteri signa in cadaue-
 ribus talibus deprehendunt, cum historiam morbi
 gnorent, calculos illos nocuisse plane negant. Si
 egri eiusmodi hydrope pereunt, vt plurimum alia
 quoque vitia in variis visceribus, inprimis in hepate,
 ex calculosa dispositione profecta, reperiuntur. Non-
 nunquam vero in aegris ex ista causa hydropicis aut
 aliis morbis laborantibus, post mortem tamen nulli
 calculi inueniuntur, cum ante mortem ex corpore
 expulsi sint.

Ad quintum tandem caput accedimus, quod cu- p. 225.
 ram horum calculorum in se continet. Ostendit vero
 Auctor Cl. primum, eos errare, qui calculos felleos
 nullis remediis expelli, aut icterum inde natum cu-
 rari posse asserunt, cum maxima pars aegrotorum,
 ex ictero in sanitatem restitutorum, vel calculis istis,
 vel pituitosa obstructione horum ductuum ex visci-
 do, in duodeno collecto, laborauerit. Deinde pro- p. 242.
 pius ad curationem accedit, cuius indicatio, si mor-
 bus

bus simplex est neque cum aliis complicatus, in eo consistit, vt calculi expellantur, symptomata mitigentur, dispositio corporis ad calculos tales generandos immutetur, vel si alia curatio locum non

p. 242. habet, palliativa tantum cura adhibeatur. In paroxysmo, si inflammationis periculum vrget et aeger plethoricus est, nonnunquam venaesectio locum habet, minime tamen semper ea necessaria est, cum in hoc morbo in vniuersum, vti supra iam adnotauimus, pulsus tardus vt plurimum sit et mollis, atque aeger magis adhuc per venaesectionem debilitetur.

p. 244. Vomitoriorum vero in hoc morbo vsus summus est, cum vomitu excitato, hepar quoque et vesicula, nec non duodenum vehementer agitentur, et bilis in vesicula stagnans calculique fellei, si non adeo magni sunt, vt per ductum transire nequeant, expellantur. Atque cum ob hanc causam vomitoria in ictero omni summam vtilitatem habeant, omnino mirum videtur, neminem medicorum vomitoria ad calculos expellendos adhibuisse, licet **SWIETENIUS** agnouerit, vomitus, qui in paroxysmo, a calculis felleis excitato, fieri solent, salubre esse naturae molimen, et optime conducere, vt loco suo calculi moueantur. Ostendit autem **Cl. Auctor**, vomitoria in morbo non adeo confirmato, nec calculis nimis magnis praesentibus, plurimum iuuare, ante illorum vero vsum in paroxysmo pro varia indicatione venaesectionem in plethoricis, vel, si spasmi vrgerent, opiata praemittit, aut purgans cum iis coniungit. Etiam extra paroxysmum ad recidivas praecauendas bilemque viscidam, quae coagula formare possit, euacuandam vomitoria multum conducunt. Vtitur **Cl. Auctor** vulgo ipecacuanha, frequentius vero ei grana aliquot tartari emetici addit,

p. 261. aut loco illius dosin vini antimonialis porrigit. Post vomitorii vsum purgans requiritur, quod haud raro quo-

quoque vices eius supplet, vel actionem eius adiu-
uat, licet frequentius purganti remedio falso adscri-
batur calculorum expulsio, quae iam ante eius
actionem ad intestina transferant. Extra paroxys- p. 275.
mum quoque purgantia, in dosi refracta data et cum
alterantibus mista et resoluentibus, multi usus sunt,
quapropter nonnulli quoque aquam marinam vehe-
menter extollunt. Multum quoque commendat p. 279.
Cl. Auctor clysmata emollientia, et fomentationes
topicas, quibuscum interna quoque medicamenta
lubrificantia et relaxantia, emulsiones scilicet et oleo-
sa, nec non opium coniungit. Atque hoc ultimo p. 281.
medicamento tum ad vomitus minuendos, tum ad
spasmos mitigandos doloresque sopiendos, in hoc
casu plane carere non possumus, cum ad illud, tan-
quam ad sacram anchoram, confugiendum sit. Ex-
hibere vero solet opium Auctor Cl. in forma pillu-
larum, a grano vno incipiens, minime tamen negat,
ab imprudenti usu huius medicamenti magna quo-
quo damna proficisci. Quod ad medicamenta ex- p. 287.
tra paroxysmum exhibenda attinet, quorum actio
non adeo evidens est, omnino maximo specificorum,
in hoc casu commendatorum, numero Cl. coram non
confidit, ipsamque curcumam adeo a nonnullis lau-
datam aliquid praestare posse, inprimis si parua tan-
tum eius dosis porrigitur, dubitat. Ex reliquis p. 295.
vero remediis resoluentibus inprimis saporem lau-
dat, qui in primis non solum viis, sed et in sangui-
nem receptus, in hoc morbo egregios usus prae-
stat. Coniungit tamen cum eo Auctor Cl. etiam
alia remedia resoluentia. Debile tamen grami-
nis aut alius cuiusdam herbae resoluentis decoctum,
inprimis si illud non sufficiente in copia adhibetur,
multum praestare posse, Auctor negat. Magis
confidit sero lactis et aquis mineralibus, effectus
vero pareirae brauae nondum satis confirmatos esse,
putat.

- putat. De millepedum quoque virtute in hoc morbo dubitat, neque semper hoc medicamentum diureticam vim habere, obseruatione confirmat. Interim iubet, vt, si experimentum cum millepedibus aliquis fuscipere cupiat, ille eos, vel lumbricos terrestres, qui etiam in hoc morbo laudantur, magna
- P. 314.** in dosi porrigat. Neque mercurialia medicamenta parua in dosi data, Noster reiicit, et gummata resoluentia; balsamo vero de copaiba, etiam a nonnullis commendato, minus fauet. Ante omnia vero corporis exercitationem commendat, sine qua medicamenta omnia nullum vsum habere, possunt.
- P. 334.** Tandem de methodo calculos felleos ex vesicula, peritonaeo adhaerente, post inflammationem sectionis ope extrahendi breuiter disputat, suamque in calculis biliosis expellendis et praecauendis medendi methodum breuiter describit. In tabula aenea prima vesicula felleae, cuius collum calculus occupat et ductus biliaris, delineantur. Secunda ex REVERHORSTIO sumpta, quatuor exempla calculorum biliariorum, in poris biliaris et vesiculis reperiuntur continet.



IX.

Genuina ratio, cur pleuritide vera faeuiente, venaesectione adfecti lateris, alias deriuatoria dicta, praeoptanda sit, auctore D. DAVID. WIPACHERO iuniori libro singulari complexa. Lugd. Batau. typis Eliae Luzac iun. 1756. 12. pl. 8.

In duas partes libellus hicce distributus est, quarum prior generatim de phlebotomia adfecti lateris in pleuritide exponit, posterior vero specialiori examine eiusmodi curandi methodi rationem de-arat. Quamnam viam Cl. Auctor in conscribendo hoc opusculo elegerit, vt adpareat, summam capitulum perlustremus, et, quo ordine sint proposita, spiciamus. Primum itaque caput praecipuas omnis venaesectionis diuisiones continet, et trifariam nunc a veteribus iam assumptam, reuulsoriam scilicet, euacuatoriam, et deriuatoriam explicat. Vltimam hanc Noster ita describit, vt dicatur, quando sanguis e priuato, in quo aggestus est loco, aut saltem eidem proximo educitur. Perpendit praeterea, quamnam *Hippocrates* et *Galenus* de deriuatoria venaesectione sententiam fouerunt. In secundo cap. 13. de Arabum aliorumque medicorum errores, qui pleuritide reuulsoriam venaesectionem deriuatorie praetulerunt, refutare Auctor conatur. Iis erroribus, qui vtrique sententiae fauent, et reuulsoriae deriuariae phlebotomiae in inflammata pleura cum relinquunt, ita in tertio capite contradicit, praecipue ex grauissima et velocissime fatali exitu minanda morbi indole, demonstret, venam non opposito, sed proxime in dolente latere esse sedendam. Quartum et vltimum prioris partis caput

Supplement. III. Ee variis

- variis argumentis eorum medicorum placita refutat qui nullum in pleuritide specialem venae pertundendae selectum assumunt, sed quae aptissima ad sanguinem proliciendum videtur, eligunt. In posteriori opusculi huius parte, propius ad venaesectiorem in inflammatione pleurae Noster accedit, et primo capite, quae ad anatomen et physiologiam
- p. 40. huius membranae spectant, recenset. Indicat simul, quanta sit minimorum vasorum omnis generis ramulorum, inter se anastomosibus implicatorum, copia, ipsi substantiae pleurae mirifice inferendorum. Ad quas conuolutiones, capite secundo, ubi morbi, quibus pleura obnoxia est, recensentur, Cl. Auctor praecipue prouocat, et ex illis facilem ad
- p. 51. stases et obstructiones pronitatem deducit. Molestam respirationem, pleuritidi superuenientem, praeter propinquitatem pulmonum facillime erysipelate adficiendorum, ipsi quoque horum perpetuae expansioni adscribit, qua pleura inflammatione et tumore decuplo crassior reddita, attingitur, atrocissimus inde dolor excitatur, hinc decumbentes non nisi anxie auram trahere possunt. In tertio capite specialissimam indicationem Noster format, et diuersis argumentandi rationibus comprobatur, esse in pleuritide, medianam venam dolentis lateris pertundendam. Harum summa eo redit, ut Cl. Auctor ideo huius venae selectum commendat, quoniam non solum inuentu facilis, sed cum duabus brachialibus venis simul in connexionem abit, quae dein sursum ascendendo in axillarem, haec in subclauiam, et deinde ipsam venam cauiam superiorem terminantur. Ex qua venarum via, et si mediana sanguine depletur, eo melius salubre illud omen doloris scilicet ad clauiculas adscensum, explicare
- p. 84. posse Noster demonstrat. Sat copiosis capite quarto exemplis aliorum partim practitorum, partim suis

uis ipsius, Cl. Auctor deriuatoriae in pleuritide
 venaesectionis praestantiam ostendit. Et vltimo p. 168.
 Tandem capite quarundam cautelarum circa phlebo-
 tomiam in pleuritide mentionem facit, quorsum re-
 feruntur, contraindiantia, probe attendenda, qui-
 bus venaesectionem omittendam esse docetur, e. l.
 Int, critici motus, ipsaeque crises variis colatoriis
 excretae, grauiditas, et ipsa pleuritis ex alio morbo
 praegresso orta. Num et morbi grauitate vrgente?

X.

Memoire sur une question chirurgicale relative
 à la jurisprudence. Par M. LOUIS, Prof.
 et Cens. Roy. de Chir. Chirurg. Maj. Adj. de
 l'Hôpital de la Charité de Paris, 12. pag. 36
 f. anno et loco.

i. e.

Commentarius super quaestione chirurgica,
 quae cum iurisprudentia relationem habet.
 Auctore Cl. LOUIS.

Iuuenis quidam Autunensis duos alios stricto gla-
 dio aggressus, ab iis ense spoliebatur, atque in
 hac rixa supinus in terram cadebat. Nihil tamen
 inde incommodi sentiit, sed optima sanitate gau-
 dens, negotia sua solito more egit. Tandem post 16
 dies subito variolis corripiebatur, adeo quidem ma-
 gnis, vt ipso eruptionis die e viuis discederet. Ca-
 dauer post 37 dies a morte effossum est. Inuenie-
 bantur in eo hinc inde variae maculae rubrae, atque
 imprimis in occipitali regione sanguinis extrauasi
 satis magna copia. Sanguis hic niger erat et quo-
 dammodo fluidus. Calua ipsa illaesa erat, neque

in cerebro eiusque membranis aliae detegi poterant laesiones, quam quae a putredine prouenerant. Haec sectio et iudicium latum de accusati originem dederunt magnae controuersiae inter medicos et chirurgos Autunenses variarumque aliarum urbium, atque inter medicos Parisinos, Montispefulanos et Nemausiacos. Priores, sanguinis has effusiones pro effectu ictuum, mortuo ab accusati in conflictu illatorum, habebant, et hosce ictus ut mortis eius causam considerabant. Posteriores contentabant sanguinis extrauasionem pendere a putredine, aegrumque ex varioloso morbo periisse. Post varia in utramque partem prolata argumenta, quae Cl. LOUIS hic solita elegantia recenset, supremum tandem iudicium accusatos a crimine absoluit.

XI.

A new and general System of Midwifery. In four parts. By BRUDENELL EXTON M.D. of Kingston upon Thames. The second edition. London, printed for W. Owen, 1752. 8. pl. 13.

i. e.

Systema nouum et vniuersale artis obstetriciae in quatuor partes diuisum. Auctore BRUDENELL EXTON, M.D.

Cl. Auctor, qui se discipulum profitetur CHAPMANNI et MANNINGHAMI, clarissimorum quondam magistrorum artis obstetriciae inter Anglos, ipsamque hanc artem per plures annos Kingstoni exercet, praecipua artis momenta in breui hocce compendium obstetricum potissimum in
vsur

usum ita redegit, ut passim nonnullas adderet observationes, ex quibus tamen paucae praecipua aliqua attentione dignae sunt. Vniuersum autem opus in quatuor partes diuisit, quarum prima agit de grauiditate et grauidarum morbis, secunda de iis, quae in partu difficili agenda sunt, tertia de puerperarum et quarta de infantum morbis. Singulis vero morborum descriptionibus statim additae sunt plures formulae medicamentorum, ut satis appareat Auctorem tironibus et mulieribus, non vero eruditis scripsisse. Corporis exercitationem, quam per P. 40. omnem reliquam grauiditatem multum commendat, octauo mense prohibet, cum hoc tempore foetum, cuius caput ante hunc mensem versus fundum vteri directum esse solet, ita se circumuoluere putet, ut nunc orificium spectet, atque ipsa haec foetus circumuolutio et versio, si matris corpus agitur, facile turbari et praeternaturalis foetus situs oriri possit. Atque hoc ipso tempore circumuolutionis P. 51. nonnunquam per dolores spurios, aut cum veris mixtos, ex hac vteri irritatione, imprimis si foetus solito maiores sunt, orificium vteri ita dilatatur, ut caput et membranae digito explorantis se offerant, et partus proxime futuri signa adesse videantur. Quod si tamen tunc dolores per apta remedia sopiuntur, orificium quoque vteri iterum perfecte clauditur, et reliquum grauiditatis tempus optime ad finem perducitur. In agripparum partu brachia P. 69. non ante capitis in vtero retenti extractionem, Cl. Auctor soluit, sed ad DE VENTRI consilium ea vna cum capite extrahit, atque si vnum ex brachiis sponte prolabitur, statim manum vtero immitit, ne orificium vteri circa collum foetus contractum illum iugulet. Gemellorum adfert exemplum, quorum vno in lucem edito, duo dies praeter lapsi sunt, antequam alter in lucem obstetricantis

- p. 99. ope protraheretur. Eam vteri obliqui speciem, qua fundus versus os sacrum directus est, orificium vero supra os pubis positum esse solet, aliquoties p. 109. vidit. In vniuersum instrumentorum applicationi non multum fauet, excepto perforatorio, cuius loco cultrum linteo obuolutum adhibet, atque in casibus, vbi nunc forceps aut vectis ROONHUYSI adhibetur, sola manu ad caput soluendum vtitur.
- p. 133. Placenta in vtero ex spasmodica eiusdem constrictione retenta, expectationem commendat. In casu capitis abrupti et in vtero relictæ AMANDI reticulum adhibere iubet. In haemorrhagia post partum linthea Oxycrato madida abdomini puerperae applicata egregium vsum sibi praestitisse asserit.

XII.

Die Eisgebirge des Schweitzerlandes: beschrieben von
 GOTTLIEB SIGMUND GRUNER, Fürsprecher
vor den Zweyhundertten des Freystaates Bern
I. Theil, Bern, bey Abraham Wagner, Sohn
 1760. 8 mai. pl. 15. tab. aen. XV. *II. Theil*
ib. eod. pl. 14. tab. aen. VI. III. Theil, ib.
eod. pl. 14.

i. e.

Montes glaciales Heluetiae, descripti a GOTTLIEB SIGM. GRUNERO. Tom. I. II. III.

Multi quidem scriptores iam varias partes montium glacialium Heluetiae, inprimis Pagi Bernensis, descripserunt, Cl. vero Auctor primus est qui ex eorum scriptis et collectaneis, vel ei ab aliis communicatis, vel in ipsius itineribus factis, hauriens, integram descriptionem montium glacialium totius

totius Helvetiae hic nobis offert, quae eorum ambitum, nexum ac differentiam accurate explicat, atque simul mineralia, quae ibi inveniuntur, indicat. Diuidit vero hoc opus in tres tomos, quorum priores descriptionem historico-geographicam montium glacialium eorumque rerum maxime notabilium continet, tertius vero nonnullas obseruationes physicas huc spectantes tradit. Praecipuos etiam montes et eorum glaciem congestam *Gletscher* in elegantibus iconibus ad naturam delineatis declarauit, omnemque impendit operam, vt vniuersum hoc opus lectoribus suauissimum, et naturae cultoribus utilissimum redderet. Nos autem praecipua tantum, et ea inprimis, quae physicam partem spectant, ex hoc eruamus ac breuiter recenseamus.

Tomum Imum in octo sectiones diuisum Cl. Au- T. I.
tor incipit, ab itinere ad montes glaciales pagi Bernensis; progreditur ad eos, qui in valle Haseae superioris conspiciuntur; deinde ad eos, qui in Grindelia valle eminent; postea ii considerantur, qui in vallibus Lauterbrunnenfi, Candelensi, Frutingenfi et Simmea apparent; tandem ii describuntur, qui in ditione *Sanen* et *Aelen* inveniuntur; denique adduntur montes glaciales Valesiae, et septentrionales, et meridionales s. Alpes Penninenses. Titulum huius tomi exornat tabula aenea prima, quae sistit elegantem iconem vallis Lauterbrunnenfis. Vt autem nexus omnium montium glacialium Helvetiae magis pateat, Cl. Auctor adiecit mappam geographicam, qua pagos Bernensem, Vnterwaldensem ac totam Valesiam, cum eorum montibus glacialibus et signis mineralium ibi detegendorum delineat. In tab. III. egregie depingitur mons *Lauteraar* eiusque glacies congesta atque paries eius glacie obtectus sub nomine *Aar* s. *Zinke-*

Gletscher in tab. IV. ostenditur; sequitur postea in tab. V. glacies accumulata montis *Scheideck*, quod *Rosenlavigletscher* dicitur; deinde in tab. VI. eadem sylvae nigrae s. *Schwarzwaldgletscher*. Tab. VII. sistit montes glaciales Grindeliae, qui oculis iucundissimum spectaculum praebent. Tab. VIII. ostendit coaceruatam glaciem inferiorem Grindeliae. In tab. IX. videmus totum apparatus montium glacialium Grindeliae. Tab. X. sistit cataractam riuuli *Pletschbach* prope Lauterbrunnen. Tab. XI. delineat montes glaciales et glaciem congestam montis *Strubel*, vbi vortex latissimus glacie obtectus et montibus altissimis cinctus conspicitur; sequitur in tab. XII. prospectus glaciei vallis Simmeae, quod *Raetzliberggletscher* dicitur; in tab. XIII. glacies accumulata montis *Gelten* apparet, et tab. XIV. Rhodani originem ex eius glacie, *Rhone* s. *Furkengletscher* dicta explicat, tandemque tab. XV. icone exprimitur glacies coaceruata Fossigniaca.

- Attamen, cum vix accuratam harum rerum descriptionem hic tradere possimus, potius ex hoc primo tomo hinc illinc ea excerpturi sumus, quae
- p. 17. prae reliquis notatu digna videntur. In valle *Gentelboden* deprehenditur fons mirabilis Engstlanus, qui ab augusto vsque ad maium siccescit, et a quarta hora pomeridiana vsque ad octauam matutinam
- p. 49. aquam, quae nocte congelascit, effundere desinit. Triplicem originem Arolae fluminis eiusque progressum accuratius descripsit Cl. Auctor, quam SCHEUCH-
- p. 54. ZERUS. Praeter mineralia copiosa, in valle Hase-la superiori inprimis crySTALLIFODINAE variae notandae sunt, quarum vna ante 40 circiter annos in monte *Vorderzinkenstock* detecta est, quae omnium maxima putatur, cum orgyas 20 profunda ac 3 lata esset, et ad mille vsque centenas crySTALLORUM contineret, quarum vna octo centenas, plurimae 4-5
- cente-

centenas pondere aequarent. Cryſtalli et quarzo-
 ae concrectiones tantum generari ſolent in lapide,
 ex granulis maioribus conſtante, duro, quarzoſo,
 albidouiridi, *Geißbergerſtein* dicto, e quo plurimi
 altiorum montium Heluetiae conſtant, in lapidibus
 vero calcareis generantur concrementa lapidea ſpa-
 ſoſa. Cl. Auctor ipſe vidit iucundiſſimum ſpectacu- p. 72.
 um, cum ingens moles niuis a monte *Scheideck* ma-
 ximo cum fragore delaberetur aeremque obſcuraret,
 quod phaenomenon *Schneelavinen* dictum in tab. VI.
 cone ſimul expreſſum eſt. Vt rem ſingularem ad- p. 74.
 notat, baſin montis *Scheideck* conſtare ex ardeſia te-
 gulari coerulea et nigreſcente, cuius laminae ſaepe
 decliues, interdum perpendiculares ſunt. Flumen p. 78.
Litſchina nigra, dictum a congerie glaciei Grinde-
 liae ortum, non ab hac congerie, quae ardeſia ni-
 gra nititur, vti *ALTMANN* falſo putauit, particu-
 lis vitriolicis et ſulphureis impraegnatur hincque ni-
 gro colore tingitur, ſed potius a riuulo montis
Scheideck, ſuper ardeſiam nigram diu progrediente,
 nigredine afficitur. Ad radicem montis *Vieſcher*- p. 82.
orn notandus eſt locus niue ſemper deſtitutus, *heiſſe*
Blatten cognominatus, qui marmore nigro conſtat,
 et pyrites ſulphureos continet, humiditate incalc-
 centes. Aqua Litſchinae albae, a congerie gla- p. 89.
 ciali inferiori Grindeliae proficiſcentis, turbida qui-
 dem eſt et alba, attamen non, vti *ALTMANN* cre-
 dit, ab alueo ſuo calcareo et marmoreo hunc colo-
 rem accipit, ſed vti omnis aqua, ex glacie congeſta
 orta, alba eſt ac turbida. In valle Grindelia inueni- p. 95.
 tur pyrites cubicus, antimonium, marmora varia,
 ſpatha, quarza et mica. In valle Lauterbrunnenſi p. 104.
 maxime notatu digna eſt cataſta, quae *Staubbach*
 dicitur, quam riuulus *Pletſchbach* ſuper enormes
 rupes cadens ita format, vt in vapores ſoluatur aqua,
 et ſolis radii in illis ſplendidiſſimam iridem ſiſtant, vti
 E e 5 tab.

- tab. X. clarius docet. Altitudo huius cataraetae
1100 pedes Bernenses aequat. Ibi reperitur etiam
massa nigra, quae atramento Chinenfi valore vix
p. 127. cedit. Hos montes glaciales habitat capricornus,
qui maior est rupicapra, femoribus gracilibus, ca-
pite paruo, ceruino simili, cornibus ornato valde
nodosis, iisque saepe 18 libras pondere aequanti-
bus, ungulis bisulcis, acutis, quibus loca maxime
accliuia adscendit, isque ob velocitatem sagacita-
temque difficillime capi potest. In Simea valle in-
feriori prope *Diemtigen* scatet fons sebaceus, *Un-
schlitbrunnen*, cuius aqua, per se insipida, ad latera
vasis, vbi continetur, materiem pinguem, albam,
saepe rubescentem deponit, quae breui tempore
odorem carnis putridae assumit. In eadem valle
deprehenduntur thermae Weissenburgenses, qua-
rum aqua purissima odorem vitriolicum et saporem
lenem ac pinguem habet, tepida prorumpit, atque
1) spiritum sulphuris et vitrioli subtilissimum, 2) li-
mum fuscum et flores, quibus sulphur minerale au-
ratum inest, 3) sedimentum album, pauco sale
commixtum continet, eiusque vis cum vi therma-
rum Piperinarum conuenit. Circa has thermas
abundat petroleum, asphaltum, pyrites sulphureus
et vitriolicus, atque in vicina spelunca multum la-
p. 156. tis lunae reperitur. A monte *Lavenhorn* in ditione
Saanen proficiscitur riuulus incrustans, qui lapides
materia nigra, picea, sulphurea obducit, et pyri-
tem cubicum sulphureum in lapide nigro calcareo
p. 181. secum ducit. In hac ditione, praeter plura alia,
inprimis notari merentur salinae ditissimae, ad *Aqui-
legiam* et *Bevieux* reperiundae e pluribus fontibus
compositae, quarum centum librae salis exhibent
viginti quinque. Multum praeterea ibidem inue-
nitur salis gemmae, nec minus aqua sulphurea, quae
sulphur copiose deponit. Hae salinae olim omni
anno

anno 38000 centenas salis, nunc vero vix 9-10000
 peditarunt. In Vallesia ad oppidum Leucam si- p. 194.
 e sunt aquae Leucenses et frigidae, et calidae;
 riorum fons vnus in monte *auf der Alp* inuenitur,
 sulphureus est, et in cutaneis aliisque morbis salu-
 ris, alter *fons virginis Mariae* dicitur, vere tan-
 am scaturit et autumnno siccescit; posteriorum
 quinque sunt fontes, prope Leucam prorumpentes
 qua feruente, rubescente, pura, inodora, mense
 maio albida et turbida, spiritu vitrioli terraque mar-
 ali impraegnata. Eandem fere indolem habent p. 197.
 hermae Brigianae, attamen parum in vsu sunt. E
 acie congesta montis Furcae f. Bicornis, quae in
 b. XIV. delineatur, Rhodanus oritur, qui totam
 transgreditur Vallesiam, donec lacum Geneuensem
 tingerit. Hic arenam auream secum ducit, et e
 cu modo dicto rursus egrediens, quatuor circiter
 oras vltra Geneuam, per speluncam petrosam val-
 e angustam ac profundam magna cum velocitate
 uit. Prope oppidum *Champeiry*, non procul ab p. 221.
 rbe St. Mauriti in Vallesia, cataracta insignis, *Pis-*
vache dicta, silentio non praetereunda est, vbi sci-
 cet aqua ab altitudine 800 pedum perpendiculariter
 rupem obliquam descendit, tandemque Rhoda-
 um petit. Iter super montem St. Bernhardi ob
 ius creberrimas moles niuis delabentis periculo-
 am est.

In tomo II do, in nouem sectiones distributo, de T. II.
 cribit Cl. Auſtor montes glaciales praefecturarum
 Helueticarum in Italia sitarum, f. partem niue ob-
 ectam alpium Lepontiarum maiorum, deinde eos,
 ui in pago Vriensi inueniuntur, f. alpes Lepontias
 minores, Rhaeticas postea, f. montes glaciales Gri-
 onum, additis iis, qui in pago Glaronensi, Abba-
 scellenſi, Schwiza, Vnterwaldensi, et ditione
 Ange-

Angelimontana notatu digni sunt, tandem comparat montes glaciales Helueticos cum septentrionalibus. Vt horum nexus magis intelligatur, adiecimus mappam geographicam pagorum Schwizae, Glaronae, Vriae, Abbatisellae et Grisonum, in qua simul indicantur montium tractus et nomina, ac mineralia ibi latentia. Tab. II. ostendit pagi Vriensis montem *Gitschenen*, atque eius glaciem coaceruatam iuxta positam. Tab. III. sistit eam molem glaciei, quae *Blümlisalp gletscher* dicitur, ac ibidem reperitur. Tab. IV. eam indicat, quae in Paradiso Grisonum sub nomine *Rheinwaldgletscher* occurrit. In tab. V. videmus congestam glaciem, quam Grisoni *Berninagletscher* appellant, tandemque in tab. VI. delineatur glaciei congeries montis Abbatisellensis, *hohe Saentis* cognominati.

- p. 11. In valle sic dicta *Meythal* effoditur lapis lebetum albogriseus, fixus, e genere cretae cimoleae, pinguis, nec ab aqua soluendus, e quo ollae aliaque utensilia apyra fabricantur. Accuratam hic invenimus descriptionem montis St. Gotthardi montiumque vicinorum ad hunc pertinentium, eiusque lacuum et mineralium, nec minus originis variae fluminum, Ticini, Vrsae, Rhodani ac Rheni, eorumque progressus et vallium, quae transeunt, quae tamen cum breuiter vix recenseri possint, hic praeterimus.
- p. 14. In valle *in der Schoellenen* via per subterraneum montis *Kilcherberg* ducit, nec procul ab hoc deprehenditur pons diaboli, quae arcu maximum unam rupem cum altera coniungit, sub eaque catastrocta insignis est fluuii Vrsae. In loco *Unterschachen* in pago Vriensi est balneum minerale satis celebre ac salutare, quod olim calidae naturae fuerat.
- p. 46. Incolae vallis Rheni in Rhaetia, *Paradisum* dictae, sunt rudissimi, colore nigro flauo, propter clima valde frigidum, et carne ouium frigore demortuorum viuunt.

ulmento, quod praeparant ex farina et sale cum
 qua feruente mixto, idque post colaturam loco pa-
 sis edunt. Prope *Splügen* scaturit aqua martialis, p. 78.
 b nomine *Solterwasser* cognita, et prope *Madesin*
 ia acidulata; prope *Vogtswald* est fons tepidus ac
 lutaris. Duplex origo Rheni hic accurate disqui-
 tur. Porro notatur in valle Letschia acidulus non p. 80.
 u detectus; prope *Anders* balneum *rubrum* dictum, p. 90.
 uod sistit fontem sulphureum frigidum; nec pro-
 ul ab hoc fons *niger*, aestiuo tempore frigidissimus,
 ectatur. Alpes Iuliae Rhaeticae proferunt flumina p. 97.
 onum et *Mairam*, in earumque radice gignitur fons
 cidulus St. Mauritii, qui in paludoso humo ebullit
 um spuma copiosa, et vitriolo martis imbutus est.
 d pagum *Schuls* in Rhaetia duo fontes salini inue- p. 117.
 untur, vnus purus, alter turbidus griseus, quo-
 um vis purgans est; nec procul abinde septem aci-
 ali fontes profiliunt. Ditio *Brettigen* dicta qua- p. 124.
 ior balnea egregia continet. Prope oppidum *Bal-*
ers prorumpit fons St. Catharinae tam copiosus,
 e flumen exhibeat, et in eius vicinia inuenitur sic
 ctum *Flaescherbad*. Ad villam *Flemium* plurimi p. 128.
 uuli frigidissimi adsunt, quorum vsu incolae citius
 alui redduntur. In pago Glaronensi in alpibus p. 134.
Wichlerberge appellatis inuenitur balneum *Wichler-*
bad, quod sal, vitriolum et sulphur continet, et in-
 rimis vlcera sanat. In monte Flimsense notari
 neretur spelunca perforata St. Martini, *Martinsloch*
 icta. In monte *Wepcha* conspicitur balneum frigi- p. 136.
 um, e glacie liquefacta exortum, quod *Krauchtha-*
erbad appellatur, et in morbis oculorum aurium-
 ue ac arthritide commendatur. Pons *Bantenbruk*, p. 148.
 ui duas immensas rupes vno arcu connectit, valde p. 150.
 otatu dignus est, vt et bina loca linctoria montis
Fismat, s. rupes, sale ac nitro imbutae, quae a ma-
 nis gregibus rupicaprarum, inprimis tempore ple-
 nilunii

- nilunii ac nouilunii, frequentantur et lambuntur, quae facile ibi capiuntur. Rupicaprae huius montis semper lapidibus bezoardicis, quos aliae gerunt, destitutae sunt, ac ut plurimum gregatim inueniuntur, et semper custodem exponunt, nec canibus, sed insidiis potius capiuntur, vel ad loca deiiciuntur,
- p. 160. ubi non amplius effugere possunt. In monte *Suada* reperitur fons maialis, in quo nec sapo solui, nec legumina coqui possunt, quod WILLISIUS et PLOOT acido eius vitriolico, HOFFMANNUS tartaro eius tribuit, WALLERIUS vero, cui assentitur Cl. Auctor, eius partibus constituentibus nimis
- p. 162. crassis adscribit. Balneum minerale *Lochseiten* parum adhibetur; crebrius frequentatur ac praestantius est balneum inferiorum Vriensium, quod cuprum, martem, alumen, vitriolum et aurum continet. In pago Glaronensi, qui vndecim horas longus et nouem latus est, tanta alpium fertilitas adest, ut ibi quindecim millia pecudum plurimaeque oues rupicapraeque nutriantur, ibique etiam praeparatur caseus optimus *Schabziger* dictus, qui herbis odoratis, loto hortensi, trifolio odorato, cet. mixtus est.
- p. 168. In monte *Gunzenberg* ad *Sargans* crescit lignum durissimum et maxime ponderosum, quod Cl. Auctor adscribit exhalationibus mineralibus et succis huius montis, quippe qui multas mineras martis continet. Thermae Piperinae oriuntur ad radicem montis *Galanda* dicti, nec saporem, nec odorem, nec sedimentum habent; caloris sunt mutabilis, leuitatis insignis magnaeque efficaciae in
- p. 178. morbis, ab acrimonia vel infarctu oriundis. In montibus pagi Abbatisellae occurrunt variae speluncae, quae crystallis, stalactytibus, lacte lunae, cet. incrustantur, quarum praecipuae sunt in monte *Camor* prope balneum *Kobelweis*; porro alia *Wetterloch* dicta; *wilde Kirchlin* prope Abbatisellam; *Zigerloch* in

in monte *Altenalp*; alia in monte *Hohenfletschen*.
 in monte *Kronberg* est locus linctorius *Kronblatten* di- p. 181.
 tus, et fons mirabilis St. Iacobi, ob insigne frigus
 luberrimus; praeter ea varii fontes cuprei, sa-
 ni, sulphurei aluminosique ibidem deteguntur.
 In pagi Schwizae mons *Mytenberg* f. *Schweuzerhöken* p. 186.
 olim igniuomis fuisse videtur, ac in hoc pago etiam
 frequentatur fons frigidus *Rigibad* appellatus, in p. 190.
 Cephalaea, morbis renum et vteri praestantissimus,
 nec minus balneum, quod *Rungengullerbad* nuncu-
 atur, atque duo aciduli montis *Satelegg*. In pago p. 199.
 Unterwaldensi atque valle Angelimontana varii fon-
 tes maiales reperiuntur.

Finito tandem itinere montium glacialium totius p. 204.
 Helvetiae, Cl. Auctor hos montes cum illis regio-
 num septentrionalium comparat, iis nimirum, qui
 in Noruegia, Suecia, Islandia, Lapponia, Groenlandia,
 Nouazembla, cet. sunt, eosque quoad naturam, al-
 titudinem, gradum congelationis, vel cum Helue-
 ticiis conuenire, vel eos superare, quoad fertilita-
 tem vero Helueticis multo inferiores esse iudicat.
 Hi montes glaciales non oriri solent propter situm
 versus septentrionem, cum Helvetiae montes, niue
 obtekti, magis versus meridiem spectent, similesque
 t in aliis regionibus inueniantur, veras autem
 causas eorum originis Cl. Auctor in tertio tomo vl-
 terius disquirit.

Tomus enim tertius continet septem disquisi- T. III.
 tiones, quarum 1) concernit situm, partes con-
 stituentes, formam, pulchritudinem et altitudinem
 montium glacialium in genere, eorumque originem
 in specie; 2) valles glaciales, campos glacie obte-
 ktos et congeries glaciei considerat, eorumque or-
 um examinat; 3) de aetate montium glacialium;
 4) de glaciei natura et differentia agit; 5) res acci-
 denta-

dentales montium glacialium et glaciei coaceruatae explicat; 6) vsum et 7) pericula horum montium enarrat.

P. I.

Disquisitio I. Totum nexum montium glacialium diuidit Cl. Auctor 1) in montes petrosos, quorum superficies niue perpetua obtecta est, *Eisberge*; 2) in valles, glacie perpetua repletas, quas interstitia eorum sistunt, *Eisthaeler*; 3) in planities et campos parietum horum montium, niue et glacie nunquam liquecente tectos, *Eisfelder*; et 4) in glacies congestas, quibus interstitia eorum replentur, *Gletscher*. Priora pertinent ad partes essentielles montium glacialium, quartum ad eorum accidentales. Porro diuiduntur hae glacies congestae 1) in montes, e mera glacie compositos, *Gletscherberge*; 2) in sic dicta *Eischründe*, quae in montium glacialium interstitiis gignuntur; 3) in parietes glaciales

P. 4.

Eiswände; 4) in strata glaciei *Eislagen*. Situs montium glacialium maxime quidem diuersus est, altissimi tamen Heluetiae montes versus meridiem spectant. Vt plurimum constant, e saxo duro, inprimis e petrosilice vitrescente, altissimi autem e lapide quarzoso *Geisbergerstein* dicto, quem LINNAEUS *saxum micaceo-corneum, granulis puculatum*,

P. 12.

appellat, rarius e calcareo vel ardesiis. Forma horum montium inprimis in illis lateribus maxime accliuus est, vbi flumina magna valles transgrediuntur.

P. 26.

Mons St. Gotthardi, nec minus sic dictus *Jungfrauenhorn*, atque *Furca* reliquos altitudine superant, quorum prior, secundum MICHELI calculum, 2750 orgyas Gallicas, alter et tertius 2670 aequat, omnesque montes, ad niuem perpetuam retinendam, ad minimum 1500 orgyas altitudinis habeant, necessarium est, minores punctum congelationis vix attingunt, nec niue sempiterna teguntur. Causa, cur nix et glacies perdurent?

eorum

rum fitui altitudinique et inde pendenti aequali
adui frigoris adscribenda est, cum fastigia eorum
premiū frigidiorēque aerem attingant, quem
his radii vix calefacere possunt, unde vapores ad-
equentes congelascunt. Eadem profecto est ratio
montium, niue tectorum, sub zona torrida.

Disquisitio II. Valles glaciales oriuntur, si aqua p. 46.
interstitiis montium glacialium non libere efflue-
potest, sed quasi in cisterna colligitur, ibique in
glaciem mutatur, donec ad tantam altitudinem in-
ueuerit, ut aqua superflua liberius defluere queat.
Campi glaciales in latis planis montium altiorum, p. 50.
inter duos montes, intervallo plus mi-
nus plano coniunctos, inveniuntur ac oriuntur,
nix interdum ex parte liquefit et nocte rursus con-
gelascit, ut hinc sensim miscela niuis et glaciei haec
glaciem obtegat. Ex his autem partibus essentialibus
montium glacialium sensim enascuntur aliae conge-
les glaciei accidentales, quas Cl. Auctor *glaciarum* s. p. 53.
Gletscher appellat, quarum Ima species *Gletscherberg*
est moles glaciei in montis formam redactam at-
que hoc modo efficitur. Scilicet ab altitudine mon-
tium, qui valles glaciales cingunt, aestate aqua un-
de defluit, qua moles glaciei sensim a lateribus
soluitur, donec montis figuram ac-
quirat, imprimis cum semper monte altissimo a ca-
re meridionali defendatur. Species II. *Eischrün-* p. 59.
appellata, oritur, si aqua ex vallibus glacialibus
in valles inferiores defluit, congelat, easque sen-
sitim in glaciem, tanquam tegmine, obtegit. Haec aqua,
rupem offendit, citius congelascit; si humum
fertilem tangit, ferius in glaciem mutatur, nec un-
quam in humo fertili glacies coaceruari poterit.
Nam vero haec aqua per intervalla tantum defluat, p. 61.
et sensim sulcos profundos ducit in hac lamina
glaciei, hinc generantur tandem ab incremento

perpetuo superiori, et decremento inferiori, ab aqua defluente excitato, moles glaciales turriformes, quae decreſcunt, quo magis glacies congeſtæ increſcit. Haec tegmina glacialia ſuperius amplior ſunt, quam inferius, hinc deſcendendo maiore ſiunt iſtae moles turriformes, cum aqua inferiori

p. 65. profundiores ſulcos ducat, quam ſuperius. Spec. III. Parietes glaciales oriuntur a defluente aqua vallium glacialium, quae ſubito in parietem praecipitem finiuntur, nec moles glaciales formant, et ob ſitum ſoli, a quo defluens aqua proficiſcitur, et ob accreſcentum ſolis minus aequalem. Glacies vero horum parietum e tubulis perpendicularibus conſtat, ne

p. 67. facile liqueſcit. Spec. IV. ſtrata glacialia ſiſtit, quae vario modo generantur. Etenim, ſi valles glaciales decliues finiuntur, nec aqua defluens ſufficientem quietem habet, ut congelascat, tunc tam diu progreditur, donec ad loca planiora accedat ibique in glaciem conuertatur. Vel oriuntur niue diu perſiſtente, quae propter vicinos montes altiores ſole plane liqueſceri non poteſt, ſed interdum a pluuiis induratur et ſenſim congelat; ad quae quidem ſtrata augenda imprimis moles niuoſae ab alto delabentes plurimum conferunt. Sed procul dubio plures etiam ſpecies glaciei accumulatae, a ſitu diuerſo variisque rebus pendentes, inueniuntur. Reſtat deinde Cl. Auctor varias eruditorum opiniones quae originem montium glacialium ſpectant.

p. 90. *Diſquiſitio III.* Ab initio mundi montes adfuerunt, iiſque vel in aqua, vel eius ope, orti et coarctati ſunt, quod ex theoria globi terreſtris, ex angulis diuerſis ſerierum montium ſibi oppoſitorum eorum formis, ſtratis horizontalibus, mixtione, atque corporibus naturalibus ibi incluſis, patet. Helvetia, quamquam altiffima eſt regio Europae, tamen quondam a mare obteſta fuiſſe videtur, ſiue fuerit

uerit in creatione, siue in diluuiio, siue alio tem-
pore. Magna copia corporum marinorum in eius p. 93.
montibus, vel altissimis, inueniuntur, ac inprimis
es singularis est, magnam copiam concharum ma-
inarum vnius eiusdemque generis reperiri, vti de-
monstrant v. c. strata ostreis plena prope *Heutligen*,
ornua ammonis in fodina ardesiae nigrae prope
Meyringen, cochlitae, strombitae, conchae Vene-
is, corallia, helicitae, cet. in stratis semper solae
reperiundae. Ex his vero stratis conchaceis, atque
x stratis ardesiae, quibus mons *Scheideck* componi-
tur, non nisi in fundo maris generandis, concludit
l. Auctor, mare olim diu has regiones tegisse, et
a ipso diluuiio ad alia loca transisse. Tum enim, p. 108.

ti Noster cum SCHEUCHZERO putat, motus ter-
re circa axin ad tempus cessauit, hinc aquae ex al-
eis effluerunt, punctum grauitatis globi terrestris
mutatum est, et mare littora transgrediens hanc
niuersalem inundationem effecit. Hinc autem su-
perficie terrae soluta, dirupta et ad alia loca dedu-
ta est, ac noui montes vallesque, e stratis minus
ordinatis et corporibus marinis plenis compositae,
iebantur.

Disquisitio IV. Triplicem assumit Cl. Auctor p. 118.
speciem glaciei montium glacialium. In altioribus
nim montibus eorumque summitatibus non gla-
cies, sed indurata tantum et maxime compacta nix
est, quae primam speciem sistit; altera in vallibus
et campis glacialibus reperitur, quorum nix inter-
diu liquefit et noctu congelat, vt lamellae glaciei
pacae hinc oriantur; tertia in glaciei aceruis et de-
scensu vallium glacialium inuenitur, firmissima est,
sed parum pellucida. Omnes hae species duriores,
liuiores, constantiores et perfectiores sunt glacie
vulgari, sed minus pellucidae. Cl. Auctor ex hac p. 124.
glacie speculos causticos fecit. Aqua huius glaciei

multo leuior et salubrior est vulgari, eaque in loco clauso demum post tres menses turbida fit, nec nisi post tres annos sedimentum deponit tenue, viridescens, terreum.

p. 132. *Disquisitio V.* Montes vero glaciales et glaciei cumuli plurimis rebus accidentalibus obnoxii sunt cum saepe in montibus aequalis altitudinis nix non aequaliter perduret, id quod inprimis tribuendum est solo diuerso, siue petroso, siue fertili, siue m-

p. 134. neris referto. Inter accidentalia glaciei congesta porro referuntur fissurae, quae ibi saepe magnae cum fragore oriuntur v. c. si nimis haec glacies premitur a tegminibus glacialibus dependentibus, atque tum in loco debiliori, in quo nimirum maxime retinetur, finditur; vel, si tegmen glaciale a defluente aqua vel nimia pluuia fursum tollitur, aut superius ab hac obtegitur, tunc venti occlusi tandem findunt hanc glaciem, ac saepe magno cum tremore; vel si interdiu laminae glacialis fissurae aqua replentur quae nocte congelat, atque tunc, ob eius amplius

p. 140. spatium, lamina finditur. Alia accidentalia exhibent venti et flatus, e fissuris aceruorum glaciei exeuntes, qui plerumque pluuiam ac tempestates pra-

p. 142. nunciant. Incrementum et decrementum huius glaciei etiam ad accidentalia eius pertinet, quippe quae congeries glaciei, quamquam in dies maius spatium occupant, tamen inconstanter quolibet anno vel augentur, vel imminuuntur. Corpora peregrina, quae interdum in fissuras glaciei accumulatae illabuntur, vento ex his reiciuntur.

p. 160. *Disquisitio VI.* Vfus montium glacialium est multiplex. Suppeditant enim toti Heluetiae aeren purum, temperatum, sanum, copiosis effluuiis aeris ac ventis. Originem praebent quinque fluminum maiorum pluriumque minorum, quod duplici modo efficitur; 1) ex aquis internis in his montibus copiose

piose contentis, quarum vapores a niue et glacie
 colliguntur, inspissantur et in riuulos perpetuos
 utantur; 2) vel ex montium, vallium et aceruo-
 rum glacialium glacie liquefacta; vel ex eorum spe-
 ncis subterraneis, aqua plenis. Hyeme quidem
 rum aquae hinc proficiscitur, nunquam tamen
 ntes fluminum plane exarescunt. Praeterea su-
 entantur etiam flumina ab his montibus perpetua
 idem, attamen moderata copia aquarum, ad le-
 s hydrostaticas vltius distribuendarum, eorum-
 e celeritas progressus retardatur vel varia incur-
 tione ac profunditate aluei, vel stagnatione aquae
 lacubus, vbi simul depuratur. Hinc etiam ena-
 antur fontes minerales ac thermae copiosae, quae
 eorum radices prorumpunt. Cum enim isti
 ntes contineant multas marcasitas, mineras ful-
 uris et martis, alumen, ardesias, lithanthraces,
 ae humectatae incalescunt: facile ab illis defluens
 ua calorem constantem accipere potest. Nec
 nus balnea frigida saluberrima ex his montibus
 e atque glacie obiectis gignuntur, adeoque ipsa
 ua glaciei congestae in plurimis morbis vtilissima
 v. c. in dysenteria, diarrhoea, cephalalgia,
 ontalgia, cet. ac negat Cl. Auctor, huic aquae tri-
 endas esse incolarum strumas, quae potius ab vsu
 ae tophaceae pendeant. Cl. LANGHANS ex
 e glacie liquefacta spiritum eduxit antiphlogisti-
 m. Fontes periodici ab iisdem montibus profi-
 untur, iique vel vernali tempore profiliunt, et
 o finem aestatis exsiccantur, atque dicuntur *ma-*
es; vel quotidie interrumpuntur, ac *temporarii*
 pellantur; vel incerto tempore fluunt, quibus no-
 en *Hungerbrunnen* tribuitur. Priores e cauis sub-
 rancis nimis repletis aquam accipiunt; quae hye-
 e, vbi nix non liquecit, exsiccantur; secundi e
 nilibus receptaculis aquam hauriunt, et vsque ad

- depletionem eorum fluunt; tertii vel a nimis pluuiis sustentantur, vel, iis deficientibus, exsiccantur,
- p. 186. et in vtroque casu annonam grauem indicant. Porro hic inueniuntur copiosa metalla mineraeque, v. c. cupri, plumbi, martis, sulphuris, vitrioli, aluminis, quarum venae hos montes perreptant. Haec metalla hic facilius generari solent, ob duritiem rupium, quae vapores minerales melius recipiunt eosque diutius retinent sub tegminibus niuis et glaciei.
- p. 192. Subterraneae cryptae, crystallis incrustatae, saepe ibidem inueniuntur, quippe quae non raro horum parietibus horizontalibus adhaerent, interdum tamen in luto pingui fundi cauernae latent. Hi ventres crystallorum cognoscuntur e lapide petroso *Geisbergerstein*, et ex eius venis quarzosis, quae ligamenta crystallorum dicuntur. Ibidem denique aluntur plurima animalia ferocia, v. c. ursus, capri-cornus, ceruus, rupicapra, lupus, vulpis, castor, marmotta, cet. nec minus animalia volatilia, vt perdrix, tetrao, phasianus, pauo, aquila, vultur, vpupa, cet.
- p. 196. *Disquisitio VII.* Varia etiam pericula cum his montibus glacialibus coniuncta sunt. Vernali enim tempore venti, inprimis fauonius, tantopere faeuuit, vt saepe domos destruat, atque, cum calidae indolis sit, niuem lique scat et inundationes fluminum excitet.
- p. 198. Pericula eorum porro augent moles niuis, ab alto delabentes, *Schneelavinen* dictae, quarum tres species sunt; prima *Windlavinen* constat ex paruis moleculis niuis recentis, quae a vento ex altitudine montium hyeme deijciuntur, et in delapsu ab adhaerente niue insignem magnitudinem attingunt; secunda, *Schlag, Schloß, Grundlavinen* appellata, sistit moles niuis inueteratae, quae hyeme pondere suo recta via cadunt et omnia, quae iis obuiam veniunt, deuastant; tertia dicitur *Staublavinen* et

et niuem minus cohaerentem continet, quae delabens in puluerem ac vapores dissipatur, vti aestate crebrius fieri solet. Priores omnia quidem obuenientia inuoluunt, facilius autem euitari possunt, cum directa via progrediantur, quam tertia species a vento dirigenda. Priores hyeme excitari solent ab omni re, quae aerem mouet, v. c. lapidum delapsu, sono campanularum mulorum, clamore viatorum, pluuiis, ventis, rupicapris, auiculis, cetera. Tertia vero aestate a leui aeris motu accidit, scilicet, si lamina glaciei, qua nives montium altiorum cohaerent, liquefacta est. Si cadit eiusmodi moles nivis, spectatores auertant faciem, ne suffocentur; si constat e niue indurata, suffocatio vix effugitur; facilius, si e recente niue composita est. Homines ab eiusmodi mole inuoluti, atque hinc effossi, frigidae aquae immergantur, vt corpus glacie obducatur, postea tepidae, tandem balneo calido, atque sic plerumque refocillantur. Alia pericula proficiuntur a borea horum montium glacialium, quo homines mox rigescunt, indormiscunt, ac misere pereunt. Alia pendent a sulcis s. fissuris profundis glaciei coaceruatae, quae saepe niue obtectae sunt, in quibus homines illapsi sine auxilio moriuntur, vario tamen modo ab incolis praecauentur. Ignis p. 210, subterraneae horum montium interdum tremores terrae excitant ac montium partes deiiciunt, nonnumquam vero montes igniuomi in Heluetia detecti sunt. Tandem reiicit Cl. Auctor querelam consuetam incolarum, qui credunt, magnam istius regionis partem ab his montibus glacialibus plane inutilem reddi, atque comparando incommoda eorum cum commodis, illa ab his quam maxime superari putat, omniaque ad naturae leges prudentissimas, et ad declarandam summam Dei sapientiam esse ordinata.

XIII.

An essay towards a complete new System of Midwifry, theoretical and practical. In four Parts. By JOHN BURTON, M. D. London, printed for I. Hodges, 1751. 8. Alph. 1. pl. 5. tab. aen. 18.

i. e.

Tentamen noui et completi systematis theoriae et praxeos artis obstetriciae. Auctore IOH. BURTON, M. D.

Ex satis magna scriptorum, per hocce decennium editorum, atque ad artem obstetriciam pertinentium, copia, quorum censuram desiderare adhuc lectores nostri facile possent, non dubitauimus prae caeteris commemorare opus hoc Cl. BURTONI, qui artem medicam in vniuersum et in specie illam chirurgiae partem, quae parturientibus auxilium promittit, Eboraci in Anglia exercet. Egregie enim illud testatur de Auctoris Cl. diligentia in scriptorum optimorum lectione, et de insigni, quam tenet, artis theoria; licet de nouis instrumentis plurimisque artificiis, ab illo propositis et commendatis, fatendum nobis sit, ea nobis vix videri ita comparata, vt assensum possint mereri eorum, qui ipsi illa instrumenta adhibere tentauerint. Diuisum vero est vniuersum hocce opus in quatuor partes, quarum prima agit de pelui foeminarum, vtero, grauiditate, partu naturali, iisque, quae in illo agenda: secunda de grauidarum morbis, tertia de iis, quae in partu difficili, sine obstetricantis ope non soluendo, fieri debent, et quarta tandem de abortu et puerperarum morbis.

Ex

Ex pluribus vero vtilissimis obseruationibus, quas p. 1.
 ber hicce comprehendit, praecipue nobis attentio-
 e digna visa sunt ea, quae Auctor Cl. statim sub
 initio de pelui foeminarum ossea diuersisque eius
 imensionibus protulit, inprimis si comparantur
 um iis, quae alio loco de diametro aperturarum
 peluis superiore et inferiore, et dimensione capitis
 oetus, eiusque ad aperturas hasce proportionem
 disputat. Os coccygis vix vnquam putat caussam p. 6.
 artus difficilis esse posse, cum diameter aperturae
 peluis inferioris, linea ab ossibus pubis ad os coc-
 cygis ducta, maior sit distantia, quae est in supe-
 riore apertura, inter summam ossium pubis partem
 et os sacrum. Hinc quoque retropressionem ossis
 coccygis ope digiti, in vaginam immissi, quae ad ca-
 put ex inferiore apertura excutiendum vulgo com-
 mendatur, vt inutilem et noxiam reiicit, putatque
 semper, si caput in inferiore apertura retinetur,
 caussam huius morae positam esse vel in humero
 supra ossa pubis adhuc haerente, vel in nimia introi-
 tus vaginae angustia, ob quam caput perinaeo ve-
 vehementer apprimitur. Exemplo gemellorum, quo p. 59.
 um alter iam in lucem erat editus demonstrat, ne-
 lectam deligationem funiculi vmbilicalis, a placenta
 in vtero relicta propendentis, non nocuisse, neque
 matrem vllam haemorrhagiam inde passam esse.
 Narrat autem gemellos hosce habuisse duas placen-
 tas, a se inuicem plane distinctas. Nutritionem p. 71.
 oetus in vtero solius funiculi vmbilicalis ope fieri
 contendit, et exemplum adfert foeminae, quae,
 cet nullae plane sub partu aquae profluxissent, ve-
 etum tamen viuumque foetum peperit. In partu p. 105.
 naturali parturientis situm in dorso et latere reli-
 quis omnibus praefert. Orificium vteri, si retro ca p. 111.
 ut foetus per illud transiens nimia violentia pre-
 mitur, tam valide interdum se contrahere solet, vt

collum foetus constringat eumque iugulet. Quam ob rem haec ipsa retropressio moderate tantum, vti Auctor suadet, instituenda est.

p. 120. Porro refellit Noster Cl. OULD, qui ab initio partus alium capiti, alium thoraci foetus situm tribuit, vt ex eius opinione facies foetus non versus os sacrum conuersa sit, sed ad latus, aurisque vna anterior ossa pubis, altera posterior os sacrum respiciat, atque hac ratione minor capitis diameter minori diametro superioris aperturae peluis, maiori maiori respondeat. Docet enim foetus mentum semper thoraci eius appressum esse, neque vllam adesse vim, quae sub partus initium, hanc mutationem inducere possit; porro situm ab OULDIO vt naturalem descriptum, praeternaturalem esse, et partum difficilem inde reddi, cum caput, hac ratione situm, orificium vteri non satis expandere valeat.

p. 163. In partu ex nimia aperturae peluis angustia difficili, statim post primum aquarum effluxum versionem instituit Noster. Docuit enim eum experientia in hac partus difficiliore specie, caput foetus, si partus agripparum in modum absoluitur, facilius ex angusta pelui protrahi, quam si partus naturali ratione capite praeuio absoluitur. In versione nunquam foetum vnus tantum pedis ope extrahere tentat, vti alii iubent, sed semper alterum quoque pedem quaerit, atque ad caput in agripparum partu excutiendum conuersionem faciei ad latus, et digitorum, manu ita immissa, vt dorsum eius ventrem foetus respiciat, adplicationem ad aures, vt optima

p. 199. adminicula commendat. Contendit illam speciem peruersi situs foetus, in qua abdominis pars anterior se digito explorantis offert, pedes vero extenti in rectum sunt, fictitiam tantum esse, pedesque, abdomine ad orificium conuerso, semper eius lateribus appressos et flexos esse. Ceteras vero regulas

in

in versione foetus obseruandas omnes, cum in com-
pendium vix redigi queant, praeterimus.

De instrumentorum autem vsu in partu difficili,
manus auxilio non absoluendo, tenendum est, Au-
torem Cl. vncos plane reiicere, cum volumen ca-
pitis per instrumentum et manum augeatur, vncus
vero verticem capitis ex axi pelvis dimoueat et ma-
ter facile laedi possit. Neque magis fauet vncis
duobus, forcipis in modum iunctis, quos delineat,
cum ex eorum vsu facile perinaeum dilaceretur.

Reiicit quoque vsum, qui ante aliquot annos in An-
glia inprimis inualuerat, instrumenta ferrea obdu-
endi ope corii, spirae in modum circa illa ducti,
cum rugae facile oriantur, corioque madefacto ite-
rum siccato, illud rigidum et asperum fiat, et li-
quores intra corium penetrantes chalybem rubigine
efficiant. Forcipis vsum saepe dubium, nonnun-
quam noxium esse asserit, eandemque sententiam de

perforatoriis plurimis fert, tandemque nonnulla
instrumenta noua proponit, quae tamen ex nostra
videm mente vsui, ad quem a Nostro commen-
tantur, minus apta iudicanda sunt. Primum ex
his est perforatorium vaginae inclusum, quod extra-
ctorem dicit, cui alae duae vnciformes adfixae sunt,
quae vna cum perforatorio in cranium immissae,
incea retracta profiliunt, et ossibus caluariae adhae-
rentes extractioni capitis inseruiunt. Alterum est

alia extractoris species, ex quatuor vncis compo-
sa, qui etiam a se inuicem separantur, vt aquilae
pedem fere referant, quod instrumentum ex PA-
RI instrumento, pes gryphi dicto, natum esse vide-
tur. Huius quoque instrumenti ope, placenta post
partum retenta, orificium vteri clausum, cum vngu-
is clausis glandem fere referat, aperit et placentam
protrahit. Tertium est grallae siue fulcri subalaris
species, qua, si brachium foetus se offert, sub ala eius
adpli-

p. 383. adplicata, foetum reprimi situmque eius ita corrigi posse sibi persuadet, vt versio commodè institui possit. Quartum tandem est species forcipis recti, ad caput inclauatum excutiendum, quam omnibus aliis praefert. Dolores nimis vehementes post partum difficilem oriundos praecaueri vel tolli posse contendit, manu obstetricantis in vterum immissa et rotatorio quodam motu ita circumducta, vt grumi sanguinei, intra sinus vteri retenti, qui dolorum causa sunt, a manu et vtero ipso, lente se contrahente, in cavitatem vteri exprimantur et ex hac ipsa cavitatem manus demum ope protrahantur. Quod ad tabulas aeneas, huic libro iunctas, attinet, earum multae ab aliis sumtae sunt. Reliquae continent varias figuras, quae pertinent vel ad instrumenta ab Auctore proposita, vel ad vteri descriptionem anatomicam, vel ad diuersas species peruersi situs foetuum in vtero. Minime tamen illas Smellianis aequiparandas esse, nemo negabit.



XIV.

Letter to WILLIAM SMELLIE, M. D. containing critical and practical Remarks upon his Treatise on the Theory and Practice of Midwifry. By JOHN BURTON, M. D. London, printed for W. Owen, 1753. 8. pl. 17. tab. aen. 1.

i. e.

JOHN BURTON, M. D. Epistola ad GUILL. SMELLIE, M. D. continens varias observationes criticas et practicas in eiusdem tractatum de theoria ac praxi artis obstetriciae.

Incomia, quibus Cl. SMELLIE liber de theoria et praxi artis obstetriciae, de quo alio loco ad lectores retulimus *), in diario *Monthly Review* dicto ornatus fuit, et vituperationes, quas Cl. BURTONI tractatus, quem quoque indicauimus, ibidem expertus est, ita commouerunt animum viri doctissimi, vt peculiari hacce epistola SMELLIE merita deprimere, praestantiamque libri sui demonstratam facere Cl. Auctor decerneret. Nos quidem, quamquam etiam hoc exemplo didicimus, quam plerumque in eiusmodi scriptis polemicis, ab emulationis atque inuidiae potius, quam veritatis studio profectis, iniuriae aliorum famae ac meritis feri soleat, quippe etiam hic Cl. BURTON, SMELLIE in iniuste saepe reprehendere videtur; leuesne errores nimis amplificare; tamen nec hoc negamus, BURTONI in SMELLII librum animadversiones saepe quoque bono fundamento niti, multa-

*) vid. Comment. nostr. Supplem. P. II. p. 195 sq.

multaque huic epistolae inesse, quae obstetricantibus omnibus scitu maxime sint vtilia futura. Cum vero spatium hisce relationibus praescriptum vix patiatur, ut omnes animaduersiones atque singula capita ordine recenseamus, in quibus Cl. BURTON a Cl. SMELLIE dissentit; praecipua saltem adduxisse suffecerit, addito passim nostro de iisdem iudicio, paucis tantum verbis expresso.

- p. 156. Prima et grauissima reprehensio, quam Auctor contra Cl. SMELLIE profert, versatur circa historiam artis obstetriciae et catalogum auctorum, quod de ea scripserunt, quae in re SMELLIUM saepe errasse, multaque omisisse vel non accurate expressisse, recte Noster asserit. Inprimis autem id agit ut ostendat, SMELLIUM auctores ipsos, quos adducit, non legisse, sed plurima sumxisse ex SPACHIO FREINDIO, et LE CLERC. Dum vero Cl. BURTON ad hunc defectum supplendum nouum catalogum scriptorum, a SMELLIE omissorum, adducit ex hoc nouo catalogo non sine veritatis specie coniecerit aliquis, ipsum quoque Cl. BURTON eundem ex aliis, et nisi vehementer fallimur, ex Celli HALLERI methodo studii medici exscripsisse. Grauius omnino argumenta Auctor Cl. adfert contra methodum a SMELLIE commendatam, quae ille in foetu debiliore vel mortuo simili non respirante in lucem edito, funiculum vmbilicalem non ligat, et placentam in vtero adhuc per aliquod tempus relinquit, aut si ea subito vna cum foetu egressa est, eam vino tepido fouet, ut vis circulationis in foetu augeatur. Neque minori cum iure obliquitatem vteri, quam SMELLIE quodam loco negauit, licet alibi eandem pro vera agnouerit, fortiter defendit.
- p. 48. Idem quoque valet de reprehensione methodi, quae
183. Cl. SMELLIE in haemorrhagiis grauidarum, quae ultimis gestationis mensibus accidunt, vterum tantum

um aperit et aquarum vesicam rumpit, ipsam autem versionem non instituit, sed reliquum partum naturali modo naturae absoluendum relinquit. Mi- p. 51.
 noris momenti est defensio Cl. LA MOTHE, contra SMELLIE, qui eundem in suo libro hoc nomine accusauerat, quasi eos tantum casus commemorasset, qui faustum exitum habuerunt, studio vero reliquos silentio oppresisse.

Anatomicas descriptiones a Cl. SMELLIE data- p. 74.
 as omnes acriter reprehendit, qua in re omnino ei concedendum est, illas, si ad subtilioris anatomies regulas exigantur, erroribus non destitutas esse. At tamen vix putamus, deesse in iis aliquid, quod obstetricanti ad excolendam artem suam necessarium sit. Coccygis officulum parum mobile esse, vltius p. 80.
 adhuc Noster confirmat et artificium, quo illud a multis retropremitur, inutile arbitratur. Atque eodem modo sentit etiam de descriptione situs foetus in vtero a Cl. SMELLIE data, diuersaque huius situs pro diuersis grauiditatis temporibus mutatione. Negat caput infantis iam sexto mense ad octauumque ab obstetricante, explorationem instituyente, tangi posse, putatque caput semper per omnem grauiditatem fundum spectare, sub initium vero parius ad orificium descendere, atque hoc tempore, quo supra os sacrum descendit, illud ab rotundo cubere huius ossis delabi et ad latus conuerti. Mi- p. 103.
 nime concedit Noster, chorion cum interna vteri superficie cohaerere, a qua illud mucro quodam interiecto separatum esse asserit; aut placentam ex p. 107.
 parte separatam cum vtero iterum quodammodo conglutinari posse. Acriter quoque vt inutile et noxium reprehendit artificium a SMELLIE commendatum, in ea partus specie, quae retardatur a funiculo vmbilicali, circa collum foetus circumuoluta, qui efficit, vt post quemuis dolorem caput ex orificio

- orificio iam expreſſum iterum adſcendat, vbi Cl. SMELLIE duobus digitis recto intestino immiſſis ſemper caput, durante dolorum accēſſu, retinet, ne
- p. 109. iterum adſcendere poſſit. Negat quoque orificium vteri, capite iam in lucem edito, circa collum foetus ſe contrahere et partui abſoluendo impedimento eſſe poſſe, qua in re Cl. BURTON illis, quae in tentamine, de quo paulo ante retulimus, aſſeruit *).
- p. 111. repugnat. Errat quoque Noſter, dum contra Cl. SMELLIE negat, dolores ad partum in plethoricis accelerari poſſe venaefectionis ope, quod tamen frequenter fieri et ratio ſuadet et experientia docet. Magis nobis placent, quae contra artificia proferuntur, quibus Cl. SMELLIE placentiam aut caput abruptum extrahere tentauit, in quibus potiffimum fortio-rem compreſſionem abdominis puerperae, quam SMELLIE ab adſtante vult exerceri, vt noxiam damnat. Tuſſim vero, quam multi obſtetricantes puerperis ad placentae expulſionem exercendam ſuadent, tanto- pere noxiam iudicare vix poſſumus, licet concedamus, parum tantum ex hac re commodi exſpectari poſſe.
- p. 118. Accedit tandem ad verſionem, de cuius uſu et periculis multa notatu haud indigna adfert, eiusque uſum forcipis uſui multum praefert. Putat enim forcipis applicatione cerebrum foetus ita comprimi, vt ei pereundum ſit, compreſſionemque talem longe vehementiorem eſſe ea, quam caput foetus edu-cti verſione per anguſtam pelvis aperturam patitur. Plures tamen ſub verſione, quam ſub forcipis adpli-catione infantes perire, res eſt noſtris obſtetricibus experientia comprobata. Iubet quoque Cl. Auctor, vti iam alio loco fecit, vt in omni pelvis anguſtia ſtatim verſio inſtituatur, atque narrat, ſe ipſum hac
ratione

*) vid. Eſſay p. 111.

tione infantes viuos in lucem protraxisse, quorum capita circumferentiam 19 pollicum habebant.

Vrget dolores, quos patitur puerpera, dum per ratione volumen capitis foetus minuitur, vt praesentiam huius artificii magis dubiam reddat, cum men notum sit, versione dolores vix minores a puerperis generari. Nouam porro fasciam, stilo ela-P. 133.

co munitam, ad caput excutiendum proponit, quae Smelliana parum differt *), atque vbi de forcipis p. 136.

applicatione disputat, saepe res leuissimi momenti inquam grauissimos errores reprehendit, v. c. dum SMELLIE vas, aqua calida repletum, in cubile porre iubet, cui instrumenta immittit, cuius aquae vapores puerperae lethales futuros esse Noster putat. Forcitem Cl. SMELLIE Noster puerperae primo ex eo nocere putat, quod, cum dimensiones eius non ad diuersam dimensionem partium in diversis foeminis adaptari possint, ille puerperam, cui partes angustae sunt, facile laedere queat, et inde, quod corio obductus sit, cuius rei noxam eo loco declarauit. Hinc Cl. BURTON, quam se proposuit forcipis speciem, Smelliano longe preferendam iudicat, vti et suam methodum ad applicandi eam, quam cum Smelliana comparat. Ca-p. 144.

infantis, supra aperturam superiorem positum, forcipis ope, vt vult Cl. SMELLIE, retrudi paululum et ita dirigi posse, vt minor capitis diameter minori aperturae diametro respondeat, dubium Nonne quam maxime videtur.

Forficis Smellianae vsum quoque damnat, quia p. 160. sine operculo intra vterum dimittenda foret, quae adeo facile laedere, vel in perforatione ipsa manio degliscere, aut, brachiis expansis, vterum vulne-

vid. Supplem. P. II, p. 209.

Supplement. III.

Gg

vulnerare possit; porro etiam, quia aperturam non satis magnam efficiat, vt digitus vel vncus vix per illam inferri possint. Praefert etiam, vti vbique, ita etiam hic artificia et instrumenta sua, extractorem

p. 178. scilicet, eiusque adplicationem longe faciliorem et breuiorem esse Smelliani perforatorii vsu, comparisone harum methodorum facta, probare annititur. Capite in agripparum partu retento, digitos non ori immittit, sed alio artificio vtitur, quod in *tentamine* suo iam explicauit. Caput et humeros, dum in versione pedes quaeruntur, non violentia quadam reprimendos esse docet, cum vterus hoc modo laedi possit, quod et de omnium remediorum externorum adplicatione in haemorrhagia, partum insequen-

p. 227. te, valet. In meconii expulsionem leniora purgantia reiicit, et potu tantum diluente et clysmatibus eius excretionem promouere tentat. Adnexa est defensio prioris libri Auctoris Cl. aduersus iudicium, quod Auctores diarii *Monthly Review* dicti, de eo tulerunt. Addita quoque est tabula aenea, in qua fascia illa, stilo elastico instructa, quam Auctor superius proposuit, et varia instrumenta ALBUCASIS et PARAEI delineantur. Inter illa est *forceps longa et tersa* RUEFFII, quam Auctor in explicatione figurae falso PARAEO adscribit.



XV.

Dagbok öfver en Ostindisk Resa, Åren 1750.
1751. 1752. Med Anmärkningar uti Na-
turkunnigheten, främmande Folkslags Språk,
Seder, Hushållning, m. m. På fleras Åftun-
dan utgifven af PEHR OSBECK, Kongl.
Sv. Vettenskaps Societetens Ledamot. Iåm-
te 12 Tabeller och afledne Skepps-Predi-
kanten TORENS Bref. Stockholm, tryckt
hos Lor. Ludv. Grefing, på dess egen be-
kostnad, 1757, 8 mai. Alph. 1. pl. 2.

i. e.

iarium super itinere in Indiam orientalem an-
nis 1750, 1751, 1752 instituto, comple-
ctens obseruationes, quae ad historiam na-
turalem, peregrinarum gentium linguas,
mores, vitae genus etc. spectant, editum
complurium exhortatione a PETRO OS-
BECK, additis 12 tabulis et litteris b. TO-
RENS, sacerdotis naualis.

praefuit Reu. Auctor, per tempus modo indica-
tum, rebus sacris in nauigio Suecico, Indiam
orientalem, Cantonum nominatim Chinensis regni,
tente, obeundis. Quae in hoc itinere obserua-
tione notatu digniora cuiuscunque argumenti, litteris
diligenter mandauit, quo et ipse animum in nauiga-
tione protracta moraque taedii plena recrearet, et
patrios lares redux haberet, quod ad incremen-
tum scientiarum offerret. Quod vero solet in re-
motiores regiones per mare peregrinantibus accide-
re, ut praeter locum sibi praefixum ad alios necessi-

Gg 2

tate

tate ducti in itinere appellant, alios insuper bene multos, licet e longinquo, salutent: hoc Nostro quoque contigit. Vnde factum, vt, quum nauis Sueciae Gothoburgi valedicens, cursum per mare Hispanicum ad portum Gaditanum flecteret, inque ea vrbe mora capta, insulas Canarienses, tum Bonae Spei Caput praeterueheretur, postquam denique per aliquot dies ad insulam Iauam substitisset, absque vlla vltiori mora iter in Chinam conficeret; fu-
reditum vero Iauam iterum, dein Ascensionis insulam tangeret: nata Nostro gratissima opportunitas est, sciendi, quo stimulatur, desiderium demulcerendi. Hoc vero licet non vna tantum in re defixum teneret: naturali tamen scientiae plurimum deditam propria in eam propensione, quam Cl. Equit. LINNE', cuius institutionibus in academia fruitus erat, incitamentis inuitatus. Nec in hoc campo trita modo et iam pluries indagata collegit, sed multa antea cognita curatius definiuit, alia plane noua detexit, iamiam in honorem inuentoris ab Ill. LINNE' libro specierum plantarum titulo insignito et systemate naturae excepta. Prolixiores autem eorum omnium descriptiones hoc ipso opere comprehenduntur, quarum pleraeque latino idiomate concinnatae sunt. Huius generis observationibus nobis vnice hic loci inhaerere licet, quas vt reliquas omnes, sparsim mixtimque secundum dierum seriem exarauit; quod scribendi genus id a minimum commodi habet, quod grata varietas animum delectet.

Initium narrationis fiet ab iis, quae Auctori in Hispania, inprimis Gadibus et vrbe *Puerto de Santa Maria*, memoratu digniora obuenerunt. Ibidem stipa tenacissima loco cannabis pro conficiendis funibus nauium adhibetur, qui ipsi tantae firmitatis sunt, vt picis liquidae litura non indigeant. Haec

Noste

offer referens simul Elymum auenarium pro eo-
 m scopo, periculi caussa, commendat. Ex ea-
 m stipa etiam pauimentorum tegmina texuntur.
 xiae cardinalis pabulum capfici frutescentis semina p. 16.
 untur esse. Matrimonia adeo mature apud Hi- p. 20.
 anos ineuntur, vt puero 14, et puellae 12 anno-
 m coniugii ius concedatur. Origano cretico Hi- p. 30.
 ani non solum cibos suos condiunt, sed eius ma-
 am partem, ad Chinenfes, quibus in deliciis est,
 nsuehant. Lignum, quod combustioni in aedi- p. 33.
 s inferuit, non mensura, sed pondere venditur,
 sique genera sunt lignum oleae, pini Hispanicae,
 vt Nostro relatum, quoque suberis. Fumus ta- p. 36.
 ci infantibus aequae, ac adultis gratissimus, ad quem
 tem hauriendum, omiffa fistula, conuoluta folia,
 eadem concisa et chartae immiffa, vsurpant.
 gnis laudibus Noster spartium monospermum p. 39.
 ope mare crescens, praedicat, cum ad arenam
 uem, vento nimium obsecundantem, compescen-
 n, tum ad pastum commodum capris concilian-
 n, quibus accedit vsus ramorum loco vinculorum
 vinciendis variis rebus, et totius plantae, ad
 bram capris suisque, folis calore grauante, im-
 tiendam. Folia crithmi maritimi sub esu carnis p. 40.
 e, acetarii loco, sunt. Citrus medica, auran-
 n et sinensis plerumque iuxta se inuicem in hor-
 collocatae reperiuntur. Quarum arborum cul-
 ad tantum fastigium fertur ibidem esse euecta,
 hortulani hospitibus suis fructum offerre queant,
 rum vna pars ex malo citreo, altera ex aurantio,
 ia ex sinensi constet. Phoenix dactylifera hinc p. 41.
 in media parte hortorum, et ad monasteria fa-
 Nostro occurrit. In vinetis autem amygdalus
 communis, et in campis amplissimis olea. Creber p. 41.
 s agaves americanae fit non ad sepes modo, sed
 mis ad varia texturae genera. Dolores quoque
 Gg 3 im-po-

- impositis foliis affatis, et luem veneream succo radicis apud Americanos curari, Auctori narratum
- p. 45. est. Ita et cactus opuntia in aggeribus aptum munimentum praebet. Arundinem donacem crebro ad scipiones et virgulas piscibus capiendis idoneas adhibent. Ex foliis chamaeropsis humilis scopae nectuntur eademque ad vincienda varia commodae sunt, radix vero eius recens in cibum vertitur. Obuiam Nostro venit alicubi sylua pinea horti instar sepibus ex agaue circumdata, quod raritatem pini indicat. Vnde et cistae ex hac arbore, in quibus mala citrea transmittuntur, pretio saepe ipsa mala superant. Nomine Saltamatas veniunt gryllae quaedam insignis magnitudinis in arboribus degentes, quae ipsa insecta facile non attentos satis auis specie fallunt. Est et alia gryllarum species,
- p. 52. quam Hispani in peculiaribus caueis alunt. In insula *Puerto de Santa Maria* detexit Noster plantam a nemine ante visam, verbascum OSBECKII.
- p. 62. Mora per 10 hebdomadas in Hispania facta, iter continuatum est. Improviso vero accidit, vt accipiter lat. 33 gr. 15 min. vpupa, Suecica auis, naui mensis martio aduolaret, comitemque per plagam insignem sese adiungeret. Haud procul ab insulis Canariensibus piscis iste volans, exocoetus, sese conspicendum dedit. Gravior vero non potuit non esse Nostro aduentus hirundinis madidae quum de commoratione hirundinum per hiemem lucem accendat.
- p. 66. Sepia loligo non minus ac exocoetus volandi vi instructa est. Chinenfibus ferunt istam in cibum transire. Ampla squali conducta (*Hay*), qui ex primariis piscibus rapacibus est, legitur historia. Vix eius, nisi pars caudae proxima comeditur; cutis vero sub nomine *Chagrin* tanto notior est; et quae in sinibus duobus super oculis colligitur materia alba et spissa, ad menses pellendo
- vsur

surpatur. Socium sibi continuum habet scom-
ri speciem, qui praedam illi monstrare credi-
tur, vtpote quum ipse squalus segnioris natu-
rae sit.

Viciniam Capitis Bonae Spei nunciauit procella- p. 75.
a capensis, quae ad lat. 33 gr. 16 min. magna co-
la aduolauit. Sub lat. gr. 34, quo peruenit naus
6 maii, ob frigus aëris insigne vestimenta hiema-
a induere oportuit. Procellariae aequinoctialis p. 77.
luentus a nautis futurae tempestatis indicium
abetur.

Plantarum auiumque Iauanensium accurata legi- p. 91.
r descriptio, licet dolendum, Auctori nostro mo-
o per breue tempus in insula commorari, nec nisi
tremam eius oram visere licitum fuisse. Inter
rpes coccum nuciferam eiusque nucem, tam
oad structuram, quam vsum varium fusc persequi-
r. Accedit succus huius arboris ad praeparatio-
em liquoris arrack. Nec medica arboris virtus
inus insignis est. De vespertilionibus id singulare p. 105.
rrat Auctor, quod semper vesperi ex insula Su-
atra in Iauam sese conferant, redituri proximo p. 107.
ane. Auem, diomedea piscatoria dictam, radici,
nisi nauigio infidentem, vento fuisse propulsam ob-
ruauit. Vorax istud praecipue pinguedinis inse- p. 109.
um, blatta orientalis, ex India Gothoburgum
im translatum fuit; cuius gratissima praeda cimex
Etularius censetur, adeo vt, nisi ipsa esset metuenda,
o cimice domando inferuire posset.

Quae nunc sequuntur ad Chinam pertinent, quo
uctor, 5 mensibus exactis, postquam portum Ga-
tanum dimisisset, peruenit. Eximia multa de
atu regni Chinenfis, de gentis sagacitate et astutia,
onetis, computandi ratione, opificiis, de nauium
inorum et scapharum constructione et vfu apud
undem, de commercio Europaeorum etc. recen-

- sentur, sed, quod dolemus, a scopo nostro aliena. Hinc, ut hucusque factum est, praecipua capita, quae naturalem cognitionem locupletant, excutimus.
- p. 128. *Oryza* abundantissime Cantoni colitur et, annonae caritate orta, aliquot millia hominum huc al-
- p. 134. *licit*. *Lacertae Chinenfis* tanta est in scandendo dexteritas, ut aulaea papyracea, parietibus affixa, summa
- p. 144. *velocitate ascendat*. *Pharmacopolia Cantoni* perquirens nunquam observavit Noster diuerforum medicaminum miscelam; sed simplicia modo, sine formula, ab aegris sunt quaesita. *Radicem ninsi* et *ginseng* animaduertimus, Auctorem pro vna eademque habere; cuius semiuncia, quum Auctor Cantoni versaretur, 30 - 48 semiunciarum argenti puri pretio vendebatur. Confirmat quoque bonam huius partem ex America transferri, licet Chineses vilioris esse virtutis Americanam, lucri sine dubio causa, asseuerent. Dolet vero, se tam ob inscitiam Chinesium in descriptione morborum et plantarum, quam ob nimiam taciturnitatem, nec raro falsas narrationes, nihil certi de virtute medicamentorum ex-
- p. 149. *plorare potuisse*. De Chinesium perspicacia, quae omnia in suum commodum vertere norunt, vel hoc testari potest, quod tonsores sedulo capillos et barbas pro agris stercorendis colligant. Hi homines, ut cursum sanguinis quibusdam in morbis accelerent, fricant caeduntque corpus aegri pugnibus, brachiaque aliosque artus extendunt grauiter. Distincti isti catena, variis instrumentis instructa et humeris gestata, in plateis incedunt, officia sua in vnguibus praecidendis et pilis narium et superciliorum
- p. 151. *refecandis vltro offerentes*. Ex *oryza* vinum istud adustum famsu parant, non vero, ut multi existimant, liquorem arrack dictum, quem Chineses ex Belgio emunt, siquidem cocci nuces, ex quibus arrack fit, hic loci non crescant. Laudat vero

Noster

Noster eorum in liquorum spirituosorum vsu abstinentiam, adeo vt ne vllum ebrium per totum tempus, quo inter istos vitam degit, obseruauerit. Mo. P. 157.
 chus vesicis inclusum Cantonum Tonkino affertur.
 ria ista theae genera et modum cistis eam im. P. 158.
 mittendi curate Noster describit. Discrimen inter
 heam boheam et theam viridem in vstulationis
 oliorum diuersa ratione consistere modo arbitratur,
 t ad hanc laminam cupream, ad illam autem lami-
 am ferream adhiberi. Rhabarbari radices recen. p. 162.
 es Cantoni vidit, vnde probabile, non procul ab-
 ine crescere. Paucis verbis repetit Auctor, quae
 de fructus arboris arecae masticatione nota sunt.
 Auium nidus, vt in officinis dicitur, coloris albi et
 nstar ichthyocollae pellucidus pro cibo, vtut pre-
 ioso, inseruit. Feminae, loco manicae pelleae p. 170.
Muffe), vt frigus hieme auertant, manibus cotur-
 nicem tenent. Vngues, quos vilioris sortis homi-
 nes praecidunt, praestantioris fortunae homines
 bere crescere sinunt, noctuque thecis ex ligno
 ambu tegunt. Infantibus pauperum fructus cucur. p. 172.
 itae lagenariae (*Calabass*) alligatur, vt, quodsi sub
 natrum, eos in suo dorso gestantium, in scaphis
 negotiis in fluuium inciderent, fundum non petant.
 Narrat quoque Cl. Auctor, quoniam ob nimiam
 nominum copiam, alimenta haud raro deficiunt,
 parentibus veniam esse datam puellas minores in flu-
 uium proiiciendi; quod si fit, alligant tamen fru-
 ctum dictum, vt ab homine ditiori et misericordia
 moto vitae possint dispendio eripi. Pueri autem,
 quos enutrire parentibus non suppetit, impensis pu-
 blicis aluntur. Papyrus Chinenfium maxime vul. p. 174.
 garis ex cortice interiori arboris bambu conflatur,
 valdeque tenuis est, vnde penicillis ad litteras in ea
 exarandas vtuntur, atramento, Tusch intinctis.
 Virgas quoque, quibus criminis accusati homines p. 182.

p. 187. caeduntur, ex dicta stirpe sumunt. Cibis ter vel quater per diem vtuntur, eisque simplicissimis, sed largis. His quoque ranae, et vt quidem retulerunt, equorum, canum, gliriumque carnes inferuiunt.

p. 188. Ouium cornua exigua, earumque caudae breues et latae sunt, et ex mera fere pinguedine constant. Ob earum culturam neglectam pretio maiori vendunt. Suibus insignior, quam in Europa, fertilitas est, minorque sordities, vnde instar canum in aedibus aluntur. Vt et hic exstet Chinenfium astutiae ad lucrum faciendum exemplum, referre iuuat, quod haud raro pennas gallinarum vulgarium arte crispent, vt pro gallinis crispis (*purrhöns*) habeantur.

p. 190. Oeconomiam, in primis agrorum et hortorum culturam, commendatissimam sibi Chinenfes habent, imperatoris exemplo et incitamento inflammati. Ex culinaribus plantis multae sunt, alias non obviae; quarum sequentes praeter oryzam, cannam sacchariferam et tubera conuoluuli botatos memorantur. Legumina dolichos sinensis, ex quo ferculum cascadeum figura referens paratur, et phaseoli max, fructus trapae bicornis, fructus komkatt, qui species citri est, fructus quidam ai-qua dictus, fructus pariter auerhoae bilimbi, aliusque fructus plantae läm-tjes, latjes, cussambii vt videtur RUMPHII, musae paradisiacae, mangiferae indicae, psidii guaianae, sinapis orientalis, fructus oleae chinenfis, radices nymphaeae nelumbo, bambu, dioscoraeae alatae, arachis hypogaeae, zingiberis, tubera esculenta, brassica chinenfis, folia conuoluuli reptantis, piperis betles, agarici chinenfis. Ex plantis vero apud nos etiam vsitatis sunt, pisa, fructus mali sinensis et citri grandis, variaque pomorum genera, cucurbitae, melones, cucumeres, allia varia, radix raphani fatiui, rapae longae, dauci albi, spinacia, apium

pium dulce. Aqua nulla alia, quam ex fluuio hausta p. 196.
Cantoni exstat. Ad quam gratiorem reddendam
neam pro potu incoquunt. Theae infusum abs-
que saccharo et lacte bibunt. Vinum chinense ex p. 197.
fructu pausio dicto exprimitur, qui censetur cresce-
re in consueta vite vinifera. Quoniam autem in-
ratum est, ex Europa alia vinorum genera magna
 copia transferuntur. Cereuisia nulla coquitur. Nec p. 197.
offea haftenus genti arrisit.

Inter morbos magis istis familiaris est caecitas,
quam absit, vt ab oryza cum aliis multis Auctor de-
scriuet, vt potius vapores ex stercorebus ascenden-
tes, halitus vernicis acres, fumum ex accensis lignis
illis dicatis aëra replentem aliaque accuset. Pleri-
que tamen caeci, inde a natiuitate visu priuati, re-
periuntur, Phthisis pulmonalis glutine ex pelle asi-
atica, oki-ao dicto sanari dicitur. Frequens quo-
que malum vlcera et bubones sunt.

Lignorum defectum ad focos carbones suppleant. p. 201.
Omittere oportet nos catalogum istum plantarum
Chinensium, quarum multas Auctor prolixè de-
scripsit, alias nomine modo indicauit, cancellis no-
minibus praefixis impeditos. Qui ipsi nec permittunt
aves, pisces, insecta etc. reperta attingere. Aui p. 207.
Cannae officinalis fructu, pharmacopolis anacardium
orientale nominato, litteras suas pannis gossypinis
et mucciniis inscribunt, quae ne deleantur, dum ad-
huc madent, calce vina insperguntur. Digna imi p. 211.
tatione Europaeorum sunt, quae de humatione
mortuorum Noster recenset, quod scilicet nunquam
nisi extra vrbes sepeliantur.

Ob eximiam rei herbariae scientiam, in hono- p. 213.
rem Auctoris, planta quaedam Osbeckiae chinen-
sis nomine ab Ill. A LINNE' nuncupata est, lyfi-
machiae maxime affinis, quam et ipse Cantoni detexit
et fusa hic descriptione instruxit. In colica cum
specie

- specie quadam theae infusa potatur, ad discutien-
dos vero tumores et hernias fomentum eius appli-
p. 226. catur. Piscis, diodon ocellatus, valde venenatus
p. 231. pro arbitrio suo corpus inflare valet. Bäckea fru-
tescens, in memoriam Ill. Regis Sueciae Archiatri
nomen gerens, abrotanum refert et vestimenta effi-
p. 232. caciter contra insectorum vim tuetur. Rhamnus
thea egenis loco theae verae est. Linum valde ra-
ro in China occurrit. Et plantarum filiquosarum
ne vnicam quidem; nec vllum Auctor scorbuto af-
p. 242. fectum vidit. Artemisia vulgari contusa vlcera sa-
nant. Pix Chinenfibus ignota est, cuius vero loco
ad nauium rimas obturandas adhibent gluten quod-
dam ex cassytha filiformi contusa calceque mista.
Mucilagine huius plantae capiti illita, incrementum
capillorum accelerari credunt. An Croton sebife-
rum planta ista sit, ex qua candelae parentur, du-
bium adhuc relinquit.
- p. 265. Mercibus necessariis intra 4 menses et aliquot
dies comparatis naus reditum parauit. In quo ite-
rum Nostro contigit in insulam Iauam exspatiari,
et largam stirpium messem ex sylua densissima, spi-
nis confertissima et tigridum aliarumque ferarum
caterua munita, reportare. Crescentem ibi inue-
nit palmam baculum, cui arundo sic dicta Hispanica
(*Spanisches Rohr*) scipionibus inseruiens debetur.
- p. 271. Ibi etiam creuit epidendron amabile, odore florum
omnibus fere reliquis plantis praestans, quibus flo-
ribus ornari nonnisi principum feminis in insula
Ternata datum est.
- p. 286. In itineris continuatione substitit per aliquod
tempus naus ad Ascensionis insulam torridam istam
atque sterilem, gratam tamen nauigantibus ob te-
studinum ad eiusdem littora reperiundarum copiam,
quarum captura hic delineatur. Denudata iam re-
peritur arboribus, quas vero olim adfuisse docent
variae

variae earum partes, iamiam in lapides induratae. Capris abundat a Gallis quondam illuc adductis, quae vero ad sedandam sitim aquae inopia pressae nihil praeter portulacam habent. Glires autem, postquam DAMPIERI naus appelleret, sedem fixerunt, aues piscesque insecta varia rariora ibidem inuenit, paucas vero stirpes, quarum antistat reliquis pretio aristida ascensionis. Testudines hic maximae sunt, ita vt vna pondus 500 ad 700 libras aequet, et sufficiat praesidio 130 hominum satiando. Caro griseo vel nigro colore instructa, et vna cum testudinum ouis editur. Numerus ouorum vnius testudinis vsque ad 5 vel 600 supraque ascendit. Sublat. 22 gr. P. 303. copia fuci natantis appropinquauit naui, quam ex America appulsam existimat insectis, cochleis, piscibusque variis hic nominatis refertissimam. Instar acetarii aceto condiri solet. Tandem Noster ad finem iunii 1752 vna cum naue saluus incolumisque Gothoburgum reuisit, postquam ex 132 istis hominibus, qui ex patria cum illo discesserant, 8 in via interiissent.

Litterae TORENII affixae commercio cum P. 317. Ill. A LINNE' enatae sunt, et varia rei naturalis et politicae Chinenfis regni, Suratae, insulae Ascensionis, et aliarum regionum momenta illustrant, quoad plurimam partem in itinerario OSBECKII memorata. Vfus est Auctor scribendi genere eleganti et faceto, et licet pauca, quae ad historiam naturalem pertinent, ea assiduitate concinnata sint, quae elucet in hominibus, huic scientiae toto animo deditis, dignum tamen iudicauit meritorum in hoc campo acutissimus arbiter, Ill. A LINNE', ob studium impensum plantasque conquisitas, cuius memoria post fata Torenia planta reuiuisceret. Semina P. 397. glycines narrat Noster Suratae ponderis genus esse in auro et margaritis librandis. Ibi mausoleum de

de re herbaria meritissimi viri V. REEDE TER DRANKENSTEIN scrutatus epitaphii partem descripsit; vitaeque alio fato certe dignissimae finem maleuolorum arte acceleratum percepit.

Plantae, quarum effigiem Cl. OSBECK sculpendam curauit, sequentes sunt: bäckeä frutescens, osbekia chinensis, pteris semipinnata, vtricularia bifida, pteris vittata, helicteres angustifolia, trichomanes chinensis, rhamnus lineata, barleria cristata, gerardia glutinosa, carpesium abrotanoides, clerodendron fortunatum. Accedit hisce imago holuthuriae velificantis et scombri ductoris.

XVI.

Berättelse om Koppors ympande, öfverlämnad till högloflige Kongl. Sundhets-Commissionen af DAVID SCHULTZ, M. D. Stockholm, tryckt uti Konigl. Tryckeriet, 1756. pag. 119. 8.

i. e.

Narratio de insitione variolarum, auctore DAVIDE SCHULTZ.

Ex praestantissimis est, qui hucusque de hac materie prodire, libris, in quo, quicquid ad insitionis artem rite peragendam, commendandamque spectat, optimo ordine et dictione maxime concinna Cl. Auctor explicuit, tam sua, quam aliena experientia adiutus. Vt nimirum tanto exquisitiorem nobilissimae huius artis cognitionem adipisceretur, regiis impensis iter Londinum suscepit, in qua vrbe versatissimorum in arte virorum manu, in nosocomio praecipue magno isto, insitioni dicato, infi-

infitionem peractam vidit, posteaque in patria crebro exercuit. Quae hisce adiumentis obseruauit, iuncta optimorum auctorum lectione, mox post reditum typis euulgauit, sermone quidem continuo, eo tamen, vt in 6 sectiones, in quot etiam Cl. MURRAY versionem *) huius libri germanicam diuisit, commodè dispertiat. Prima (a pag. 5 ad 24) de optima corporis ad infitionem subeundam indole agit; secunda tempus maxime opportunum definit (ad pag. 31); tertia praeparationem corporis declarat (ad pag. 44); quarta ipsam chirurgiam tradit (ad pag. 62); quinta decursum morbi arte excitati; secundum dierum seriem, et quae postea molienda, complectitur (ad pag. 90); sexta difficultates infitioni oppositas remouet (vsque ad finem).

Ne vero, quum ferius, quam meretur, de hoc opusculo referamus, taedium repetitione rerum iterata sequentibus annis experientia confirmatarum pariamus: subsistendum nobis videtur in obseruationibus quibusdam singularibus ponderis insignioris.

Obesos homines plerumque benignis variolis p. 6.
gaudere Cl. Auctor expertus est, quod et confirmat auctoritate Cl. HADOW, qui homines ponderis librarum 260 (18 *Stones pond. Angl.*) felici cum successu infitioni subiecit. Vlcera pone aures et exanthemata capitis nihil in artis successu, obseruante p. 15.
Ill. A ROSENSTEIN, et SCHULTZIO Nostro, mutarunt. Morbillos quoque aequè ac variolas per p. 16.
tempus sine turbis latere, vterque manifeste cognouit. Nec malus fuit in scrophulosis infitionis euentus. Verum rachitide affectos repudiat, licet Cl. p. 17.
ARCHER Nostro praesente puerum rachiticum admit.

*) Inserta haec est promptuarii Hamburg. Vol. 26.
Parti primae et secundae.

- admitteret, in quo quidem modo 5 variolae emer-
ferunt, sed succedente postea febricula et bubone
sub axilla. Chloroticas puellas excludit, siquidem
has in naturalibus quoque variolis postea febre lenta
corripi notavit. Scorbutici, etsi aegrius insitioni
submittantur, naturalem tamen morbum haud raro
feliciter superarunt. Exstant hic quoque varia pro-
bi euentus apud homines venerea labe inquinatos
exempla, qui ante insitionem luem studiose celaue-
rant. Qui vero spirituosius potibus dediti sunt, hos
fine exceptione ab isto beneficio arcet, annuente
expertissimo ARCHER. Sed tanto minus in rheu-
matismo obnoxios feueritas huius legis cadere de-
bet, quum in Anglia quartus fere quilibet homo
malo illo afficiatur. Facilius deuicerunt variolas
insititias paullo ante ex febre intermittente conuale-
scentes. Profligatam plerumque fuisse febrem
istam variolis accedentibus, aliquando vero, loco
febris suppuratoriae incidisse, non minus co-
gnouit.
- p. 25. In diptychis mortuorum, quae Londini concin-
nantur, id vitii committitur, quod, licet variolae
ibi aestate rarissimae sint, eorum tamen, qui hocce
morbo hieme moriuntur, magna pars in diptycha
aestiuata transferuntur, ut nimirum vulgi metus mi-
tigetur.
- p. 33. Efficaciam pilularum praeferuantium Ill. A RO-
SENSTEIN debitis laudibus extollit. Ab Ill.
PRINGLE autem de experimento a se facto certior
euasit, quo cinnabaris in corpore humano solutio
adhuc magis confirmatur. Nempe cum salua va-
riisq; partibus animalium atque vegetabilium com-
miscuit, et calori commisit, illi ventriculi haud absimi-
lem; quo ipso adscendit, praecedente fermentatio-
ne, odor sulphureus. Aethiopem mineralem non-
nunquam ptyalismum excitasse, Ill. Archiatri

A ROSENSTEIN et BAEK Nostro narrarunt. Ut vero diaetam probam in praeparando corpore commendet: a nimio eius rigore tamen, ne debilitatem faceffat, abstinere medicum iubet noxamque, additis exemplis, vltius demonffrat. Pedilu-
p. 37.

tiis praeparationis tempore ROSENSTEINII commendatione valde fauet, qui non tam ab iis reuul-
sionem ad pedes, quam emollitionem cutis auctamque transpirationem expectat. p. 40.

Filum infitioni destinatum mauult in scatula ligneae, quam vitro feruari, et antea ficcari ad focum iubet. Nam et Cl. WALL et FOTHERGILL aperto vitro foetorem admissis naribus senserunt. p. 44.

Horum posterior instrumentum Nostro a pharmacopola quodam ad incisionem peragendam inuentum, et instrumentum scarificatorium referens, sed p. 53.

na modo lanceola instructum, monstrauit. Qui p. 55.

praerogatiuam infitionis vulneris beneficio tribuunt, nosce et obseruatione singulari et argumentis Cl. Auctor refellit. Nempe in puella Londini iam ante eruptionem vulnus omnino coaliuit, subsequenti-
us tamen optinae notae variolis; nec hoc ipsum
us effundere ante eruptionem variolarum vel sup-
urationem solet. Inunctionis puris variolosi vis p. 60.

nerior, quam alias solet, Londini in aedibus, quod relicti infantes nutriuntur, reperta est; qui tamen modus variolarum impertiendarum ob multa generatim incommoda merito reiicitur.

Sensus et gestus ebrii quasi hominis die 8 post infitionem, quo plerumque morbus primum sese exferit, adeo vulgaris est, vt famuli in nosocomio Londinensi strepitu insolito imminentem morbum praefagiant. Vsque ad tempus illud, quo librum nunc Cl. SCHULTZIUS exarauit, nunquam variolas contiguas, multo minus confluentes, ex infitione exortas, obseruauit. Narrauit Nostro Ill. A p. 65

- ROSENSTEIN, infantem quendam octennem infitioni subiectum, nonnisi die 10 in morbum incidisse 13 vero die variolas emisisse. Ptyalismum in aetate 22 annorum post infitionem animaduertit, quamuis non supra 120 v. 150 variolas numerari possent.
- p. 81. Bubonibus sub axilla exortis, diu aperturam differré dissuadet, ne in pectoris cauum pus eructent, quod quondam tradit, ROSENSTEINIUM in infante naturalibus variolis iisque non malignis decumbentibus obseruasse. Hic idem Ill. Vir recens nati infantis corpus crustis et cicatricibus variolosis distinctum semel obseruauit.

Sollicite comparauit Noster computos hominum variolis infititiis cum iis variolis naturalibus decumbentibus mortuorum. Sub hoc negotio procliue maximam fuit in calculos Londini in nosocomiis factos delabi. Contra quos vero postea Cl. DE HAEN *) dubia nonnulla mouit, sed a SCHULTZIO, interpretatus Cl. MURRAY **) diluta. Finem egregiae commentationi elegantissimis Cl. BOLAINÉ verbis imponit, quibus et nos subscribimus: Natura exposcit ratio probat, religio permittit infitionem variolarum.

*) Ration. med. Tom. IX. p. 290.

**) Historia infitionis variolarum in Suecia p. 141.



XVII.

e alimentis farinaceis. Dissertat. inauguralis.
Auctore IOH. SCHEUCHZER, Helueto
Tigurino. Lugd. Batau. 1760. 4. pl. 5.
tab. aen. I.

Vegetabilium farinaceorum, eximio usu corpori
humano inseruientium, quinque classes Auctor
constituit, in quarum prima cerealia sic dicta enu-
merat, copiosissima semina, vel in spicis, vel in iu-
suppeditantia, qualia sunt: *tritium, hordeum,*
ale, avena, milium, zizania, et variae *polygoni*
cies, ex quibus omnibus decorticatis, et mo-
dino subiectis, optima praeparatur farina; qui-
bus subiunxit *rumicis, melampyri, sesami*, et *holci*
nullas species, simili usu sese commendantes.
Secunda classis continet plantas leguminosas, quarum
semina, vel immatura adhuc una cum valvis suis co-
quantur, vel adulta, et exsiccata farinam praebent,
ut *phascoli, lathyri, viciae, pisa, dolichos etc.*
Tertia classe recensentur plantae partim indige-
nae, partim exoticae, ex quarum radicibus farina
praeparatur alimento conducens; sic enim *curcumae*
lundae radix, pariter ac *dioscoreae oppositifoliae* fa-
rinam exhibent, sagou haud dissimilem, ex *cichorei,*
zonerae, conuoluuli batatas, helianthi tuberosi,
linacae sativae aliarumque plantarum radicibus ex-
tractis, variaque arte praeparatis; farina educitur.
Quarta classis sistit plantas, quarum semina, in nuci-
vel durioribus capsulis recondita, indolem ha-
bent farinaceam, quales sunt, *trapa, amygdalus,*
ans, corylus, cocos, pinus, pistacea, et semina
plantarum cucurbitacearum. *Pini sylvestris* cortex
in tali tempore deglubitus, siccatus et tostus, a

Dalekarliis in farinam redigitur, ex qua panis ipse familiaris praeparatur. In quinta demum et vltima classe *palmae* enumerantur, ex quarum medulla alimentum istud farinaceum, sagou dictum conficitur. Omnes hae plantae commemoratae emolumento hominum tanto magis prospiciunt, quanto praeclarior est earundem nutriendi facultas, quam vt Cl. Auctor comprobet, partes constitutivas farinaceorum disquisiuit, et ex earum cum partibus hominis constitutiuis affinitate, facillimam digestionem, assimilationem, et inde conuenientissimi nutrimenti indolem declarat. Praecipue autem fufius in panis tanquam praestantissimi cibi farinacei descriptione moratur, singula non solum momenta, quae eius praeparationem spectant, indicans, sed diuersam quoque eius naturam, diuersamque nutrimenti virtutem, ex diuersitate granorum, farinam suppetentium, prouenientem, explicans, quae autem omnia ad artem pistoriam magis pertinent, quam vt eorum mentionem hic facere possemus. Ad ista icon sistit *zizaniam aquaticam* LINN. quam Auctor eam ob causam delineauit, quoniam eius seminibus farinaceis panis confici potest, alimentum inferuiens.



XVIII.

traité des Accouchemens , contenant des observations importantes sur la pratique de cet art ; deux petits traités, l'un, sur quelques maladies de matrice ; et l'autre , sur les maladies des enfans du premier âge ; quatre memoires , dont le premier a pour obiet les pertes de sang dans les femmes grosses , et les trois autres sur les dépôts laiteux , par M. PUZOS, Chirurgien de Paris, et de l'Academie Royale de Chirurgie. Corrigé et publié par M. MORISOT DESLANDES, Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris. Precedé d'une dissertation de l'éditeur , sur un point interessant, relatif aux Accouchemens et suivi de la traduction d'une dissertation latine de M. CRANTZ, Médecin Allemand, sur la rupture de Matrice. à Paris , chez Defaint et Saillant et P. Ac. le Prieur, 1759. 4. alph. 2. pl. 18.

i. e.

tractatus de arte obstetricia continens observationes magni vsus ad praxin huius artis. Auctore Cl. PUZOS.

Quod multis quidem eorum operum accidit, quae posthuma in lucem eduntur, ut non respondeant famae et doctrinae Auctoris sui, vel nondum satis limata et perpolita, vel haud ab imperitis manibus parum digne tractata sint; minime euenisse videmus huic libro Cl. PUZOS,

Hh 3

longo

longo artis obstetriciae exercitio, variisque in commentariis chirurgorum Parisiensium editis libellis celeberrimo. Cum enim post mortem Cl. PUZOS theoria artis obstetriciae orta ex innumeris fere observationibus, per longam annorum seriem collecta vna cum annotationibus de variis morbis mulierum et puerorum, nondum ita absoluta esset, vix nulla amplius admota manu, in lucem prodire posset; curam eius in se suscepit Cl. GERVAIS discipulus Cl. PUZOS, qui etiam nonnulla addidit. Quum vero et negotiorum multitudine in hoc labore impeditus fuisset, traditus tandem est Cl. MORAND DESLANDES, qui dicendi genus et ordinem hinc inde mutavit, nil vero, quod praxin artis attineret, ex suis addidit. Quae quidem res ita cessit feliciter, ut dignum tandem Auctore suo opus in lucem prodierit. Additae vero etiam sunt huic operi duae Auctoris dissertationes, quarum vna nondum publicata fuerat; aliaeque insuper de quibus omnibus nunc paullo vberius ad lectores referre operam pretium esse ducimus.

- p. 1. Initium facit praefatio Cl. Editoris, in qua h
p. 17. storiam operis refert. Sequitur tunc eiusdem Vi
Cl. dissertatio quaedam, in qua demonstratur, prob
posse medicum aliquem tenere chirurgiam et artem
obstetriciam, licet illas artes ipse non exerceat.
Quae disputatio eum fortassis in finem instituta est
ut fidem sibi conciliet Auctor, se medioum editione
libri, ad artem obstetriciam pertinentis, commode
omnino in se potuisse suscipere. Cuius rei demon
stratio in Gallia, vbi medicorum vulgus parum
hac arte scire solet, magis necessaria videbatur
quam in nostris terris, vbi vtraque artis salutar
pars minus a se inuicem disiuncta est. Tandem
p. 53. elogium Cl. PUZOS auctore Cl. MORAND sequi
tu

tur, quod ex volumine tertio commentariorum academiae chirurgicae Parisinae sumtum est.

Ipse vero tractatus de arte obstetricia viginti et tria capita continet, in quorum primo ossa pelvis, vagina vteri et partes genitales externae pariter, ac internae omnes, solo vtero excepto, describuntur, quatenus ad artem obstetriciam relationem quandam habent. Explicatur itaque harum partium omnium usus, quem in corpore sano praestant, additaque est descriptio praecipuorum morborum, quibus illae affici solent. Gibberosos facilius partum edere iis, quae rhachitide laborarunt, ita Noster defendit, ut doceat spinam tantum incuruari quarto vel quinto aetatis anno, ubi ossa pelvis iam formata sunt; rhachitidem autem oriri primis aetatis annis et ossium substantiam ita laedere, ut in foeminis, quae rhachitide laborarunt, licet omnia reliqua ossa debitam figuram recuperauerint, semper pelvis ossa aliquantum distorta remaneant. Ad quod malum augendum multum confert hoc, quod eiusmodi puellae fere semper sedeant, et ossa pelvis corporis pondere magis adhuc comprimantur. In uniuersum autem causas, ob quas deterior pelvis conformatio effici possit, diligenter Noster explicat. Ossa pubis in symphyssi sua in partu diduci putat. Secundum caput agit de vtero ipso, quem p. 17. ta fabrefactum esse Cl. Puzos ostendit, ut perfecte respondeat consilio, ad quod ita formatus est. Collum vteri, quod alias in partu euanescit, in p. 10. abortu excludendo multo longius ait fieri, ut saepe ouum, quod abortu reiicitur, fere totum in illo haereat, et digitus totus in vaginam immitti possit, qua illud continetur. Orificium vteri longe facilius ab interna parte, quam ab externa aperiri primus sine dubio confirmat. Porro pergit ad varias mutationes et motus describendos, quos vterus p. 26.

- exercet, expansionem scilicet, quae in grauiditate contingit, et contractionem. Expanditur autem vterus vi viua liquidi, in ouo contenti, quod aequaliter in omnem superficiem vteri internam pressio- nem suam exercet, et ex resistentia vteri contra hanc expansionem magnam partem symptomatum No- ster deducit, quae prioribus mensibus grauidis mo-
p. 30. lesta sunt. Disputat deinde de vi musculosarum fibrarum earumque antagonismo inter se, ostendit- que fundum robustissimam esse partem, orificium vero debilissimam, imprimis, collo vteri sensim eua- nescente, vltimis grauiditatis temporibus. Hoc vero si ab exteriori parte aperitur, digito obstetricantis insignem resistentiam opponit, quae adiuuatur vi
p. 33. reliquarum fibrarum vteri omnium. Causa dolo- rum ad partum posita est in contractione fibrarum ad definitum quendam gradum extensarum. Vtero autem rotundiore facto et collo euanescente, orifi- ciique resistentia hac ratione quoque debilitata, de- bilior tandem pars fortiori fundo cedit, atque ori- ficium iam dilatatur. Vires autem fundi semper, durante partu, augentur, pro ratione, qua plures fibrae dum ouum et foetus prodeunt, vi sua fundi contra- ctioni accedunt, vt sub vltimis doloribus vis eius maxime insignis sit, et orificium paullulum aper- tum citissime praeter omnem expectationem in de- bitam magnitudinem extendatur.
- p. 37. Tertio capite de menstruis disputat, FREINDII potissimum theoriam secutus. Adiicit, vterum in- ter omnia abdominis viscera illud esse, quod sine metu inflammationis plurimum sanguinis per ali- quod tempus in substantia sua continere possit, vasis vero ad certum gradum extensis, fibras irritatas con- trahi et catamenia profluere. Parietes vteri, duran- te grauiditate, tenuiores fieri putat. In suppressio- ne catameniorum cum alio morbo vniuersali con- iuncta,

iuncta, semper ad morbum illum non vt effectum, sed vt causam huius suppressionis respiciendum esse monet, qua sublata, etiam effectus facilius tolli poterit.

Signa grauiditatis, de quibus quarto capite disputat, cognoscuntur vel ratione tantum, imprimis prioribus mensibus, vel sensibus. Priora incerta sunt. p. 52.

Hinc fusius quinto capite de praecipuo grauiditatis cognoscendae auxilio, exploratione scilicet, disputatur. p. 55.

Concedit tamen Auctor vel illam non semper sufficere exacto de statu vteri indicio ferendo, imprimis vero nihil eius ope ante tertium grauiditatis mensem cognosci. Instituit vero illam hac ratione vt digitum indicem, vaginae immissum, orificio vteri applicet, alteram vero manum abdomini et fundo vteri, supra ossa pubis eminenti, imponat, et ita vterum sursum deorsumque premendo de pondere et magnitudine eius iudicium ferat. Facilius tamen

hoc in macilentis, quam in obesis fieri posse concedit. Porro de explorationis usu in partu et ad varios morbos vteri cognoscendos disputat. Ad vitam foetus in vtero cognoscendam palma vtriusque manus vterum comprimit, vt foetus in angustius spatium coactus se moueat, et ita motu suo se viuere ostendat. Sextum caput de grauiditate inscribitur, quam Auctor Cl. in bonam siue veram, malam siue spuriam, et falsam vbi nil vtero inest, et foemina tantum putat se grauidam esse, diuidit. Expo-

nit deinde de grauiditate vera in specie. Licet post haemorrhagias saepe abortus sequatur, tamen nonnunquam Cl. puzos obseruauit, tales per omnem grauiditatem accidisse, neque tamen abortum infectum esse. Situs quoque in dorso, qui in omni vteri haemorrhagia commendatur, non semper proficius est, vt Cl. Auctor viderit, aegras demum, postquam e lecto surrexerint, conualuisse. Si post

p. 67.

p. 70.

H h 5

foetus

foetus abortiui exclusionem membranae vna cum placenta restant, suppuratio priorum medicum ita fallere potest, vt putet, placentam quoque suppuratione dissolutam esse, licet ea integra adhuc in vtero supersit. Exponit itaque Auctor signa, quibus pus, e membranis ortum, ab eo placentae distingui possit. In fine de expulsionem et extractione placentae foetus abortiui exponit.

- P. 73. Septimo capite de morbis grauidarum Cl. Auctor breuiter tantum disputat. Symptomata grauidis molesta oriuntur vel a plethora, vel a resistentia, quam vterus foetui, a quo distenditur, opponit. In vniuersum magna eorum pars tertio vel quarto grauiditatis mense sponte cessat, si vterus viuum foetum continet, non aequae, si molam aut foetum mortuum includit, cum plethora, sanguine copiosius nunc ad foetum transeunte, et vteri resistentia consuetudine et adfluxu humorum, fibras eas emolliente, minuatur. Vomitus grauidarum vel biliosus est, matutino potissimum tempore accedens, vel alimentorum. Prior venaesectionem et potum, acrimoniam bilis diluentem, exigit, posterior venaesectionem et lenia carminatiua. Nonnullae grauidarum, vomitu suppresso, peius se habent, atque in vniuersum obseruauit Noster iis grauidis felix puerperium contingere, quae saepius vomitum istum expertae fuerint, cum ille primas vias a cruditatibus egregie purget, vt itaque vomitus tantum tunc supprimendus sit, si grauidas nimis debilitat. Exponit deinde de doloribus infimi ventris grauidis molestis, in quorum sedem et causas sedulo inquirendum est, cum eae in diuersis speciebus valde differant. Oriuntur nonnunquam ab vtero, distentionem suam moleste ferente, qui venaesectione leuantur. Haud raro in grauidis renes ob compressionem et sanguinem spissum, illos transeuntem, nephritide afficiuntur.
- P. 79. Si

Si a faecibus aluinis induratis oriuntur colici dolores, tartari emetici paruum dosim salis medio purganti iunctam egregios effectus praestare obseruauit. Putat enim emeticum hoc tunc semper purgantem obtinere vim, neque vomitoriorum usum in grauidis adeo esse reformidandum, cum experientia ostendat, eas vomitum spontaneum, qui nonnullis quotidie molestus est, sine noxa ferre. Nonnunquam sanguis grauidarum tanta acrimonia afficitur, ut pruritus inde excitetur molestissimus, quem abortus causam fuisse Cl. Auctor uidit. p. 82.

Progreditur Cl. Auctor ad hydropem grauidarum, atque in specie de illo disputat, qui in ipso utero sedem habet. Si foemina, quae eo afflicta est, gemellos intra uterum gestat, extremitates quoque inferiores aquoso tumore turgidae deprehenduntur, sanitas vero corporis vniuersi vix alio modo laesa conspicitur. Potest autem humor aquosus non solum intra oui cauum ipsum, sed et inter laminas membranarum aut membranas et uterum colligi, quod vltimum si acciderit, aquae sic dictae spuriae haud raro aliquoties, nullo abortu sequente, periodicae quasi profluunt. Aquae enim, aliqua in copia collectae, orificium vteri distendunt, quod, iis effluxis, clauditur, ut de nouo alia copia iterum colligatur. Si hydrops inter laminas membranarum nascitur, ut plurimum minor aquae copia in hac, quam in praecedente hydropis specie, adesse solet, et vesica illa spuria sub fine tantum grauiditatis sponte dirumpitur, aquae lente effluunt, verique tandem ad partum dolores sub fine huius effluxus accedunt. Cum tamen in hoc casu parua tantum copia liquoris amnii adsit, post effluxum spuriae aquae vesica quoque eiusdem digito obstetricantis se magis forma plana offert; et quia tunc haud raro iusto densior existit, ab obstetricante aperiri debet. In
ea

ea tandem specie, in qua in ipso oui cauo insignis aquarum copia morbose collecta hydropi vteri originem dedit, foetus ob compressionem, quam aqua in funiculum vmbilicalem exercet et nutritionem eius inde laesam, vt plurimum perit, pedes vero grauidae non tument, licet abdomen in insignem molem distentum sit. Ipse partus lente procedit, cum vterus nimium distentus vim se contrahendi amittat, quapropter obstetricans membranas rumpat et aquas effluere sinat, quo vterus magis contractus vim suam in ipsum foetus corpus exserere possit.

p. 92. Octauum caput de vsu clysmatum, purgantium et venaesectionis in grauidis exponit. Foeminae, quae vitam exercitatum degunt et in aere liberiore versantur, vt plurimum hisce auxiliis carere possunt, minime vero illae, quae copiis abundant et in vrbe viuunt. In vniuersum autem clysmatum in grauidis vsus multum extollit, purgantia vero tantum sub fine grauiditatis et leniora quidem concedit, confirmat autem tunc temporis eorum vsu posse tolli causas plurimorum malorum, quibus puerperae obnoxiae sunt. Primis grauiditatis mensibus purgans vix dari debet, nisi cruditates primarum viarum, diarrhoea aut dysenteria id exigant. Praemittenda tamen est semper venaesectio. Venaesectio non certis quibusdam grauiditatis temporibus, sed pro necessitate institui debet. In plethoricis Cl. Auctor singulis quatuordecim diebus, inprimis peracto quinto mense, venam secare iubet.

p. 97. Nono capite de secundinis Noster disputat. Contra DEVENTERUM negat, placentam fundo vteri semper adhaerere, vterumque obliquum adesse, si in laterali eiusdem parte reperitur. Funiculus nimis brevis causa separationis placentae ab utero in partu vix existere potest, cum vasa spiraliter ducta extensionem eius concedant. In mulieribus
obesis

obesis membranae, foetum cingentes, semper tenuiores sunt, quam in macilentis. Liquoris amnii incrementum prioribus grauiditatis temporibus foetus incrementum multum superat, iis autem peractis, foetus maiora incrementa capit, liquor vero non eadem ratione augetur. Huius vero liquoris fontes ex Nostri mente in secundinis, vtero et foetu ipso existunt, cuius scilicet perspirabilis materia accedit. Adiuvatur autem liquidi huius secretio compressione omnium harum partium, quae sub inspiratione et expiratione illis contingit.

Capitis decimi, quod de partu naturali inscribi p. 106. tur, Auctor non Cl. PUZOS, sed, uti ex praefatione patet, discipulus eius Cl. GERVAIS est. Eleganter vero in illo tum mechanismus partus, tum illa, ad quae obstetricans in partu naturali attendere debet, describuntur. Non statim in initio dolorum ad partum explorationem instituit, sed expectationem per aliquod adhuc tempus commendat. Instituit vero illam, foemina in dorso cubante. Venam sub partu non solum in plethoricis, sed in iis quoque secatur, quibus una cum liquore amnii sanguis statim a dolorum initio profluit. Praematurus aquarum effluxus non causa partus retardati existit. Liquor enim amnii vias, per quas foetus prodit, minime lubricas reddit, sed est hoc muci officium, qui ante, praecipue tamen post aquarum effluxum, exprimitur.

Vndecimum caput agit de causis, quae partum p. 117. naturalem difficilem reddere possunt. Inter illas prima est dolorum nimia debilitas, quae ex nimia rigiditate fibrarum vteri aut illarum debilitate proficiscitur. Si fibrae ob vasorum nimiam turgescuntiam ex plethora se non contrahere valent, venaesectio conuenit, in debilitate e contrario analeptica utilissima sunt. Si aquarum maxima pars vno impetu profluit, et reliqua illarum portio pedetentim exstillat, dolores in hoc casu mouere tantum, non autem pro-

promouere partum solent, vsque dum omne liquidum effluerit. Hinc iubet Cl. Auctor obstetricantem caput in dolorum interuallo paullulum releuare et retrudere, quo aqua cito effluat et vteri contractiones ipsum corpus foetus afficiant. Si, capite in vagina haerente, partus vltcrius non procedit, vel ob nimiam eius magnitudinem, vel ob vaginae angustiam, forcipem in viuo foetu noster adhibet, in mortuo vncum. Cum vero breuiiores tantum et rectos forcipes cognouerit, illum tunc demum applicat, quando, capite iam toto ex vtero egresso, vertex ad labia fere pudendi descenderit. Si nimia rigiditas membranarum partus retardati causa existit, aut illarum vesica ob paruam copiam liquoris contenti difficulter rumpitur, digitis illam Noster aperit.

p. 190. Sequens caput de variis exponit, quae in ipso partu naturali accidere possunt, et attentionem obstetricantis exigunt. In ruptura perinaei minus completa solo situ reunionem partium Noster adiuuare iubet, cum cataplasmata suppurationem excitent, et lochiorum effluxum ex vagina impediunt, qua ex re Cl. Auctor coagula sanguinis et conuulsiones oriri vidit. Si facies foetus ossa pubis respicit, nonnunquam natura partum absoluit, haud raro tamen haec partus species matri et foetui exitialis fit, quapropter Cl. Auctor forcipem in hoc casu commendat. Ruptura perinaei completa saepe sine obstetricantis culpa euenit, licet vulgus vt pluri-

p. 131. mum illum accuset. Potest etiam in agripparum partu accidere, capite nimis magno et perinaeo angustiore existente. Solum situm et expectationem Noster commendat, quibus malum vel ex toto, vel ex parte leuari solet. Post partum difficilem haud raro quoque incontinentia vrinae post aliquot demum dies accedit, quae si a laesione vesicae ipsius, et post abscessum partis contusae accidit, vt plurimum nullam

nullam curationem admittit, cum substantiae defectus et margines callosi adsint. Collum vero vesicae tantum in hoc casu laeditur, vix vrethra, quae inferius infra ossa pubis descendit, cum e contrario vesicae collum a capite foetus ad ossa pubis apprimatur. Quapropter si parturienti vrina catheteris ope emittitur, instrumentum vt plurimum facile vrethram intrat, haud raro vero resistantiam, quam collum compressum opponit, vix vincere potest. Nonnunquam vagina, in partu laesa, excrescentiae p. 139. fungosae omnem viam praeccludunt, vt nulla euacuationum consuetarum fieri possit, quo in casu, incisione facta, tubulum tandemque pessarium Noster immittit. Vidit retro hosce fungos vrinam deposuisse calculosa concrementa, aliqua lithotomiae specie eximenda. Quo autem eiusmodi concretio impediatur, si laesio vaginae accidit, chirurgus curam habeat, ne superficies laesae se contingant.

Caput decimum tertium de placentae extractio p. 141. ne inscribitur. Illam non statim extrahit, sed per aliquot tempus expectat expulsionem eius, a vi vteri se contrahentis praestandam. Si vero nullo modo procedit, tunc illam eximit, cum haec extractio, si ab exercitato peragitur, non tantum dolorem excitet, quantum illam excitare RUYSCHIIUS putauit. Damnat tamen praecocem manus in vterum immisionem, quam apud Germanos praecipue in usu esse asserit, putatque illam conamina, quibus natura solet placentam quasi altera quadam partus specie expellere, non imitari, sed turbare potius, cum violenter hac ratione ea perficiantur, quae differri aliquantulum adhuc potuissent. Elegans omnino haec vniuersa tractatio est, et multa lectu digna continet. Antagonismus inter fundum et orificium vteri, quem LEVRETUS post Auctoris tempora p. 107. vltius explicauit, iam hic proponitur atque ex eo pro-

- probatur, orificium, placenta in vtero relicta, non per
p. 154. fecte claudi, sed facile iterum dilatari posse. Partes
 placentae relictae in vtero suppuratione abscedunt
 illaque symptomata, quae vulgo ex iis oriri mult
 sibi persuadent, proueniunt ex Nostri mente ex so
 la inflammatione vteri, ad quam ipsa tentamina ob
 stetricantis illarum extrahendarum vterum dispone
 re possunt. Grumi sanguinis coagulati, qui non
 nunquam in puerperis post aliquot dies exeunt, fru
 stula placentae in vtero derelicta saepius referunt
 sed in aqua calida facile soluuntur, neque ita, vt pla
 centae frustula, foetent. Vasa placentae et vter
 non anastomosi vera iungi, ex concrementis calculo
 sis, in placentae superficie repertis, Noster probat.
- p. 158.** De lochiis et doloribus post partum Auctor Cl
 capite decimo quarto tractat. Lochia lacteam nu
 tritionis foetus materiam, qua omnis grauidarum san
 guis abundat, continere, ex odore acido, quem illa
 spirant, probatur. Dolores post partum non solum
 grumos sanguinis, in vteri cauo collectos, expellunt
 sed etiam eorum ope ex vasis vteri lacteus ille li
 quor alique humores, quibus totus vterus turget
 exprimitur. Hinc post partum, qui longius durauit
 dolores leniores, in illis vero, qui saepius iam pepe
 rerunt et ideo breuiore labore foetus suos edunt.
- p. 164.** grauiiores esse deprehenduntur. Decimo quinto ca
 pite de motu vteri praeternaturali siue spasmodicis
 contractionibus eius in foeminis, quae foetum mor
 tuum vtero gestant, et iis, quibus menstrua non recte
 fluunt, hysteriis etc. exponit.
- p. 167.** Decimum sextum caput de partu praeternatura
 li in genere et partu naturali, qui per accidens prae
 ternaturalis fit, agit. Si haemorrhagia accedit in
 grauiditatis fine, partus vt plurimum facile protrahi
 tur, si vero talis quinto vel sexto grauiditatis mense
 accedit, orificio nondum satis dilatato, paullo difficilior
 hoc

hoc negotium producere solet. Describitur vero
hic a Cl. Auctore methodus, qua, digitis immis-
sis, aperitur. In versione secundum methodum, p. 168.
quae a Cl. CLEMENT praeceptore suo in arte ob p. 185.
obstetricia Cl. PUZOS accepit, vnus tantum pedis
pe foetum protrahit, neque alterum quaerit, sed
plicam inguinis pedis nondum progressi digi-
um tantum alterius manus immittit, et ita extra-
tionem absoluit. Orificium vteri facillime vi, quae
b interiore parte versus exteriora agit, cedit, et vo-
amine pedis vna cum corpore foetus procedentis
mnis via ita dilatatur, vt caput deinde facillime
xeat. In conuulsionibus parturientium saepe so-
us partus, obstetricantis manu promouendus, auxi-
um adfert; haud raro tamen, debilitatis nimium
eruis, non statim, foetu edueto, illae cessant, sed per
liquod adhuc tempus perdurant.

Caput decimum septimum exponit de partu p. 177.
raeternaturali proprie ita dicto. Versionem non
olum in situ peruerso foetus et haemorrhagia, sed
tiam in vtero scirrroso, aut insigni aquarum copia
istento, licet caput ipsum praeuium sit, instituit.
manum prolapsam retrudere impossibile esse confir-
nat. DEVENTERI methodum, qua ille in ver-
one ad impediendam contractionem vteri circa ca-
ut foetus, partu agripparum procedentis, brachia
on ante caput educebat, damnat. De partu prae- p. 190.
oci et abortu capite decimo octauo Auctor differit,
t in placenta abortus relicta omnium emmenago-
orum vsum noxium arbitratur. Sequenti capite de p. 196.
rauiditate spuria agit, et illam molae speciem, quam
Galli *faux germe* dicunt, a vera mola distinguit.
concedit tamen vtramque oriri ex foetu mortuo,
a vt veram tantum molam dicat illam, quae, foetu
mortuo, in vtero per aliquod adhuc tempus subsistit,
t maiora incrementa capit. Vicesimo capite de p. 213.
Supplement. III. Ii modo

- modo infantes fasciis inuoluendi disputat, illumque valde noxium et sanitati eorum aduersum esse ostendit. Sequens caput agit de lacte, in quo de origine qualitatibusque eius tractat, et ostendit, quale lac in nutrice eligenda desiderandum sit. In gravidis iam adesse verum lac, sanguini mixtum, probatur ex sanguine, gravidis venae sectionis ope extracto, in cuius superficie, si in patinam emittitur, verum lac observari potest, ex vrina gravidarum, quae spissa et alba est, tandemque ex metastasi lactea (depo laiteux), quae nonnunquam in gravidis iam observatur.
- p. 225. Capite vicefimo secundo de delectu nutriti-
p. 229. cum et vicefimo tertio tandem Noster de vtilitate agit, quam matres, quae ipsae foetum lactant, ex hac lactatione capiunt, et de periculis, quibus se, dum nutrici infantem tradunt, exponunt. Maximum argumentum ex periculo, a metastasi lactea timendo, sumtum est, quam rem, cum inferius singulari libello de ea Noster disputat, hic praetermittimus. Nec debiliores matres ab hoc officio absoluit, cum foemina, quae foetum per nouem menses in vtero aluit, illum etiam, postquam in lucem editus est, alere possit. Addit, quod eiusmodi foeminae pluribus quoque malis obnoxiae sint et ita maiore quoque cautione, quam aliae, post puerperium opus habeant. Vt alia praetereamus.
- p. 239. Hunc de arte obstetricia tractatum excipit singularis de morbis vteri libellus, vbi in quatuor capitibus de prolapsu inuersione, scirrho, vlcere et carcinomate vteri breuiter tantum et ob hanc ipsam causam vix semper pro dignitate argumentum
p. 243. exponit. Cautione opus est, ne leuior gradus prolapsus vteri, siue descensus eius ex relaxatione al-
p. 248. qua ligamentorum, cui haud raro fluor albus iungitur, pro vlcere vteri habeatur. Rotunda pessaria oblongis Noster praefert, cum difficilius iterum
pr

olabantur. Inter scirrhos vteri ii, qui iunioribus
eminis accidunt, ex Nostri obseruatione, vt plu-
num, remediis aptis cedunt, non aequè ii, qui
illis oriuntur, in quibus menstrua per aetatem
flarunt. Vlcera vtero molesta vel simplicia seu p. 258.
nigna, vel fungosa, seu polyposa, vel venerea, vel
indem carcinomatica sunt. Vidit Cl. Auctor, post-p. 270.
am ligatura partem polypi, ex vtero propenden-
m, sustulerat, ligaturam hanc etiam partem supe-
rem in vtero superstitem destruxisse, radice scili-
t sponte euanescente, orificioque vteri, quod an-
a apertum erat, nunc perfecte clauso.

Sequitur de morbis infantum tractatio, in qua p. 279.
praecipuis affectionibus, quibus pueruli a natiui-
e vsque ad illam periodum, qua viginti dentes
odierunt, obnoxii esse solent, breuiter tantum
putat. In conuulsionibus, quae in dentitione p. 295.
cidunt, venam in pede semper optimo cum suc-
flu secavit.

Adnexi sunt duo commentarii, quorum primus p. 321.
volumine primo commentariorum academiae re-
e chirurgicae sumtus est. Differit vero in eo Cl.
actor, de iis haemorrhagiis vteri, quae grauidis
olestae sunt, atque egregias obseruationes propo-
e, tum de illo sanguinis fluxu, qui ex abortu im-
nente, vel iam facto, prioribus grauiditatis mensi-
s accidit, tum praecipua de eo, qui, placenta vel
ta, vel ex parte tantum soluta, vltimis grauiditatis
mporibus euenire solet, saepiusque foetui et matri
itium affert. Maximam vero attentionem ea in-p. 328.
imis merentur, quae Cl. puzos in hocce com-
entario contra vulgarem methodum profert, qua
haemorrhagia magna, membranis disruptis, foetu
dibus protracto, partus violenter peragitur.
uamuis enim concedat, in eiusmodi malo, ex pla-
ntae solutione orto, vnicum auxilium positum esse

in foetus ex vtero progressu: quo, vtero contracta
 vasorum orificia, ex quibus sanguis promanat, clau-
 dantur; tamen probare contendit, methodum illam
 qua ab obstetricante foetus subito protrahitur, valde
 noxiam esse. Cum enim in illa partus specie eu-
 cuatio vteri nimis subitanea sit, haud raro vterus
 foetu progressu, non contrahitur, quod malum vt-
 ri inertia vulgo dicitur, ita vt haemorrhagia perdu-
 ret, et mater ex illa, vel post operationem, felicitate
 peractam, pereat. Iubet itaque Auctor Cl. mediam
 quasi inter naturalem et violentum eiusmodi par-
 tum viam eligere, lentamque in vtero contractio-
 nem, quae vel post foetus educationem perdure
 excitare, quo, clausis vasis, fluxus quoque sanguinis
 supprimatur. Quodsi itaque, haemorrhagia, obortu
 digito, in vaginam immisso, cognoscat, orificium
 vteri iam aliquantum dilatatum esse, tunc vterum
 in orificio digiti ope leniter irritat, quo illum ad con-
 tractionem stimulet. Orificii vero vteri dilatati-
 nem, hac eius contractione praestandam, digitis,
 illud introductis, adiuuat, quo aquarum vesicae
 descendere et partus naturali modo procedere possit.
 Atque hunc ipsum quoque partum magis adhuc acce-
 lerare studet membranarum disruptione et aquarum
 effluxu, inde sequente, quam quidem disruptionem
 hoc in casu valde utilem et ad partus felicem exitum
 necessariam esse, pluribus argumentis probare
 nititur. In vniuersum vero omnia illa artificia
 quae hic proposuimus, eum in finem Cl. Puzos
 adhibet, quo vterus se circa foetus corpus tanquam
 in naturali partu contrahat, et hoc modo haemor-
 rhagia, clausis sensim sub ipso partu vasorum o-
 rificiis, sistatur.

P. 341. Hunc libellum alius sequitur, prima vice holo-
 loco editus, inque tres sectiones diuisus, quo Auct.
 Cl. de *metastasi lactea* (*depot lacteux*), quae vulgo

lactis (*lait repandu*) vocari solet, disputat. Atque
 hic commentarius eo magis attentione nostra dignus
 est, quo accuratius de morbo nouo, vel antea non-
 um descripto, primum singulari libello Auctor Cl.
 gerit. Ostendit vero primum in grauidis, et iis,
 quae nuper pepererunt, lac insigni in copia prae-
 parari et, cum reliquis humoribus commixtum, per
 alia fluere: transire autem illud in grauidis potissi-
 mum ad vterum, quo ibidem nutritioni foetus in-
 ruiat, post partum ad mammas: lactis vero prae-
 parati copia, non ex toto per foetum in grauida aut
 puerpera consumta, illud per alia corporis colatoria
 e. vna cum lochiis, sudore, vrina, saliuâ aut ex-
 crementis aluinis eiicit, ita tamen, vt semper ali-
 qua portio lactis in eiusmodi foeminis in sanguine
 persistat, prout in sanguine, ex vena emissio, conspici
 possit. Quod si autem lac, vel in quodam corporis
 receptaculo stagnet, vel acidum nimium in corpore
 sit, tunc in coagulum abit, pessimaque symptoma-
 ta producit, quae nomine *lactis effusi* (*repandu*) in-
 riri solent. In vniuersum metastasis lactea non
 semper tumorem quendam in loco, ad quem facta
 est, excitat, sed et tunc iam adest, quando lac in
 suis capillaribus stagnat, aut in telam cellulosa-
 m, vel aliquam corporis cavitatem effusum, deprehen-
 ditur. In puerperis vt plurimum circa decimum
 vel duodecimum diem fit, haud raro tamen tardius
 manifestat. Vti vero omnia alia corporis loca,
 maxime abdominis inferiorem partem et extre-
 mitates inferiores afficit. Multorum quoque alio-
 rum morborum faciem induit, ita vt exanthemata,
 febres intermittentes et malignas, gangraenam et
 paralyzin producat. Quapropter Auctor Cl. quo-
 rum morborum indolem eo melius explicet, eos
 in duas classes, chronicos scilicet et acutos diuidit,
 quae de chronicis malis, quibus metastasis lactea

P. 344.

originem dat, primum exponit. Horum maximam
pars periculo caret, et decimo vel duodecimo die
puerperii signis suis se prodit. Prima ex his spe-
cies est metastasis lactea, quae ad mammam fit,
nec vnquam in cancerum degenerat. licet, si in glan-
dulofo mammae corpore ipso sedem suam habeat,
difficulter sanetur longiusque perduret ea, qua
telam cellulofam occupat. Oritur vero vt pluri-
mum ex lactis nimia abundantia et refrigerio, au-
post ablactationem, quamuis et in hac specie sem-
per quoque peculiaris quaedam in parte, ad quam
fit, dispositio adsit, quae efficit, vt lac facilius a
hunc, quam ad alia corporis loca transeat. Altera
species est metastasis lactea, quae ad extremitate
inferiores fieri solet. Haec primo in regione in-
guinali se dolore et tumore huius partis manifesta-
atque secundum vasorum tractum haud raro ad pe-
dem vsque descendit. Atque his quidem signis a
oedemate distinguitur, cum illud non solum ple-
rumque nullum dolorem excitet, sed et ab inferiori
parte pedum sursum adscendat et vtrumque peder
occupet, cum metastasis vnicum tantum pedem a-
ficiat, saepius tamen ex vno ad alterum transea-
In hac, vt in praecedente specie, Auctor Cl. ant
omnia sanguinis massam a nimia, quam contine-
lactis quantitate, quae quodam in loco obstructio-
nem minatur, liberare tentat. Hinc plures vena-
sectiones statim in initio, vel ipsis lochiis adhu-
fluentibus, aut si eo tempore neglectae fuerint, po-
aliquod tempus instituit, purgantibusque leniori-
bus, et iusculis diureticis primas et vrinarias vi-
liberas reddere studet. Loco vero dolenti fomen-
et cataplasmata discutientia, inprimis ex foliis ebu-
adplicat, et embrocationem cum lixiuio cineru-
clauellatorum quoque commendat, atque illa re-
media omnia, si malum ad alterum locum transeat

rep

repetere iubet. Magis periculosa est illa metastasis, quae in regione hypogastrica accidit. Cum enim, doloribus in eo loco obortis, eorum causa in intestinis vel vtero potissimum quaeratur; difficulter et, malo confirmato, demum cognoscitur. Hinc saepius in suppurationem transit, quae fere semper funestum exitum habet, aut membri usum plane tollit. Non solum enim in hac regione sub cute et in tela cellulosa sedet, sed et interiores partes, maxime ligamenta lata et ouaria occupat, grauissimaque destructionis causa existit. Hinc Cl. Auctor medicum, qui puerperae non lactantis curam habet, sedulo attendere iubet ad omnes dolores, in hac parte ortos, quo illos a doloribus post partum, qui lochiorum fluxum promoueat, distinguat, statimque morbum aptis remediis debellare studeat. Vixit autem, usu aptorum remediorum neglecto, aegras tamen post aliquod tempus, tumore iam se exterius manifestante, conualuisse, obstructione illa lactea eliciter reuerata, materiaque stagnante per alia corporis colatoria edueta.

Secunda huius tractationis sectione agit Noster P. 367. de morbis acutis, ex lactis metastasi ortis, qui prius post puerperium diebus accidunt, et intra quintum vel sextum post partum diem iudicantur. Magna in vniuersum cautione opus est, ne cum febre lactea, aut doloribus post partum confundantur, necessariaque auxilia ideo negligantur, quod plerumque aegrae funestum esse solet. Hinc tenendum est, febres hasce, citius aut tardius febre lactea, riri, grauissimisque symptomatibus, siccitate cutis, cephalalgia, et prostratione virium stipari. Dolores vero colici, qui eiusmodi morbos praecedunt, frequentius, breuioribusque interuallis inter se distincti, accedunt consuetis post partum doloribus. Lochia quoque ichorosa quasi sunt. Si eiusmodi mala

iam ante puerperium adfunt, neque per illud leuantur, fere femper aegra perit. Neque felicior ut plurimum exitus morbi eft, fi fub specie inflammatoriae febris aegram ftatim poft partum aggreditur, in quo cafu Nofter faepe lacteam materiam coagulata, in abdominis cauum effufam, fectione cadaueris inftituta, detexit. In omnibus vero eiusmodi morbis venae fectiones repetitas Nofter, lochiis etiam adhuc fluentibus, inftituendas effe pluribus demonftrat. Potefit tamen venae fectione omitti, fi alia excretio v. c. diarrhoea fpontanea accedit. Laudat praeterea purgantia et lenia diaphoretica atque diuretica. Non adeo funefta eft illa febris fpecies, cum qua dolor fixus in parte quadam coniunctus eft, v. c. pleuritis lactea etc. in qua nullum fputum cruentum, respiratio non femper difficilis, nullum delirium, omniaque fymptomata leuiora funt.

P. 377. Sub *exanthematis lactei* (*eruption laiteufe*) nomine purpuram albam puerperarum Auctor Cl. describit, quae vel benigna vel maligna eft, faepiusque ex regione nimis calido oritur. Haud raro maiores veficulas Nofter obferuauit, quae puftularum variolorum magnitudinem aequabant. Exanthema lenioribus diaphoreticis et diaeta accuratioe fufstinere fuadet, euacuantia vero hoc in cafu negligit. In fine huius fectionis de metaftafi lactea, quae in grauidis, licet rarius fit, difputat, quamuis ad chronica potius mala pertineat. Iam quarto vel quinto mense accidit, nec raro hypochondria aut pedes occupat, quas in partes foetus magnam preffionem exercet. Similia auxilia, quae in aliis fpeciebus commendauit, etiam hic Nofter laudat, venae fectiones fcilicet et purgantia leniora, non neglecta topicorum remediorum adplicatione.

P. 387. Tertia huius commentarii fectione Cl. puzos, de metaftafi lactea ad cerebrum difputat, ex qua
chroni-

chronica amentiae aut maniae mala oriuntur. Accidit illa etiam decimo vel duodecimo post puerperium die, aut ex alia metastasi, quae in alio loco orta, post variorum remediorum adplicationem subito ad cerebrum transit. Difficulter hoc malum sanatur et longam medici curam exigit. Vnicum vero auxilium in euacuantium usu positum est, venae sectione scilicet et purgantibus, quae, remedia nonnunquam Noster per quatuor menses adhibuit. In fine huius sectionis Auctor observationes quas P. 393. dam de malis chronicis rebellibus, ex metastasi lactea ortis, sola naturae vi, aegra scilicet de nouo grauidam facta, curatis profert.

Ab Editore Cl. addita est Gallica versio egregiae P. 395. dissertationis Cel. CRANTZ de utero rupto, de qua iam alio in loco ad lectores retulimus *).

*) vid. Comment. nostr. Suppl. II. p. 372.



XIX.

Select Cases in Surgery Collected in St. Bartholomew's Hospital. By J. FARMER Surgeon. London, printed for I. Hinton, 1758. 4 mai. pl. 5.

i. e.

Selectiores casus chirurgici in nosocomio Londinensi, quod a St. Bartholomaeo nomen habet, collecti. Auctore I. FARMER.

Libellus hic duodecim comprehendit observationes chirurgicas, quae vero plane nil noui aut praecipua quadam attentione digni continent, cum vulgares sint, et tantum ostendant, Auctorem Cl. regulas, quas chirurgicae artis theoria tradit, in praxi sua cum iudicio adhibuisse. Prima vero illarum agit de ambustione pedum; secunda de contusione integumentorum cranii; tertia de digitis fere abscissis, solius suturae siccae ope, perfecte iterum unitis: quarta de carie tibiae: quinta de lithotomia: sexta de empyemate, post pleuritidem nato, ubi aeger, pure educto, perfecte iterum sanatus est: septima et octaua de vulneribus in brachio ope globuli, e sclopeto emissi, factis: nona de pure in antro HIGHMORI collecto, post dentis molaris extractionem educto: decima de excrecentiis in labiis pudendi, ligaturae ope sanatis: vndecima de fractura vtriusque femoris cum gangraena imminente, contra quam scarificatio magnum usum habuit: duodecima de abscessu, post venae sectionem, in pede non recte forte administratam, nato.



XX.

D. LAURENT. HEISTERS, *der Arzney und Wundarzney öffentlichen und ersten Lehrers in Helmstädt etc. medicinische, chirurgische und anatomische Wahrnehmungen. Rostock, verlegt I. C. Koppe, 1753. 4 mai. Alph. 6. pl. 10. tab. aen. 8.*

i. e.

LAURENTII HEISTERI, M. D. *Observationes medicae, chirurgicae et anatomicae etc.*

Solet magnorum artificum operibus suum semper pretium statui, etsi non accedant ad eam pulchritudinem, quam in praecipuis et primis quorundam opificiis admiramur. Produnt enim semper nonnulla vestigia ingenii et artis, qua pollent ipsorum Auctores, atque vel ob hanc, attentionem laudemque contemplantium iure suo postulant. Idem igitur iudicium etiam ferendum putauimus de hac collectione observationum medico-chirurgicarum Cel. quondam HEISTERI, quam licet non ex omni tamen vel aliqua ex parte, commendandam suscepimus. Quamquam enim plures in ea continentur observationes, quae parui tantum momenti sunt, cum vulgarium morborum historiam tradant, quam statim excipiunt formulae, a Cl. Auctore praescriptae: et ratio porro, qua eae conscriptae sunt, ostendat, Auctorem illas suae instructionis causa, non publicam in vtilitatem litteris mandasse: denique fere omnes observationes, quae praecipua aliqua attentione dignae esse videntur, vel in Actis Academiae Naturae Curiosorum, vel in aliis HEISTERI Cl. scriptis contineantur, atque in vniuersum primo tantum

tantum et secundo huius saeculi decennio collectae sint; tamen fatendum est, librum hunc non omni vtilitate carere. Putamus enim, chirurgos iuniores, qui initio praxeos suae haud raro de methodo medendi et aptis remediis eligendis dubitant, ex huius libri lectione aliquam vtilitatem capere posse. Ad quod accedit, quod et in tanta observationum copia, quarum numerus ad 680 adscendit, variae etiam sint, quae maiorem attentionem merentur, neque satis adhuc notae nobis fuerunt, ex quibus sequentes speciminis loco indicasse sufficiat.

- p. 28. Eo, quo inter Batauos commoratus est Auctor Cl. tempore, apud Cel. RUYSCHIIUM veram tympanitidem, aëre in ipsam cavitatem abdominis effuso, observavit. Adnotavit quoque ea, quae, RAVIO, lithotomiam administranti, adstans, ex eius methodo discere potuit, inter quae situs perfecte horizontalis, in quo RAVIUS aegros collocavit, praecipue notari meretur. De eodem quoque RAVIO narrat, illum, si in herniotomia intestina, gangraena iam corrupta, deprehenderit, aegros statim reliquisse, neque operationem ad finem perducere voluisse. Vulneratum vidit Noster, in quo glans plumbea caput ita penetrauerat, ut vterque nervus opticus in fundo orbitae, oculo ipso illaeso, laceratus esset, ex qua re perfecta coecitas, ipsis oculis plane non mutatis, nata est. Duos quoque vidit Auctor Cl. homines, qui, nullo morbo praegresso, omnium pilorum in toto corpore defluuium passi sunt. Paralyfin quoque singularem in aegro quodam Noster observavit. Hic enim brachium dextrum plane movere non poterat, erat autem sensus in illo superstes; facultatem vero movendi pedem eiusdem lateris fere perdiderat. Contra autem motus in brachio et pede sinistri lateris supererat, licet extremitates illae sensu omni carerent, ita ut
vulnera

vulnera, illis inflata, nullum huic homini dolorem
 excitarent. In partu difficili capite praeuio perfo- p. 336.
 rationem forficis ope instituit, et deinde vulgari for-
 pice, quae in lithotomia adhiberi solet, ad reliquam
 extractionem foetus absoluendam vsus est. Sectio- p. 347.
 ne cadaueris foetus, qui in orificio intestini recti
 nullam naturalem aperturam habebat, detexit, co-
 lon tantum adesse, intestinum vero rectum plane
 deficere, aut potius concretum esse. Chirurgus sa- p. 571.
 tis imperitus in ischuria pertinaci vesicam, supra ossa
 pubis tumentem, quam pro abscessu habebat, pun-
 ctura eius hoc in loco aperuit, maximo cum aegro-
 tae commodo, quae paullo post perfecte sanata
 fuit. Quod exemplum docet puncturam vesicae
 hoc in loco commodissime fieri posse. In sectione p. 738.
 cadaueris aegroti, qui ante obitum magnam copiam
 aquae florum naphae adsumserat, obseruauit Noster
 omnes cadaueris partes, odore huius aquae imbutas
 ta, vt quaecunque pars discissa odorem florum illo-
 rum de se spargeret. Ex odore liliorum alborum p. 792.
 apoplexiam oriri vidit lethalem. Iuuenem, tanta li- p. 834.
 gamentorum pedis laxitate laborantem, vt in solo
 gressu pedis saepius luxationem experiretur, exter-
 no spirituosorum vsu sanauit. Officulum, in laryn- p. 1026.
 gem illapsum, bronchotomiae ope, in qua varios an-
 nulos secundum longitudinem diuisit, feliciter ex-
 traxit aegrumque sanauit. Atque haec de obserua-
 tionibus ipsis sufficiant. Quod vero ad tabulas ae-
 neas attinet, tenendum est, figurarum quoque in
 iis contentarum, maximam partem ex aliis Auctoris
 Cl. scriptis sumtas esse, quod in primis de figuris
 anatomicis valet.



XXI.

Observations on that Disorder of the corner of the Eye, commonly called Fistula lachrymalis by PERCIVALL POTT, surgeon to St. Bartholomew's - Hospital. London, printed for C. Hitch and L. Hawes, 1758. 8 mai. pag. 85.

i. e.

Obferuationes de morbo anguli oculi, fistula lacrymalis vulgo dicto. Auctore PERCIVALL POTT.

Oculorum morbos ob subtilem organi visus fabricam maxima cum attentione disquirendos esse, qua neglecta, haud paucos chirurgos in errores deduci, Cl. Auctor in praefatione monet, et accuratorem viam in diiudicanda fistula potissimum lacrymali ingredi conatur. In sectione prima varias opiniones proponit, quae carunculae lacrymali inprimis secretionem lacrymarum et sedem huius morbi adscribunt: cum tamen accuratius examen anatomicum doceat, lacrymarum secretionem in glandula fieri, easque sua natura blandas esse, saccum autem lacrymalem veram morbi sedem ductuumque nasali

p. 2. lium obstructionem eius causam existere. Veteres hunc morbum congestionem inflammatoriam, in abscessum procliuem, dicebant, discussione itaque non praestita, abscessum incidebant, dilatabant, vel prorsus exscindebant; quando vero cariem subesse cognoscebant, cauteriis callum destruebant et exfoliationem iuuabant, curatione autem non succedente, morbum insanabilem pronuntiabant. Recentiores, vera partium fabrica instructi, originem morbi

morbi in obstructione sacci lacrymalis quaerebant, ita, vt abscessus non causa fit, sed effectus morbi, hinc obstructions remouere et vias lacrymales liberas reddere annituntur.

In sectione secunda organa, lacrymas secernentia p. 6.

et deriuantia, breuiter describit, et inprimis declarat, faccum non minus, quam ductus lacrymales, membrana, pituitariae simili, inuestiri, per quam mucus latera inungens, secernitur; haec, vtpote vasculosa, haud raro inflammatur et crassior fit, et ductus obstruendo transitum lacrymarum impedit, quo facto mucus, spissior redditus, ibidem haeret et, dilatato sacculo, in oculi angulo interno tumorem eleuat, ex quo pressio mucosus humor promanat et fistulam lacrymalem formari ostendit. Sic quidem

sedes et causa primaria in omnibus aegris conuenit, p. 13.
varietates tamen morbi insignes sectione tertia quodammodo proponuntur, et praecipue a vario gradu obstructionis ductus nasalis, a membranae cellularis, faccum inuoluentis, mutationibus, a sacci ipsius et ossium teneriorum vicinorum laesionibus, ab aegrorum habitu vniuersali et a medendi ratione pendent. Membrana interna ex affluxu feri interdum crassior redditur et canalem obstruit, tunc vero, cute vix vitata, tumor in angulo oculi deprehenditur, qui hernia vel hydrops sacci lacrymalis dicitur. Morbus tunc sine magno incommodo est, si vero cutis color mutatur, inflammatio et dolor augentur, mucus diutius haeret, tunc pus mouetur, qua occasione Noster in differentia muci et puris declaranda versatur. p. 18.

Anchylopiis et aegylopiis differentiam ita definit. Si membrana cellularis inflammatur, et rubor vel in angulo oculi subsistit, vel ad palpebras et nasum producit, et puncta lacrymalia maiora sunt, materia, in sacco contenta, libere exit, tunc cutis p. 26.

cutis adhuc integra manet et anchylops dicitur, si vero puncta lacrymalia minora sunt, vel a membrana cellulari inflammata contrahuntur, materia non libere exit, cutis in angulo oculi disrumpitur, et aegylops oritur. Ex qua re multae deriuantur morbo sae mutationes, quae ex laesione principe pendent vel varia alia vitia coniuncta habent, v. g. lippitudinem, ozaenam, nasi polypum, cancerum cet.

p. 30. In sectione quarta medendi rationem demonstrat, quae eo redit, vt, obstructione remota, lacrymis via libera concedatur, et si hoc fieri nequit, via artificialis paretur. Tres vero potissimum differentias describit: dilatationem facci ab obstructione ductus nasalis sine inflammatione; inflammationem cum abscessu et tandem obliterationem viae cum vel sine carie ossium vicinarum, qua occasione monita quaedam de methodo medendi quorundam auctorum subiungit.

p. 36. In obstructione sine inflammatione specilla Aneliana nimis flexibilia iudicat et teneram fabricam laedere affirmat, siphunculi vero usum in recenti morbo commendat. Machinam comprimentem FABRICII AB AQUA PENDENTE obstructionem magis augere, quam eidem mederi affirmat, laudat vero collyrium, ex vitriolo paratum. Noua ab academia chirurgica Parisina proposita auxilia obiter tantum

p. 45. commemorat. Si partes inflammatae vel exulceratae sunt, et mucus, cum pure mixtus, excernitur, facci incisio necessaria iudicatur; haec satis ampla sit et a loco, vbi palpebrae conuiuent, distet. Scalpello curuo efficitur, quo eius apex in saccum immitti isque satis dilatari queat, vulnere, vero vt decet, depurato, via lacrymarum libera redditur et cicatrice clauditur.

p. 50. Specillo vero argenteo, vel alia ratione via, ad nares obstructa, interdum aperienda est, qua in re multa attentione in deligando opus est.

st, quo partes tenerae satis quidem, attamen non
 ultra modum comprimantur, quo interea iniectiones
 mundificantes, et si fungosa caro excrescit, la-
 is infernalis, quem inter caustica potentialia ma-
 me laudat, applicetur. Addit varia monita de p. 58.
 actu per totum sanationis tempus aperto seruando,
 de sacco post sanationem lente comprimendo, ne
 erum dilatetur.

In sectione quinta de eo morbi statu agitur, vbi p. 62.
 ae non solum obstructae, sed etiam destructae et
 terdum ossa vicina cariosa sunt, tunc enim auxi-
 um chirurgicum in noua et arte efficienda via po-
 um est. Ita enim veteres iam, vt ex CELSI
 orumque testimoniis probat, viam lacrymarum ad
 rium cavitatem dirigebant, quoniam autem cum
 rie ossium callositatem coniunctam videbant, hic
 dem modo, vt in aliis corporis partibus, cauterio
 ebantur. Quamquam vero nostris temporibus

c vehemens auxilium ita moderatur, vt ferrum
 ndens per cannulam ferream tantum ad locum
 ectum adigatur, et CHESELDENUS aliique p. 72.
 estantiam huius operationis ex eo probant, quod,
 ua via facta, non facile clauditur, Noster tamen
 sequitur, qui incisione satis ampla vtuntur,
 amine postea ad constantem callositatem dedu-
 . Variis instrumentis in perforatione vtuntur,
 Auctor acum triquetram seligit, eo enim modo
 vnguis proxime post saccum perforatur, nullum-
 e incommodum ex apertura ampla relinqui, si
 am totum os vnguis destruatur, affirmat.

Perforatione facta, nec cannulam, nec turundas p. 80.
 eas, sed ex filis lineis, dense contortis, turundam
 nittit, quae vsque ad narium cavitatem pertin-
 eamque per aliquot dies relinquit, carnisque
 gosae incrementum puluillis lineis siccis, pressius
 ositis, coercet. Quando autem densa caro ac-

Supplement. III.

K k

crescit,

crescit, chirurgus concretionem nouam optimam auertit, si vel turundas, immittendas, in apice spiritus vitrioli imbuit, vel partes, nimis incrementales, lapide infernali tangit. Vulnere tandem puro apparente cerei partem immittit, quo magnitudo canalis relinquendi definiatur, externum autem vulnus, apta methodi ratione adhibita, cicatrice firma claudit.

XXII.

Institutes of Experimental Chemistry: being an Essay towards reducing that branch of Natural Philosophy to a regular System By the Author of the *Elaboratory laid open*, etc. Volume I. London, printed for J. Nourse, 1759. 8. Alph. 1. pl. 11. Volume II. Alph. 1. pl. 7.

i. e.

Institutiones chemiae experimentalis, quae tamen sistunt, ad cuius normam pars haec philosophiae naturalis ordine systematico pertractari poterit. Ab Auctore elaboratae et aperti etc. Vol. I. et II.

Quantum ex praefatione videre licet, librum hunc tanquam introductionem in chemiam philosophicam, quae experimenta, systematice ordinata, continet, considerandum esse, Notandum cupit. Quod ad ordinem tractationis attinet, primo Cl. Auctor de natura chemiae experimentum agit, deinde indolem et proprietates corporum considerat, quae auxilia praebent, per quae diuersi fines obtineri possunt; porro de vniuersali applicatione

tionem indolis et proprietatum corporum ad obtinendum finem vniuersalem chemiae experimentalis, tum autem instrumenta et supellectilem chemicam describit, tandem de operationibus generalioribus exponit. Praemissa hac consideratione, quae tanquam theoretica pars huius libri considerari poterit, ad disquisitionem corporum naturalium progreditur Cl. Auctor, ac primo quidem de terris agit, deinde salia et salinas substantias considerat, porro de animalibus substantiis exponit, quae cuncta in priori tomo continentur, in posteriori autem tomo de vegetabilibus, ultimo de mineralibus agit, atque super his omnibus experimenta et animaduersiones communicat.

Obiectum chemiae experimentalis ex Nostri Tom. I. contentia vel compositio substantiarum magis simplicium et elementarium, vel analysis, seu, ut Noster dicit, *decompositio* corporum compositorum, vel eorum mutationes conditionum sensibilibus corporum, per artem productae, praebent. Finis chemiae in disquirendis et detegendis partibus constitutis corporum compositorum, itidemque disquirendis et detegendis auxiliis, generationi vel dissolutioni corporum inferuentibus, atque qualitatibus specificis substantiarum elementarium et compositarum consistit. Auxilia duplicis generis sunt: vel nim ea naturales corporum proprietates et qualitates suppeditant, quae per mutuam corporum applicationem eo disponuntur, ut desideratos effectus producant, vel ab instrumentis obtinentur, quae ita per artem adaptantur, corporibusque applicantur, ut haec ipsa rite in se inuicem agere queant. Subiecta chemiae quaeuis corpora naturalia dant, quae obtineri possunt, ut operationibus necessariis subiici se patiantur. Proprietates corporum naturales, per quas effectus producuntur, sunt grauitas,

vel vis attractrix vniuersalis, vires attractrices specificae, soliditas, fluiditas, calor, inflammabilitas, volatilitas, fixitas, vitrescibilitas, putredo et fermentatio.

p. 70. Compositio corporum, seu generatio per vires attractrices specificas substantiarum, inter se inuice commixtarum, obtinetur, analysi vero, seu *decompositio* per calorem, separationem, combustionem, putrefactionem et fermentationem producit. Mutationes demum qualitatum sensibilibum absque habito respectu ad compositionem vel dissolutionem, vel ad fluiditatem et siccitatem corporum, vel ad texturam, vel ad densitatem et raritatem vel ad colores, vel ad vitrescibilitatem, vel formam salium aliorumque corporum crystallinam et ad formam irregularem, compositis quibusdam corporibus propriam, spectat.

p. 83. His expositis, instrumenta artis mechanica Nestor considerat, et inprimis de vasis destillatorii, sublimatorii, phialis, filtris, infundibulis separatoriis, lutis, vasis, cupellationi auri et argenti, non calcinationi mercurii inseruientibus, crucibus mortariis et furnis agit.

p. 166. Consideratis instrumentis, operationes et enchiridies, in instituendis operationibus obseruandas, requirit, et de combinatione, separationem, dissolutione, coctione, exsiccatione, destillatione, sublimatione, solutione, fusionem et calcinationem, hasque tanquam generaliores operationes considerandas et absque vlllo discrimine respectu corporum tam diuersorum instituendas esse, autumat. Atque autem operationes, vt crystallisationem, calcinationem, cupellationem et fermentationem, specialioribus habendas, cum aliquibus tantum corporibus suscipi, nec vbique valere, monet. Atque tandem, vt triturationem, decantationem et

olutionem, mechanicis fundamentis niti, et, licet
chemiam proprie non pertineant, maxime tamen
necessarias esse, innuit.

His itaque praemissis, sic dictos processus ac p. 225.
atim ab initio eos tractat Cl. Auctor, qui ad
rras spectant. Terrae in vniuersum in tria gene-
diuiduntur, nimirum in terram organicam, id
t, quae ope vis vitalis animalium et vegetabilium,
um aliis substantiis coniuncta, partes organicas for-
at, deinde in terram metallicam, quae cum phlo-
sto coniuncta, metalla generat, tandem in terram
pideam, quae quidem ad producendos lapides, ne-
e tamen vnquam ad formandas partes animalium
vegetabilium apta est. Terra organica, vt No-
er putat, vnius eiusdemque indolis est, terrae
metallicae vero indoles diuersa dicitur, totque for-
n terrae sunt, quot numerantur metalla. Lapideae
um terrae triplicis generis sunt, aliae nimirum
crescibiles, aliae calcareae, aliae tandem apyrae
cantur. Primam speciem terrae ab omnibus di-
ngui, dicit Noster, quod igne, plus minus in-
so, in vitrum abeant. Verum eiusmodi terras,
purae sint, absque additamento in vitrum non
re, monemus; et licet in sexto processu ad expe-
ntiam prouocat, qua demonstrare annititur, fili-
calcinatos absque additamento in vitrum, im-
fectum tamen, abire, terram autem, seu lapides,
os impendit Noster, puros fuisse dubitamus.
ecce terra, vitrescibilis nominata, vt Noster as-
it, basin suppeditat filicibus, argillae, terris
ulinis, bolis, terrisque sigillatis, qua in re nos,
experientiam edocti, Cl. Auctori suffragamur.
mo basin schisto, ardesiae tegulari, et molybdae-
praebere, autumat. Terrae calcareae eae
t, quae basin diuersorum lapidum, per calcina-
nem in calcem abeuntium, sistunt. Inest haecce

terra spato, marmori et lapidi sic dicto calcareo. Quid? quod stalactiten ad hasce terras referri posse Noster asserit. Apyrae demum terrae sunt, quae nullam fere ab igne patiuntur mutationem. Ad has a Nostro referuntur creta et margae species terra Tripolitana, creta cimolia, mica et ea terra quae basin iis lapidibus praebet, qui calcinationem respuunt, ut asbestus, lapis serpentinus etc. quibus praemissis, processus quosdam ad illustrandum communicat, de quibus vero, cum notissimi iam sint, decerpere nihil placuit.

P. 257. Ad salia cum Nostro progredimur: haec in sensu proprio sumpta, ea dicuntur corpora, quae ab aqua solvuntur, quaeque, si ab aqua calida soluta sunt hac frigefacta, in solidum corpus pellucidum definitivae figurae abeunt. Acida, quae ab aliis pro singulari genere salium habentur, ad salia a Nostro non referuntur, sed ex eius sententia ad elementa salium pertinent. Elementa autem salium sunt acida, substantiae inflammabiles et terrae. Ex his omnia salia composita esse, Noster bene asserit. Quae ad salia proprie sic dicta pertinent, in quatuor genera diuiduntur, suntque ea 1) alcalia 2) alcalescentia, 3) salia media; 4) salia acescentia. Alcalia sunt, quae coniunctionem cum acidis amant, atque colorem rubrum tincturae ligni Brasiliensis aliorumque vegetabilium in purpureum mutant, syrumpumque violarum coeruleum viridi colore tingunt, haecque in fixa et volatilia rursus diuiduntur. Alcalescentia dicuntur, quae ex alcali et acido oriuntur, ita tamen, ut ad indolem alcalium vergant, similesque effectus edant, et violarum v. syrumpum colore viridi tingant. Ad eiusmodi salia boracem, tartarum solubilem et sal istud, quod arsenico et alcali fixo producitur, Noster referit. Media salia, ut notum iam est, vocantur, quae

acido

acidis et alcalinis producta, tales substantias praebent, quae neque characterem acidi, neque characterem alcali ultro ostendunt. Haec vel vera salia media sunt, id est, quae ex acido et alcali fixo producantur, vel salia ammoniacalia, quae ex alcali volatili et acido generantur, vel salia media terrea, quorum basis terra mineralis est, vel demum salia media metallica, quorum basin metallica corpora praebent. His salia media vegetabilia, acescentia, accensenda esse, Noster monet, quae, cum a natura secundum leges, a praecedentibus diuersas, generentur, ad classes hactenus recensitas, ut putat Cl. Auctor, referri nequeunt, sed propriam classem constituunt. Omnia haecce salia obiecta praebent, quibuscum varia experimenta institui possunt. Operationes, quae huc spectant, sunt incineratio vegetabilium et subsequens solutio, depuratio et exsiccatio, deinde destillatio et rectificatio, porro alcalium cum acidis coniunctio, tum attractio acidi aerei a matricibus alcalicis. Omnes haec operationes ad salia pertinent, quae pro naturalibus habenda non sunt. Aliae operationes, quae ad mutationem salium in salia alius naturae spectant, sunt caementatio, saliumque commixtio. Alia operatio, per quam salia ad recuperandam figuram propriam disponuntur, crystallisatio est. Alia demum operatio, quae ad analysin seu *decompositionem* salium pertinet, in calcinatione et separatione consistit. Cuncta haec Cl. Auctori experimentis satis notis illustrare placuit.

Ad animales substantias transit Noster, quarum p. 363. partes constitutivas terram organicam, phlogiston, aquam et acidum esse, ostendit. Eadem etiam elementa in vegetabilibus reperiri, ideoque tum haec, tum animalia ex iisdem componi, eademque in omnibus partibus animalium vnus eiusdemque

indolis esse, ideoque partes animales omnes per putrefactionem et combustionem in substantias vnus eiusdemque naturae abire, autumat. Analysis seu *decompositio* substantiarum animalium et vegetabilium, vt Noster putat, ab ipsa natura per putrefactionem praescripta est. Per hanc analysis nexus substantiarum animalium et vegetabilium destruitur, elementorum tamen separatio plenarie per eandem non obtinetur, siquidem nouae combinationes producuntur, sola terra excepta, quae in statum simplicem redigitur. Substantiae, in quas omnes partes animalium abeunt, sunt salia alcalina volatilia, olea aetherea, terra, aqua et vapor nunquam condensandus. Omnes hae substantiae etiam terrae maxima pars, aliqua excepta, colligere nequeunt, siquidem corpus animale, per putrefactionem destruendum, aeri liberiori exponi debet, qui vero dissipationem per euaporationem excitat. In analysi, quae per combustionem fit, quoque putrefactio festinata, seu praecipitata dicitur, substantiae memoratae eodem modo se habent, praeter id quod mutua earundem relatio mutetur, atque oleum illud cum acido nitri aereo, seu acido nitrico additi coniunctum, dissipatur. Praeterea quoque oleum piceae consistentiae ope caloris producit, qui istud citius transire cogit, antequam in statum illum aethereum mutetur, qui ad euaporationem per putredinem necessarius est. Ob eandem rationem maior terrae portio per combustionem obtinetur, cum oleum transeat, priusquam cum terra connubium ad producendum sal alcalinum volatile ineat. Reliquae substantiae, vt in putrefactione fit, dissipantur, excepta pauca portione olei picei et salis volatilis, quae ope camini perlongi similisque instrumenti retineri possunt. Durante combustionem, fluidum superfluum primo euaporat, postmodum

fa

al volatile cum oleo abit; oleum quod nunc in statu aethereo est, cum acido nitroso aereo se, ut Notter saepissime dicere solet, *commensstruat*, atque cum hoc subitissime fiat, in corporibus *commensstruantibus*, sub qua voce Cl. Auctor affinia corpora intelligit, calor lucens producitur, qui flamma vocatur. Aliqua tamen substantiae inflammabilis pars relinquitur, quae, cum terra coniuncta, per hanc et per acidum quoddam fixa redditur. Haec substantia carbo nuncupatur, qui non nisi in aere libero prope accedentis acidi aerei nitrosi perfecte comburi potest. Quod ad analysin substantiarum animalium in vasis occlusis attinet, eadem substantiae, quae in combustionem, in conspectum veniunt. Obti-
nentur nimirum aqua atque partes illae cum terra, quae oleum et sal constituunt, aliqua phlogisti pars, cum terra coniuncta, in carbone relinquitur, qui in vasis occlusis nullam ultro mutationem patitur. Caeterum quoque partes animalium praeter combustionem et putrefactionem alio modo separari inque partes resolui possunt. Haec vero *decompositio* ad naturam animalium, in vniuersum consideratam, non pertinet, sed singulis partibus propria est. Sic in partibus durioribus analysi quidem generalis, quae fit per combustionem et putrefactionem, atque omnibus substantiis animalium communis est, valet, sed in iisdem quoque partialis quaedam analysi locum habet, quae in educatione substantiae conglutinantis per coctionem consistit, quaeducta, partes molliores et friabilioreseuadunt. Interdum analysi seu *decompositio* prorsus singularisprehenditur, eaque non ad partes organicas, sed ad substantias spectat, quae partes animalium ob diuersos humores secretos varias reddunt, et eam ob causam ibi depositae esse videntur, quod ad peculiarem indolem animalis pertinent. Operationes

igitur, quae praeter vniuersales illas, omnibus partibus communes, hic locum habent, sunt respectu partium molliorum et minus durarum coctio, quae ad educendum gluten animale adhibetur; deinde respectu ossium solutio in aceto vel acido nitri et salis; tandem respectu substantiarum, quae non organicae sunt, solutio per spiritum vini, lixiuia alcalina, vel aliud menstruum conueniens praestanda. Omnes has decompositiones, generales aequae, ac speciales, per experimenta illustrata deprehendimus.

P. 411. Fluidas animalium partes itidem *decompositionis* obiectum sistere, Noster ostendit. Sic *decompositio*, quae sanguini, ex vena misso, propria est, per solam quietem vel per agitationem baculi aliusque instrumenti ope praestandam, vel per acida, salia et alia corpora addita obtinetur. *Decompositio*, urinae propria, quae ad solam separationem salis eiusdem ab aliis partibus pertinet, per crystallisationem, praemissa euaporatione, praestatur. *Decompositio*, bili propria, per addita acida, et *decompositio*, lacti propria, per solam quietem, per ebullitionem, per coagulationem, acidorum ope praestandam, et per coctionem cum alcalinis salibus fixis obtinetur. Generalis vero fluidorum animalium *decompositio* per destillationem et per incinerationem, praemissa euaporatione, instituitur. Quod tandem ad substantias, quae huic illiue animali propriae sunt, e. g. ad separandum acidum, in formicis deprehendendum, attinet, quaeuis earum peculiarem operationem postulat, quae ad generatiles regulas institui nequit. His in genere consideratis, experimenta subnectit Noster, per quae dicta illustrare simulque ostendere annititur, quemnam usum eadem in re medica aliisque disciplinis habeant.

At

At vero, experimenta quoque, cum excrementis animalium instituta, refert Cl. Auctor, idque eum quidem in finem, quo pateat, quaenam sit salium natura, quae per decompositionem excrementorum obtineri possint. Sic ex hominum excrementis per solutionem in aqua, percolationem, euaporationem et crystallisationem salem ex observatis HOMBERGII ostendit Noster, qui salis tartareis, nitrosis dicit HOMBERGIUS, similis cum flamma rubra comburitur, et destillatus quam saporis acris acidi, nec non oleum fuscum odoris fortis empyreumatici praebebat.

Transeamus ad alterum tomum, in quo Cl. Tom. II Auctor experimenta, cum plantis et mineralibus instituta, tradit. Experimenta haec cum partibus plantarum solidioribus organicis, fibrosis nimirum, quae in omnibus plantis, licet respectu texturae, densitatis, tenacitatis, duritiei etc. differant, mutatione indolis tamen eadem semper sunt, deinde tum solidioribus aliis non organicis, quae in nonnullis plantis partem propriam constituunt, et in variis generibus eorumque speciebus omnino differunt, porro de succis plantarum, tum de salibus earundem, posthac de substantiis gummosis, iam vero de substantiis inflammabilibus, ultimo de acidis plantarum natiuis Cl. Auctor instituit. Operationes ipsae, vel in decompositione plantarum per calorem et putredinem, vel in separatione partium a se inuicem, vel in combinatione earundem mutua et coniunctione cum aliis corporibus aliis indolis, vel demum in variis mutationibus, quae absque additamento vel decompositione in colore earundem, nec non spissitudine et tenuitate aliisque conditionibus producuntur, consistunt.

Quod

p. 52. Quod ad fibrosas vegetabilium partes attinet, rasuram ligni cuiusdam per aliquot horas coxit, coctum postea, aqua affusa, cum lixiuio saponariorum rursus coctioni, per aliquot horas subiecit, atque, lixiuio effuso, rasuram coctam aqua simplici pura aliquoties eluit, tandem exsiccauit, ficcataque, retortae commissam et destillatam, aquam acidulam, oleum tenue et crassum, nec non carbonem dedisse, qui in aere libero combustus, terram, animalium terrae organicae similem, exhibuerit, perhibet. — Hasce partes pro partibus vegetabilium propriis habendas esse, monet.

p. 56. Experimenta, quae Cl. Auctor cum succis plantarum fecit, ostendunt, succos plantarum aquosos ex substantiis salinis vel gummosis, cum aqua et interdum cum acido vegetabili coniunctis, compositos esse, succos autem plantarum lactescentes ex substantia gummo-resinosa constare, et succos demum inflammabiles, seu, ut Noster dicit, sulphureos, qualem sic dictum *toxicodendron* praebere dicitur, per incisionem ex arbore fluere, et pro succo admodum venenato habendum esse; cum quibus vero respectu partium componentium nullum experimentum institutum deprehendimus. Hisce experimentis eadem ratione alia subiungit Noster, per quae ostendit, quomodo salia, gummata et substantiae inflammabiles ex plantis educi, eademque decomponi et vario modo cum aliis corporibus componi possint.

p. 239. Tandem quoque experimenta, cum substantiis metallicis capta, Cl. Auctor communicat, inque his ita versatur, ut considerationi generaliori, de metallicis corporibus praemissae, primo ea experimenta adnectat, quae ad separationem metallorum et minerarum per elutriationem, vel per amalgamationem a substantiis lapideis aliisque, posthac ad
vstu-

ustulationem minerarum earundemque reductionem, porro ad calcinationem metallorum et calcinatorum reductionem, tandem ad combinationem inter se inuicem et ad coniunctionem cum aliis corporibus, rursusque ad eorum separationem, per praecipitationem obtinendam, pertinent. Quibus expositis, experimenta, cum singulis metallis instituta, apponit Noster, ita tamen, ut non solum processus instituendos describat, sed insimul ostendat, quemnam usum metalla, varie mutata in hac, vel illa arte praestare possint.

Haec sunt praecipua, quae ordinem tangunt, ad quem librum suum composuit Cl. Auctor. Miramur autem omnino, cur magni nominis vir BOERHAAVIUS, qui in chemicis suam certe laudem meretur, a Cl. Auctore tam acerbe vituperetur. Non solum enim in praefatione, sed per totum librum Viri huius manes turbatos esse, deprehendimus. Scimus equidem BOERHAAVIUM hominem fuisse, et interdum errare potuisse, errores tamen, quorum BOERHAAVIUS a Cl. Auctore accusatur, vel leuissimos et flocci pendendos esse, vel adeo pro erroribus nunquam habendos, animaduertimus. Immo, quod maxime mirandum est, Nostrum, qui in BOERHAAVIUM tam grauitur inuehitur, ad methodum tamen Cel. istius Viri processus fere communicare, videmus. Caeterum librum hunc utilitatem aliquam praestare posse, nunquam vero BOERHAAVII chemiam superare, multisque adeo scriptis chemicis postponendum esse, nos ipsi chemici omnino fatemur.



XXIII.

A natural and historical Account of the Islands of Scilly; describing their Situation, Number, Extent, Soil, Culture, Produce, Rarities, Towns, Fortifications, Trade, Manufacture, inhabitants etc. and lastly a general Account of Cornwall. By ROBERT HEATH. London, printed for R. Manly and H. S. Cox, 1750. 8. Alph. i. pl. 7. tab. aen. 2.

i. e.

Descriptio physica et historica insularum Silurum, in qua situs, numerus, magnitudo, solum, cultura, producta, res memorabiles, vrbes, munimenta, mercatura, opificia ibidem manu facta et incolae illarum describuntur. Addita est descriptio generalis Cornubiae. Auctore ROBERT HEATH.

Quamquam Silurum insulae, quae non longe ab extremo Cornubiae promontorio remotae sunt, ob situm peculiarem, multasque res naturales singulares, quae ibidem deprehenduntur, omnino disquisitioni cultoris historiae naturalis dignae esse videntur; nobis tamen res in hoc, de quo iam agimus, libro contentae, usum admodum magnum haud praestare, minimeque desiderio nostro satisfacere videntur. Auctor vero huius libri, per aliquot annos inter duces fuit militum Anglicorum, ad harum insularum praesidium missorum, atque cognitionis historiae naturalis plane expers esse videtur. Quae autem in hoc libro ad historiam Cornubiae Silurum-
que

ue insularum, nec non ad vsum nauigantium spectant, maiorem forte vtilitatem aliis praestabunt. Nobis tantum ea vtilia esse possunt, quae ad geographicam harum insularum cognitionem pertinent, et clima illarum sanitati incolarum maxime conuocunt, ita vt pauci tantum morbis laborent, et Auctoris temporibus, ne vnicus quidem medicus in omnibus hisce insulis reperiretur, licet incolarum numerus ad 1400 adscenderet. Solum lapidibus abundat, cum hae insulae tantum scopuli sint, enari exsurgentes, interim tamen annonam optimam maximeque satis magnam hordei copiam gignit. Minerarum stanni, ob quas olim hae insulae adeo celebres fuerunt, nunc neglectae iacent, venis metallicis exhaustis. Contra magna, qua hae insulae abundant, piscium auiumque rariorum varietas latissimum cultoris historiae naturalis disquisitioni campum aperit. Quae de Cornubiae historia naturali, fodinis stanni et plantis Noster habet, ea fere omnia ex aliis sumpta atque valde manca et imperfecta sunt, ita vt hoc libro, imprimis post Cl. BORLASE labores, de quibus alio loco dicendum erit, plane carere possimus.



XXIV.

A mechanical Account and Explication of the hysteric passion, under all its various symptoms and appearances. And likewise of all such other diseases as are peculiarly incident to the sex. To which is added an Appendix, being an dissertation on cancers in general, but more especially such as happen in the breasts of women. By CHARLES PERRY, M. D. London, printed for Shuckburgh, Osborne, David and Reymers, 1755. 8. Alph. I. pl. 3.

i. e.

Mechanica relatio et explicatio morbi hystericci, eiusque symptomatum et phaenomenorum, nec non omnium aliorum morborum, quibus mulieres praecipue obnoxiae esse solent. Addita est appendicis loco dissertatio de cancro in genere, et in specie de illo, qui in mammis mulierum accidere solet. Auctore CAROLO PERRY, M. D.

Habet profecto hic liber Auctorem eum, qui non optimo modo atque ordine aut facili et plana satis ratione proponere cogitata sua, didicisse videtur, ita vt eius lectio lectorem non magna iucunditate afficere aut tenere possit. Multorum vero annorum itinera per varias Europae partes et regiones, versus orientem fitas, suscepit, variaque iam alias historica et medica scripta edidit. Continetur in hoc libro tractatio de morbis neruorum omnibus
non

non tantum de hysterico malo. Initio operis de mor-
 borum neruorum caussis agit, easque in deprauata
 ixtione fluidi neruei, ex dyscrasia humorum vniuer-
 si oriunda, sitas esse ostendit. Proxima vero caussa
 est motus horum spirituum intestinus inordinatus.
 proponit deinde de conuulsionibus, epilepsia, pa-
 ralyfi, lethargo, tremore neruorum, vertigine,
 renitide, mania, hydrophobia, in qua remedium
 NVGENT reiecit, et saluationem ope mercurij. **p. 119.**
 sublimati corrosiui, in spiritu vini soluti, excitare
 debet, porro de cephalalgia in vniuersum & neruo-
 cephalalgia in specie, chorea S. Viti, morbo hy-
 chondriaco, gutta serena, surditate, malo hyste-
 rico, chlorosi, menstruorum vitiis, fluore albo et
 rore vterino, tandemque de grauidarum et puer-
 rarum morbis. In omni hac tractatione magnam
 emularum medicinalium copiam tradit, et in pri-
 s heroicis medicamentis delectatur. Argentum
 vum, aurum mosaicum, antihecticum **POTERII**,
 omel, et sulphur antimonii auratum saepius ad-
 bet. Quae de cancro in appendice habet, maxi- **p. 317**
 ad vsum mercurialium et causticorum spectant,
 eorum virtutem multum extollit. Nonnunquam
 sturam martis **M Y N S I C H T I** cum vnguento
 illiconis adplicauit. In scirrho confirmato empla-
 um, ex terebinthina et spiritu salis ammoniaci
 atum, laudat, vt alia taceamus.



XXV.

A critical enquiry into the present state of Surgery, by SAMUEL SHARP. F. R. S. and Surgeon to Guy's Hospital. the third edition London printed for I. and R. Tonson and S. Draper. 1754. 8. mai. pl. 21

h. e.

Examen modernae chirurgiae Auctore SAMUEL SHARP.

Inter praestantissimos Angliae chirurgos Cl. Auctor rem merito referendum esse, libelli, ab eo editi euincunt; non tantum enim de praecipuis operationibus chirurgicis in singulari tractatu, ante plures annos edito, succincte quidem, attamen accurate egit, sed in hoc quoque libello multa multa addidit, quae priorem illustrant. Negligentia itaque culpam incurreremus, nisi in supplemento quaedam inde decerpta proponeremus. * Si examen autem vocauit Noster placita nonnullorum chirurgorum et fallacia esse saepe ostendit, passim quoque enchirides minus cognitae addidit.

p. 3. In capite primo de herniis veris egit omnesque earum species, inprimis medendi rationes didicauit. Vt plurimum quidem extensum peritonaeum, ut saccus herniosus, prolapsas partes expulit, obseruauit tamen Noster intestina et omentum interdum intra tunicam vaginalem et proxime testiculum accessisse, quod sine ruptura peritonaei accidere haud potuisset. In bubonocoele consideranda tunicam vaginalem, quatenus spermatica vasa inuolu-

* Quarta editio 1761. prodiit, in qua tamen nec correctiones, nec augmenta deprehendimus.

nuoluit, a tunica vaginali, testiculum cingente, distinguit, hasque partes septo quasi separatas esse nonet. Si partes elapsae iterum reduci possunt, perizomate applicato, retinentur, varias tamen methodos veterum, quibus veram sanationem assequi tentarunt, commemorat, et futuram regiam emendatam suadet, qua processus peritonaei cum cute posita coniungitur. p. 9.

In inflammatione imminente praeter venae sectiones largas et clysmata etiam, ex fumo tabaci parata, de epithematibus emollientibus, strictionem annuli relaxantibus, differit, refert vero simul, nonnullos recentiores chirurgos, qui noxam ex applicatis calidis saepe cognouerunt, aquam frigidam, comprimente vi praeditam, suasisse, et hoc quidem cum optimo curationis successu. Attamen et hanc experientiam fallacem Noster iudicat, quod per frida applicata inflammatio magis augetur, quam remittitur; quoniam autem febris continua, ut totum corpus, sic has quoque partes collapsas reddit, repositionem interdum facilius successisse concedit. quemadmodum vero fortiora purgantia, herpeticis propinata, nocent, sic leniora et partitis dosibus exhibita, non sine fructu applicari possent. p. 19.

Postquam de situ aegri, cui hernia reponenda est, et de enchirisis in reducendis partibus proposita egit, simulque monuit, non tantum in contractione, sed etiam in extensione musculorum abdominis, aegro ita disposito, ut, cruribus eius super humeros validi hominis suspensis, caput illius deorsum pendeat, repositionem tentari posse et debere, ad operationem ipsam describendam accedit. Quoque haec differri possit, non satis certo definitur. p. 25

difficilius forte poterit, si omentum in hernia simul comprehensum est; eo enim non solum intestinum

a nimia strictura defenditur, sed illud quoque, pressurionibus reiteratis, mole quodammodo imminuitur, ideoque repositio facilius succedit. Dolendum tamen est, diagnofin epiploceles et enteroceles, inflammatione iam imminente, admodum ambiguum esse. De dilatatione annuli sursum et extrorsum pollicis longitudine efficienda exponit, inuenta in hunc usum instrumenta parum commodi afferre monet intestinis potius manu sinistra repressis, scalpello curuo, cuius apex obtusus est, incisionem tuto fieri posse ostendit. Cogitarunt quidem nonnulli de tutiori annuli dilatatione ante incisionem sacci herniosi efficienda, quod intestina tunc laedi nequeunt eam vero ideo improbat Cl. Auctor, quod tunc saepius partes elapsae et iam gangraenosae ante perillustrationem in abdomen reducantur, dilatationem quoque minus necessariam esse, si, aperto sacco, elapsae partes aptè reduci possint. In dilatando annulo laesionem arteriae epigastricae non timet Noster, cum ea propius ad lineam albam excurrit, & profundiori loco sita sit, huius etiam vel similis arteriae laesionem filo mediante acurua inducto, protinus ligari posse asserit.

p. 32. De sufficiente tamen annuli et sacci, ad annulum constricti, dilatatione sedulo cogitandum est, quod saccus herniosus ad annulum nimis angustum intestina prolapsa saepius stringit, et interdum, quanquam rarius, saccus cum intestinis constrictus in abdomen regreditur, ideoque symptomata etiam post regressum perdurant.

P. 35. Omenti partem corruptam sine ligatura praescindi posse nullamque inde haemorrhagiam metuendam esse urget Noster, cum ligatum saepe intestinum colum et ventriculum ex vero situ deorsum trahat, sine attentione tamen praescindendum non est, cum interdum, nisi antea euoluatur, aliqui

pars intestini inuoluta simul praescindatur. Mittimus alia, quae de gangraena corruptis partibus praescindendis et de ulteriori curatione subiungit et ad herniam femoralem progrediamur. Haec in foeminis frequentior est, non vero, ut multi putant, ob latitudinem pelvis, sed ideo frequentior pressio ad descensum vasorum femoralium fit, quoniam ligamenta sic dicta rotunda strictius ad annulum adhaerent, quam fasciculus vasorum spermaticorum in viris, in quibus itaque herniae inguinales frequentiores sunt.

In vera exomphali curatione, reductis partibus prolapsis, ligatura circularis, vel potius duplex ex medio pertuso sursum deorsumque ducta convenit, sic enim ligata pars integumentorum et sacci reparatur, et inferius firma fit cicatrix. Hanc curationis rationem nunquam suaderet Noster, si hernia umbilicalis semper perizomate coerceri posset, quod, quam difficile sit, omnes sciunt. Si autem, imminente inflammatione, ad operationem deveniendum est, cruciata incisio Cl. Auctori displicet, qui satius esse ducit per cutim et saccum herniosum exiguum vulnus infligere, et specillo fulcato immisso, mediante scalpello, vel apice forficis retuso introducto, hac ipsa partem circularem cutis et sacci herniosi excindere, strictas postea partes, incisione emipollicis longitudine sinistorsum et oblique sursum facta, liberare, quo elapsa promptius reduci et vulneris curatio absolui possit. Si intestini pars gangraenosa praescindenda est, anus artificialis in ipso umbilico formari poterit.

Hernia foraminis ovalis non adeo frequens est in viris, tamen proxime ad perinaeum in foeminis ad labia pudendi formatur; partes expulsae per foramen ligamenti ovalis, quod vasa transmittit, prorediuntur, ideoque ad musculum obturatorem

externum inter pectinalem et primum caput musculi tricipitis femoris. Si protrusae partes reprimi possunt, peculiare perizoma, situi tumoris accommodatum, exigit.

p. 58.

De hernia ventriculi et intestinali vaginae pauca refert, in cystica autem, siue hernia vesicae urinariae describenda magis versatur. Haec hernia vel sola existit, vel oborta bubonocelen efficit, vel bubonocеле prius nata et inueterata, herniam cysticam pedissequam habet. In simplici hernia vesicae vasis spermaticis incumbit, in complicata vesica prolapsa inter bubonocelem et spermatica vasa collocatur, in utroque etiam casu saccus peritonaei vesicae ab anteriori parte incumbit. Urina retenta vesicam extendens, et pressio uteri primariae functio huius herniae causae, et ultimam quod concernit uterus grauidus mole auctus vesicam ut plurimum in medio comprimit, efficitque, ut illa utrinque emineat.

p. 66

Capite secundo hydrocelen sub examen reuocat et hydropem scroti, ut spuriam considerat, speciem hydroceles inter tunicam dartos et vaginalem prorsus negat et eius notionem ex loco CELSI, male intellecto, ortam fuisse monet; hydrocelen porro intra tunicam vaginalem chordae spermaticae non uniuersam, sed tantum cysticam assumit atque etiam de collectione aquarum inter laminae tunicae vaginalis testiculi et sub tunica albuginea dubie loquitur. In veratandem curatione loco incisionis simplicis segmentum ouale cutis et tunicae vaginalis auferre iubet. Cum tamen DOUGLASSIUS * luculentius de his egerit, haec lubenter mittimus.

* *Treatise on the hydrocele* Lond. 1755. 8. vid. Comment. nost. Vol. VI. Part. IV. p. 692.

In sarcocoeles consideratione distinctionem praep. 93.
mittit, qua nonnulli, aut tumorem testiculi ipsius,
ut accessorium tumorem prope testiculum a vitia-
is et in carnem mutatis succis assumunt. Prior
eram sarcocelen sistit, alter expansio et induratio
epididymidis censendus est. Glandulosam igitur et
scirrhum et cancrum procliuem testiculi fabricam,
asculosam autem epididymidis Noster assumit, etsi et
anc interdum scirrhosam fieri posse non neget. Per-
ensis igitur variis auctorum sententiis, et tum, cum
ypothesis de fabrica minus certa esset, ex experien-
a concludi posse asserit, tumorem epididymidis mi-
us malum esse, quam scirrhum testiculi ipsius ideo-
ue, nec castrationem, nec particularem exstirpatio-
em in illo exigi.

Inde vero deducitur ad circocelen et varicoce p. 99.
n, illam dicunt dilatationem vasorum chordae
ermaticae, hanc dilatationem vasorum scroti, haec
x sola est, sed tumorem scroti sequitur, qui, vt
ussa, prius remouendus est. Illa testiculi scirrho-
symptoma est, sed si, quod rarius euenit, cum sano
sticulo existit, fomentationibus, applicatione vn-
enti mercurialis et repetitis lenioribus laxantibus
ssipatur. Descensum omenti mentitur, vasa ta-
en tortuosa tactu percipiuntur. Raro noxam
fert, interdum tamen, vt varicosae venae aliae, do-
res excitant, ideoque exstirpationem vrgent. To-
um vasorum nimis extensorum medicamentis ressi-
tere, nec aliis, nec Cl. Auctori successit.

Castrationem non, nisi scirrhus et cancer testi p 104.
ali exigunt, minime vero abscessus et gangraena
ius partis, dummodo recte tractentur, quod tunc
contextu celluloso haeret morbus. Nec in omni
irrho ad durum hoc auxilium properandum est,
d tantum in eo moto, quanquam et tunc vix de-
uiatur, an operatio ex voto successura sit, cum can

erosa dispositio clandestina saepe inueniatur. Etsi igitur Cl. Auctor experientia edoctus sit, interdum in exiguo malo fatalem, interdum in maligno statu felicem exitum, exstirpationem testiculi sequutum esse, rationem tamen in tanta varietate morbi non satis detegere potuit.

p. 110. Vitia vasorum chordae spermaticae vt contra indicantia operationis considerat, et rationem eiusdem ita tradit. In testiculo potissimum magni voluminis incisio cutanea oualis paululum super annulum incipiens, cuius media diameter ad minimum dimidiam partem testiculi sistit, efficienda, postea cutis a chorda vasorum spermaticorum auferatur, quo ligatura fieri possit, qua facta, testiculus cum cute separandus est. Varias huius operationis partes accuratius declarat, et inprimis monet, ligaturam nerui separationem non exigere, quam ob tenebras has partes impossibilem iudicat.

p. 119. Caput quartum de punctura perinaei et morbis vrethrae exponit. Operatio igitur consueta describitur et incommoda inprimis ex laesione partium vicinarum oborta recensentur. Noster vero chirurgum instruit, vt in punctura perinaei indicem sinistrae manus in intestinum rectum immittat et prostatam tangat, quae viam commonstrat, quomodo acus triquetra parallelo ductu cum recto intestino et a latere digiti in perinaeum immitti possit. Postea ad puncturam vesicae, super os pubis efficiendam, se conuertit.

p. 126. Auctor Cl. eandem instituit a pollicem vnum et semis supra os pubis, si enim altius versus vmbilicum suscipitur, euacuata vesica tensio et dolor a relicta cannula excitatur, si vero prope os pubis immittitur cannula, non raro in contextum cellulosum inter vesicam et os pubis penetrat. Ipse etiam vtitur cannula vnum pollicem longa, obseruauit enim, a longa nimis cannula postea collapsam

collapsam vesicam eius perforationem ad intestinum
ectum factam fuisse, subiungit tandem varia mo-
rita de cannulis et catheteribus in his viis relinquen-
is et mutandis.

De strictura vrethrae et cereis variae compo- p. 130.
tionis, eam per suppurationem corrigentibus, in-
rimis ex mente Cl. D A R A N, nec non de aliis vre-
thrae morbis agit. Monet ideo, non semper puru-
lentam materiam callosas eminentias et carunculas
destruere, sed, orificiis variis excretoriis relaxatis,
humores, ex his viis secretos, largius promanare et
ita viam liberiores reddere. Ex hac idea etiam
iudicat gonorrhoeas, quas non vlceribus semper et
coniunctae suppurationi, sed largiori affluxui humo-
rum, hic secretorum et venereo contagio saepe in-
iectorum, adscribit, qua in re iterum varias opi-
niones Cl. D A R A N sub examen reuocat. Nisi
morbus complicatus sit, partem affectam optime
definire possumus: si enim vrethra tantum laesa
est, materia purulenta ante urinam excernitur, si
vero prostata et vesiculae seminales sedes morbi sunt,
materia excernenda urinam sequitur.

Postquam de variis cereis aliisque instrumen- p. 152.
tis, in vrethram immittendis, obiter egit, ad consi-
derationem causticorum medicamentorum, his viis
applicandorum, accedit, haec a recentioribus omni-
bus reiecta fuerunt, qui potius, incisa vrethra, me-
dicamenta septica ad locum affectum pressius ap-
plicare tentarunt, quamquam et subsidia, quibus
hoc efficitur, non sine incommodo adhibentur.

Vlcera vrethrae iniectionibus adstringentibus p. 155.
depurari et corrigi vix possunt, variis potius incom-
modis, inde obortis, ansam praebent, quamquam igi-
tur Cl. Auctor et his usus est, a mitissimis incipien-
do et ad fortiores progrediendo, cereorum tamen, ex
emplastris conuolutis factorum, usum praestantiores

- esse concedit, qua in re saepe pressio mechanica magis, quam selectus medicamentorum illitorum
- p. 161. curationem absoluit. Callosae cicatrices et carunculae a veteribus, ut praecipua causa angustatae urethrae adductae, a recentioribus iterum negatae fuerunt. Cl. vero Auctor non tantum ad experientiam Cl. D A R A N, sed ad suam quoque prouocat, quam non semper unicae sint, sed strictura accedat, vias angustiores reddat, et per cereos comprimendo et suppurando tollatur. Ad scirrhos tandem progreditur et imprimis eos, qui in prostata oriuntur et calculum praesentem mentiuntur, examinat. Motus in rheda et equo ab iis ferri potest, quibus prostata scirrhusa est, si vero calculus causa dolorum est, hi vehementer exacerbantur.
- p. 170. Finita itaque tractatione, de variis urethrae morbis in cereorum compositionem et methodum applicandi inquirat. Nec molles nimis sint, etsi hac ratione suppurationem quaesitam melius efficiant, quod per loca constricta et angustata non transprimi possunt, nec rigidi nimis, ne vehementer premant et dolores et inflammationes excitent, nec fragiles, qui in educatione membranas et vasa lacerent. Cerei, qui adstringentia medicamenta admixta habent, vel nunquam, vel non nisi in fine curationis admittendi sunt, nec escharotica medicamenta iis inspergantur, quae escharam potius, quam suppurationem inducunt, nec largam dosin terebinthinae vel resinae, ut nimium stimulum, admittit Noster. Densitatem, flexibilitatem cum aliqua tenacitate lubricam superficiem in omnibus exigit, optimamque basin diachylon simplex esse affirmat, gummatibus tamen aptis additis. Et mercurialia varia medicamenta admiscere iubet, cum et mercurius praecipitatus ruber, emplastris admixtus, mitiorem vim septicam habeat. Mercurii

rii viui vnciam semis cum vna emplastri malaxatam, immo antimonii crudi pollinem additum saepius utilem esse asserit. Reliqua monita, de for- mandis atque applicandis cereis proposita, mit- timus.

Indurationes et fistulae in perinaeo obstru- p. 192.
tionis vrethrae pedissequae sunt. Si corpora cavernosa indurantur, pertinacior obstructio est, attamen et cellularis tunica scroti, penis et perinaei simili ratione afficiuntur. Quod si vero obstructio vrethrae sublata est et durae partes discussionem et impurae fistulae facilem saepe admittunt cura- tionem. Partes cereorum in orificia fistularum immissae curationem iuuant, in angulosis vero et callosis extirpatio necessaria videtur. Neque sem- per hi morbi, a venerea causa oriundi, curationem per saluationem mercurialem exigunt, dummodo enim via vrethrae libera redditur, malum saepe ce- dit, in pertinaciori tamen symptomatum duratio- ne ad interna remedia efficaciora properan- dum est.

Capite quarto de lithotomia agit et ex difficul- p. 197.
tatibus, quibus apparatus magnus obnoxius est, ad altum et lateralem indeque mox ad *Foubertianam* diiudicandam se confert; quoniam autem CHES- DENUS post RAVIUM hanc lateralem methodum perfecit, eius merita extollit et praecipue exami- nat, quantum differat methodus Anglorum et Gal- lorum in apparatu laterali efficiendo, vbi de chirur- go, catheterem sulcatum tenente, vel socio tradente, de situ chirurgi et aegri, de forma catheteris et li- thotomi sigillatim differit et vbique methodum An- glorum Gallorum methodo praefert, variaque mo- nita inspergit in recentiore scriptis amplius dis- quisita.

Caput

p. 222.

Caput sextum in septem sectionibus obseruationes miscellaneas et tentamina addit. In sectione prima de tumore vesiculae felleae agit. Post inflammationem hepatis feliciter discussam cystis fellea, bile repleta, turget, aut suppuratio, formato abscessu, nascitur. In tumore vesiculae dolor cessat aeger melius se habet, cutis sicca est, tumor subito increscit, et sub costis spuriiis a latere recti musculi haeret: in abscessu formando dolor continuus et pressorius est, et, eo subinde cessante, aeger adhuc inquietus manet, calorem sudor excipit, fluctuatio successiua est, tumor ipse vagus oedema cutis saepe coniunctum habet. Et si igitur incisio vesiculae felleae ambigua videtur, tamen cum ea interdum rumpatur et letalem effusionem in abdomen efficiat in incremento vero antea ad peritonaeum accrescat fundus eius acu triquetra pertundatur, et specillo per cannulam immisso, disquiratur, num calculus inest? quo deprehenso, incisio largior fiat et calculus extrahatur, hoc vero non inuento, bile euacuata coalitio, cannula remota, concedatur.

p. 227.

Seçtio secunda calculum, vesicae cystide inclusum et adhaerentem, considerat. Cystidem saepe angustiore orificio praeditam fuisse, obseruauit Noster, calculum ideo in ipsa cystide crescere eidem probabile videtur. Non solum autem in cystide adhaeret calculus, sed saepe etiam parti vesicae in cystidem non expansae, nec tum magnum dolorem excitare aegro potest, nisi adhaesio proxime ad colliculum fiat.

p. 231.

In sectione tertia de empyemate differitur, nec tantum de pure inter pulmones, ad pleuram accretos, contento, sed potius de effusione puris in abscessu pulmonis exponit. Quoniam enim et tum, cum pus per tracheam eiicitur, vel per erosionem
cutis

cutis excernitur, rarissime salutaris euentus expectandus est, in vniuersum tamen operatio empyematis in pure, vel alio humore, in pectus effuso, commendatur. Inter signa, quibus humor, extravasa missus, vel alia ratione collectus, cognoscitur, est dilatatio quaedam pectoris, in latere affecto, inprimis si morbus alius praegressus fuerit, ex quo collectio pendet: undulatio quaedam, siue fluctuatio, vel ab aegro, vel etiam a disquirente chirurgus percepta; initia tumoris oedematosi in parte affecta. Monet etiam Cl. Auctor errorem chirurgi non adeo esse reprehendendum, quod vulnus, musculis intercostalibus infligitum, non adeo dolorosum, nec perniciosum est. Cum autem vulnus in ima parte thoracis, vbi vt plurimum inter costam nonam et decimam infligitur, multis incommodis stipatum sit, illud Noster inter sextam et septimam medio loco inter sternum et spinam efficit, quod pulmones expansi humorem contentum maxima vi propellunt, et monet Cl. MARCHET-
RIS inter quintam et sextam incisionem effecisse.

Sectio quarta de commotione cerebri Cl. PE- p. 239.
RIT sententiam, quinta Cl. FOREST methodum fistulam lacrymalem curandi, sexta Cl. LEVRET methodum ligandi polypos breuiter recenset, septima de exstirpatione tonsillarum scirrhosarum agit. Quae cum escharoticis male tractentur, excissio haemorrhagiam nimiam afferat, ligaturam Noster facilem et certam pronuntiat, nostro tamen iudicio non ampla tumoris basi perfici nequit.

Septimo capite de *cycaracta* atque inprimis de p. 251.
eius extractione exponit, quam a Cl. DAVIEL inventam, Nostrum quoque emendasse, alibi retulimus, methodumque eius fusius descripsimus *.

cataracta

* vid. Philos. Transact. Vol. XLVIII. P. I. p. 161. et 322.
et Comment. nostror. Vol. IV. p. 391. et 400. Cultrum quoque

cataraeta dextrum oculum occupat, quo dextra manu operator in extractatione uti possit, aegrum in terram confidere iubet, atque caput ita reclinare, ut illud genua, vel pectus operatoris retro aegrum positi tangat. Incisione corneae in Nostri methodo dimidia tantum pars circuli corneae diffecatur, cum Cl. DAVIEL sectio duas tertias partes eiusdem occupet. Nonnunquam statim post corneae incisionem ex spasmodica quadam musculorum oculi contractione una cum lente crystallina vitrei quoque humoris pars prorumpit, quo in casu Noster palpebras confestim claudere iubet. Lentem post incisam corneam, non forfice, uti alibi proposuimus *, sed ope cuspidis cultri sui extrahit. Pressionem, digitorum ope praestandam, plane reiicit atque, incisione iusto minore facta, illam potius dilatare iubet. Punctura, qua sectio corneae fieri debet, firma stabilique manu atque celeriter fieri debet, ne oculus, instrumenti applicatione irritatus, se in orbitam retrahat, atque sectio minus perfecta fieri possit. Praeternaturalis figurae pupillae mutatio, quae saepe post hanc operationem accidit, nullum visui impedimentum attulisse Cl. Auctoris est observatio.

p. 265. Ultimum tandem caput de amputatione extremitatum agit, atque cum haec operatio, ut plurimum, ob gangraenam, membrum occupantem, instituitur, de ipsa gangraena et sphacelo primum Noster agit, diuersaque remedia, quae ab aliis proposita fuerunt, breuiter examinat. Scarificationes non ad partem sanam usque instituit, sed minus profundas sectiones sufficere autumat, in pri-

mis

quoque SHARPII delineatum vide Memoir. de l'Acad. de Chir. T. II. T. XXII. fig. 2. Conf. Comment. nostr. Vol. III. p. 620.

* Volum. Comment. IV. l. c. IV. p. 401.

mis in partibus, vbi tendines, minus profunde siti, sectione laedi possent. Corticem Peruvianum in progressu gangraenae infringendo, non maiore efficacia pollere, quam alia cardiaca, ante huius remedii vsus introductionem vsitata, asserit. In vniuersum vero vsum amputationis, si gangraena nondum substitit, sed adhuc progreditur, siue ab interna, siue ab externa causa orta sit, dubium reddit, multisque argumentis ad huius sententiae confirmationem adductis, adeo progreditur, vt contendat: amputationem eo vsque esse differendam, donec gangraena substitit et separatio corrupti a sano iam incepit. Ne cutis post operationem amputationis et musculi nimis se retrahant ossisque pars nudetur, praeter duplicem sectionem a CHESELDEN et, vti Auctori videtur, ante illum a CELSO propositam, futurae cruciatae ope cutem post rescissionem membri, inprimis femoris, vnit, eiusque labia ad se inuicem attrahit, quo os melius contegatur. Atque huius quidem methodi merita multum extollit, putatque, non solum vulnus melius et celerius coire, sed inflammationis periculum, vulnere hac ratione angustiore reddito, minui. Agit deinde de illa operationis huius specie, quam *a lambeau* vocant, docetque ante iam VERDUINI et SABOURINI tempora eius mentionem in libro * factam esse, in quo etiam primum fascia tortilis (*tourniquet*) descripta est. In haemorrhagia sistenda ligaturae variorum vsus multum extollit, ostenditque ex nervis, simul cum arteria ligatis, nullum damnum oriri posse, grauiora autem symptomata a nimia compressione membri amputati in deligatione eius oriri. In fine tandem de agarici in haemorrhagiis vsu quaedam

* *Currus triumphalis e terebintho*, or an account of the virtues of oleum terebinth. by JAMES YONGE, London 1679. 8.

quaedam ex scriptis academiae chirurgicae Parisinae adducit.

XXVI.

Recueil de pièces importantes sur l'opération de la taille faite par le lithotome caché, avec un mémoire concernant la retention d'urine, causée par l'embarras du canal de l'uretre. à Paris chez d'Houry fils. 1751. 12. 1 Alph.

Suite du Recueil de toutes les pièces, qui ont été publiées au sujet du lithotome caché. 12. pl. 1¹/₂.

Addition a la suite du recueil de toutes les pièces, qui ont été publiées au sujet du lithotome caché. ibid. 1753. 12. pl. 17.

La taille latérale s'exécute-t-elle plus sûrement & plus facilement, avec l'instrument connu sous le nom de lithotome caché? Question medico-chirurgicale discutée dans les écoles de la Faculté de Médecine de Paris le 25 Avril 1754. Praef. CLAUDE-THOMAS GUILLAUME GUILBERT DE PRÉVAL & proposé par HENRI-JACQUES MACQUART, ibid. 1754. pl. 7. tab. aen. 1.

i. e.

Collectio scriptorum notatu dignorum de calculi extractione, ope lithotomi occulti facta, cum commentario super retentione urinae ex impedimento a parte urethrae.

Continuatio

continuatō collectiōis scriptorū omnium,
occasione lithotomi occulti publicatorum.

ditamentum ad continuationem collectio-
nis etc.

maestio medico - chirurgica, quodlibetariis
disputationibus agitata in scholis medicorum
d. 25. April. 1754. C. T. G. G. DE PRE-
VAL praeside. Proponebat H. I. MACQUART.
*An scalpello, vagina recondito, cystitome lateralis
perfectior?*

cripta, quorum titulos hic cum lectoribus com-
municamus, duo componunt volumina, quibus ea
ecipue comprehenduntur, quae a fratre COSMO
tore lithotomi occulti ad defensionem huius in-
menti, et ad refutationem obiectionum, a Cl.
CAT aliisque factorum, scripta sunt. Quam-
m autem magna illorum pars iam ante annum
us saeculi quinquagesimum publicata sit, atque
niuersum limites nobis praescripti relationum-
harum ratio vix permittat, vt paullo accuratius
amenta, a Cl. LE CAT et fratre COSMO pro-
enumeremus; operae tamen pretium esse pu-
mus de hac atque de Cl. LE CAT collectione,
qua mox verba factori sumus, ita exponere, vt
tores inde cognoscant, quaenam potissimum
ta in illis contineantur, breuemque totius hu-
controuersiae historiam et indicem quasi argu-
torum, de quibus in scriptis hisce inprimis agi-
nabeant.

Initium voluminis primi facit *descriptio lithoto-* T. I.
oculti et forcipis ad confringendos calculos maio- p. I.
Supplement. III. Mm res

- res intra vesicam*, quae a. 1748. diario Verdunensi inserta fuit, atque fratrem cosmum ipsum Auctorem habet. Vix opus esse arbitramur, de huius instrumenti figura et structura fusius exponere, cum illud iam alio loco factum sit *, ipsumque instrumentum in omnium fere chirurgorum manibus sit aut ex actis academiae chirurgicae Parisinae * illis innotuerit. Adiecta est observatio de calculi sectione, ope huius instrumenti a Cl. ЛАКОЧЕ peracta, qua praestantia eius confirmatur.
- p. 18. Neque minus forceps, qua Auctor ad confringendos calculos maiores intra vesicam utitur, attentionem nostram exigit. Cum enim maior calculus interdum vix extrahi possit, sine magna partium dilaceratione, quae saepe lethalis fit, firmioris cuiusdam forcipis descriptionem Noster communicat tribus clavis munitae, quae pro lubitu operatoris et necessitate eximi possunt, cum in frangendo calculo vno tantum opus sit, qui pro magnitudine calculi magis, vel minus, ab apice forcipis distat.
- p. 24. *Litterae* Cl. LE CAT *super nouo hoc instrumento* ex diario Verdunensi 1749. Docet hoc instrumentum nouum non esse, sed maxime illud conueniri cum ductore canaliculato lithotomo (gorgeret lithotome) cuius inuentorem Cl. LE CAT esse ex diario Verdunensi a. 1742. patet. Concedit tamen, FRANCENEM iam speciem quandam lithotomi occulti proposuisse, non tamen eo usum esse. Forcipe quae ad confringendos calculos PARAEUM vsu esse monet.
- p. 34. *Responsio auctoris lithotomi occulti ad has observationes in epistola ad editorem diarii Verdunensis.* P. fite

* vid. Comment. hor. Vol. VIII. p. 224.

** vid. Figuram eius in *Mem. de l'Acad. de C.* T. III. tab. 19.

tetur se ignorasse ea, quae veteres imprimis chirurgiae magistri hac de re scripserint, FRANCOIS tamen instrumentum a suo differre, atque Cl. LE CAT ductorem cannaliculatum nequaquam tanta praestantia pollere, quanta ipsi videatur. PARAEI principem etiam sibi notam haud fuisse asserit.

Litterae Cl. LE CAT ad auctores diarii eruditorum (Journal des Scavans) *super lithotomo occulto* p. 57.

In omnibus fere conuenit cum litteris EIUDEM auctoris ad auctores diarii Verdunensis superius commemoratis.

Litterae anonymi, ad Cl. MORILLIER occasione praecedentis epistolae Cl. LE CAT scriptae.

ius in ea explicantur, quae in *responsione* superius narrata continentur. p. 34.

*Litterae Cl. LE CAT ad Cl. D * * *, quae* p. 113.

responsionem ad epistolas anonymi defensoris lithotomi occulti, insertas diario eruditorum et Verdunensi, sistunt.

probat LE CAT, lithotomum occultum facile funum vesicae laedere et sectionem vesicae nimis magnam efficere, ideoque, ut noxium reiciendum esse.

Iudicium ex iis, quae rem probant repetitum. p. 154.

(jugement tiré d'après les faits). Est epistola ad anonymos nonnullos, in qua ad litteras praecedentes Cl. LE CAT, et acrius quidem, respondetur.

Observationes de situ aegri commodissimo in operatione lithotomiae. p. 186.

Insertae fuerunt primo observationes hae diario eruditorum. Situs horizontalis aegri, qualis in operatione, ope lithotomi occulti

peragenda, vulgari, siue obliquo praefertur, cum in

o fundus vesicae facile laedi possit, calculique difficilius forcipe comprehendantur. Describitur quo-

que modus aegrum sub operatione ligandi, qui no-

s omnino laude dignus esse videtur: nec non acus

quetra curua ad puncturam vesicae super os pubis p. 202

efficiendam, cuius cannula post puncturam in vesica relinqui potest, nec ex vesica iterum elabitur. In p. 211. fine addita est observatio de sectione calculi in foemina, ope lithotomi occulti peracta.

p. 212. *Commentarius* Cl. LE CAT in conuentu academiae scientiarum Rothomagensis d. 12. maii 1750. praelectus, de situ aegri in operatione lithotomiae per apparatus humiliorem peragenda. Apparatus humiliorem (*bas appareil*) dicit omnes species lithotomiae, in quibus sectio infra ossa pubis instituitur.

p. 186. Defendit situm obliquum contra obiectiones, in praecedente commentario prolatas, in apparatu magno et variis speciebus apparatus lateralis.

p. 231. *Animadversiones in hunc* Cl. LE CAT *commentarium*, in quibus ad argumenta illius respondetur et situs horizontalis acrius defenditur, finem huius voluminis faciunt.

p. 2. In continuatione collectionis scriptorum omnium, occasione lithotomi occulti editorum, continetur catalogus quadraginta aegrotorum, in quibus sectio ope huius instrumenti feliciter peracta

p. 21. fuit. In fine ratione et experientia probatur, vultus post sectionem, calculi lithotomo occulto factam, vt simplex tractari rariusque deligari debere.

Vol. II. Alterum huius collectionis volumen comprehendit responsionem ad illa, quae Cl. LE CAT contra lithotomi occulti praestantiam dixit, in secundo volumine collectionis scriptorum, quae ille circa lithotomiam publici iuris fecit. Cum enim Cl. LE CAT, multis historiis et factis collectis, ibidem negasset, aegros, quos Auctor lithotomi occulti tanquam perfecte curatos, ad probandam sui instrumenti praestantiam, adduxerat, sanatos esse; hoc ipse

ipso libello anonymus lithotomi auctor ad hasce obiectiones aduersarii ita respondit, vt, multis additis testimoniis, confirmare studeat, plurima, a Cl. LE CAT prolata, falsa et ficta esse. Probare quoque contendit, Cl. LE CAT methodum aegris maxime esse funestam, neque a multis aliis chirurgis receptam. Adiectae tandem sunt 34 aegrotorum historiae aliae, in quibus calculi sectio ope lithotomi occulti instituta fuit. P. 337.

Quaestio medica Cl. DE PREVAL et Cl. MACQUART: *an scalpello vagina recondito cystitome lateralis perfectior?* non solum latine, sed et in gallicam linguam translata, hic impressa est. Praemissa breui diuersarum methodorum calculum secandi historia, Cl. Auctor lateralem reliquis praefert, atque inprimis eam, qua ceruix vesicae et quaedam pars corporis vesicae ipsius discinditur. Praestantiam vero operationis in eo ponit, vt sola incisione, nulla vi, partibus dilatando, illata, planum iter, tum ad vesicam, tum e vesica sternatur. Quae vero grauiora in hac operatione obueniunt incommoda, ea omnia praecaueri posse lithotomo occulto, cuius instrumenti ope, vel a tirone calculi sectionem tuto institui posse asserit. Hinc primo fabricam instrumenti ipsius describit, operationisque modum. Deinde docet, aegri corpore in planum situm collocato, et cystitomo, vbi sisti debet, probe firma sectionem praestituta, nec plus minusue mensura factum iri, nullumque partibus seruandis vulnus inferri posse: porro prostatam ita discindi, vt commodus ad vesicam aditus pateat, calculusque sine vlteriore dilatatione eximi possit. Vulnus vero hac ratione inflictum, cum contusionis omnis expertum sit, nullorum vnguentorum aut fasciarum applicatione opus habet, qua scilicet illud irritatur et arenularum fragmentorumque calculi minorum

egressus impeditur. In hac enim methodo, operatione peracta aegroque in calidum lectum confestim reposito, quadruplex tantum linteum clunibus subiicitur, costaeque parumper sublatae ad se inuicem adducuntur, per reliquum curationis tempus sic continendae. Adiectae sunt praeterea in hac collectione dissertationi huic duae aliae epistolae, in quarum prima variae contra hanc ipsam dissertationem obiectiones continentur, ad quos in altera respondetur.

XXVII.

Pieces concernant l'operation de la taille. Premier recueil, qui traite principalement de cette operation pratiquée sur les femmes etc. par CLAUDE NICOLAS LE CAT. a Rouen, de l'imprimerie de Laurent Dumesnil. 1749. 8. 12 $\frac{1}{2}$. pl. tab. aen. 5.

Second recueil, qui contient la description de plusieurs lithotomes composés etc. 1752. 1 Alph. 7 pl. tab. aen. 7.

Troisieme recueil contenant cinq lettres en reponse au - Frere COME avec une sixieme lettre a Mr. * * * 1753. pl. 7.

Lettre de Mr. LE CAT à Mr. DUMONT fils sur l'opinion de l'adherence des pierres la vessie. 1763. pl. 3.

i. e.

Varii tractatus de lithotomia. Auctore C. N. LE CAT. Collectio prima, in qua praecipue

de lithotomia in foeminis administranda agitur — Secunda collectio continet descriptionem nonnullorum lithotomorum compositorum — Tertia continet quinque epistolas, in quibus ad obiectiones Fratris COSMI respondetur, et sextam ad anonymum. Accedunt litterae Cl. LE CAT ad Cl. DUMONT iuniorem, circa opinionem de calculis, ad vesicam adhaerescantibus.

Quamquam prima collectio horum de lithotomia opusculorum iam anno huius seculi quadragesimo nono prodiit, Cl. tamen LE CAT eam non publice venditoribus exposuit, sed inter amicos tantum distribuit, atque, uti ex praefatione patet, nunc demum anno huius seculi sexagesimo tertio edidit. Fuit enim Cl. Auctoris consilium maius aliquod de lithotomia opus conscribendi, cui haec opuscula, separatim impressa, inferere voluit. Cum autem negotiorum multitudine impeditus, illud ad finem nunc perducere haud posset, collectiones has seorsim edere coepit. Duplex vero est controuersia, circa quam scripta, in hac collectione contenta, versantur. Harum prior de lithotomia in foeminis administranda inter Cl. VIROS LOUIS, LE BLANC et LE CAT agitata, nunc, uti ex praefatione cognouimus, plane composita est; altera est illa, quam Cl. LE CAT cum FRATRE COSMO, celebri illo lithotomi occulti auctore, habet. Atque, ut de priore primum dicamus, cum scripta, quae ad illam pertinent, prima collectione comprehendantur, tenendum est, Cl. LE CAT hoc libro ostendere: se anno huius seculi trigesimo quinto iam calculi extractionem in foeminis, non dilatatione vrethrae, sed sectione eius

Vol. I.

- tentasse atque hinc se iure de Cl. LOUIS conqueri posse, quod ille in commentario, anno huius seculi quadragesimo sexto, academiae chirurgicae Parisinae de lithotomia in foeminis administranda praelecto, nullam Cl. LE CAT et instrumentorum, ab eo ad hanc calculi sectionis speciem inuentorum, mentionem iniecerit. Hinc cum Cl. LE CAT relatum esset, Cl. LE BLANC Aureliani instrumentum, a Cl. LOUIS excogitatum, emendasse, in epistola ad eum data, Noster suam methodum descripsit, praestantiamque methodi suae prae methodo illorum confirmare studuit. Vtitur vero ductore canaliculato, qui in apice specillum fulcatum habet, et cystitomo recto, qui in vno tantum latere aciem habet, et quem *vrethro-cystitomum* vocat. (vid. Tab. I.) Cl. vero LOUIS instrumentum quod duas acies habet, (vid. Tab. II. litt. K.) ideoque duplicem quoque sectionem efficit, cum e contrario Cl. LE BLANC instrumento, quod in reliquis omnibus cum lithotomo Cl. LOUIS conuenit, unica tantum fiat. Afferit enim Cl. LE BLANC in responsione ad litteras Cl. LE CAT, se vidisse ex duplici sectione incontinentiam vrinae oriri. Interim Cl. LE CAT, vel hoc instrumentum, ut noxium reiicit. Probat enim vrethrae sectionem tutius omnino fieri posse duobus instrumentis, quae manus ope diriguntur, quam illo, quod compositum est, et quo sectionis magnitudo non certo definiri potest, nec vrethra tantum, sed etiam magna
- p. 10. vesicae pars quaedam inciditur. Maiora enim vulnera, vesicae corpori infligta, fere semper lethalia esse, et distentionem fibrarum, aut quandam dilacerationem illarum minus noxiam esse, sectione, eique hanc ob causam praeferrī debere docet. Addit in vulneris deligatione nullam adhibendam esse cannulam, cum ea lethalem producat suppurationem, fistula-
- p. 12.
- p. 61.

fistularumque aut incontinentiae vrinae caussa sit. Atque hanc quidem sententiam Cl. LE CAT non solum testimoniis celeberrimorum aliorum chirurgorum, sed etiam variis aliis argumentis ita confirmavit, vt Cl. LE BLANC suam methodum relinqueret, atque Cl. LE CAT methodum adsumeret. Hinc Cl. LE CAT, quoque in epistola, ad Cl. LE BLANC data, methodum, qua tunc temporis in viris calculi sectionem instituebat, cum eo communicauit, quo huius methodi praestantiam pari modo agnosceret. Commodum satis modum ligaturam P. 103. aegri ante operationem instituendi describit, facillimum et reliquis haecenus vsitatis omnino praeferendum. Ipsam vero sectionem faciebat scalpello duplici, quorum vnum vrethrotomum, alterum cystitomum vocabat (T. IV.), ita, vt magna exercitatione ad hanc operationem, duplici scalpello peragendam, opus esset. Nunc vero Cl. Auctorem ductore canaliculato cystitomo (vid. Tab. I. fig. 3.) vti, omnibus notum est. *

Excipiunt hanc descriptionem epistolae duae P. 113. Cl. LOUIS, in quibus breuiter ad ea, quae Cl. LE CAT superius proposuit, respondet, suamque methodum a Nostri methodo omnino differre docet.

Quamquam autem Cl. LOUIS vberiore sententiae suae explicationem in commentario, mox prodituro, promiserat, eius tamen editionem Cl. LE CAT non expectauit; sed singulari aliquo libello statim ad duas hasce epistolas Cl. LOUIS respondit. Diuisus vero ille est in duas sectiones, in P. 117. quarum priore, quaenam in methodo Cl. LOUIS propria ipsi sint, disquiritur: in altera vero huius

Mm 5 methodi

* Ex praefatione huius voluminis patet, Cl. Auctorem hoc instrumentum nunc quoque ad calculi sectionem in foeminis adhibere.

methodi praestantia diiudicatur. Tria autem sunt quae Cl. LOUIS tanquam propria sibi tribuere potest: sectio scilicet colli vesicae in vniuersum, cum antea dilatationis tantum ope calculus eximebatur: porro incisio in vtroque latere facta: et tandem hoc, quod in vno eodemque instrumento vrethro-cystitumum et ductorem cannaliculatum coniunxerit. Docet vero Cl. LE CAT primo honorem inuentionis, aut restorationis extractionis calculi, quae sectionis, non dilatationis ope fit, non Cl. LE DRAN, sed sibitribuendum esse, aut Cl. LE DRAN et Cl. LE CAT vno tempore de

p. 122. hac re cogitasse. Deinde, quod ad duplicem sectionem attinet, tenendum est, GÜNZIUM, HEISTERUM, imo iam FRANCONEM ipsam duplicem vrethrae sectionem proposuisse, licet Cl. LOUIS sectio ad vesicam ipsam extendatur. Partes etiam, ex quibus instrumentum Cl. LOUIS componitur, ab aliis inuentoribus sumtae sunt, vt specillum fissum, in quo lithotomus mouetur, quod ad imitationem cannulae acus triquetrae, qua Cl. PETIT in curanda imperforatione anus utebatur, fabrefactum est: et lithotomus ipse, cuius figura cum alio lithotomo Cl. LE CAT perfecte conuenit. Hac quoque occasione Cl. Auctor specillum fulcatum describit, in cuius sulco apex lithotomi ita figitur, vt non ex illo elabi et partes alias laedere possit.

p. 145. (vid. Tab. V.) Altera sectio agit, de operatione et deligationis modo, quem Cl. LOUIS adhibet. Communicat vero primum descriptionem methodi Cl. LOUIS, quam ille ipse ad Cl. LE BLANC misit. Deinde, quae iam superius proposuit, de noxa vulnerum vesicae et de dilatatione et dilaceratione,

p. 160. sectioni praeferenda, fusius explicantur. In deligatione vulneris Cl. LOUIS cannula quadam utitur, quam in partem vrethrae sanam immittit, et cauum vaginae

vaginae linteo carpto implet, quo paries eius superior quodammodo eleuetur et labia vulneris ad se inuicem applicentur. Ostendit vero hic Cl. L E C A T, vsum cannulae in viris aequae, ac foeminis inutilem noxiumque esse, cum turunda sit durissima; atque loco eius, si calculus in plures minores partes diffactus sit, setaceum (*bandelette*) ex linteo molli confectum et oleo, siue digestiuo imbutum, vesicae per vulnus immittit, quae cannulae vsum praestat, noxisque eius caret. Modum quoque vaginam linteo implendi reicit, et docet cannulam hac ratione nunquam in situ firmo retineri posse. Hinc Cl. L E B L A N C cannula flexili vtitur et in vaginam intestinum suillum, siccatum et linteo carpto impletum, immittit.

Secundum huius collectionis volumen, vti superius iam adnotauimus, continet scripta, quae ad controuersiam, quae inter Cl. L E C A T et fratrem COSMUM, vt Auctorem lithotomi occulti, occasione huius instrumenti orta est, pertinent. Initium vero illius facit relatio de forma et fabrica, atque modo adhibendi illud instrumentum, quo nunc Cl. L E C A T in calculi sectione vtitur, de ductore scilicet canaliculato lithotomo (*gorgeret cislitome*), qui vel simplex est, vel ita fabrefactus, vt etiam dilatatorii vsum praestet. (vid. Tab. I.) Describitur vero primum vsus huius instrumenti in calculi sectione, quae in foeminis instituitur, in quibus nunc Cl. L E C A T illud loco prioris instrumenti adhibet: deinde ratio, qua in lithotomia virorum illo vtendum sit. Incisione enim per cutem et pinguedinem scalpello facta, apicem ductoris huius canaliculati in sulcum catheteris Noster immittit, et posteaquam in vesicam penetrauit, specillum retrahit, tuncque sectionem definitae magnitudinis efficit.

Ad.

T. II.

p. 10.

- p. 25. Adnexa est comparatio huius instrumenti cum aliis
similibus scalpellis occultis, vulgaribus, aut iis, quae
in herniotomia adhibentur, quorum omnium vsus
p. 35. definitur (Tab. II. fig. 4 — 9.). Adiecta quoque est
descriptio lithotomi cuiusdam occulti Cl. L E B L A N C,
chirurgi Aurelianensis (vid. Tab. II. fig. 10.), ab illo
ad calculi extractionem in viris excogitati.
- p. 49. Inter scripta vero, quae propius ad controuer-
64. siam fratris COSMI et Auctoris nostri pertinent,
primum est *descriptio lithotomi occulti et forcipis ad
confringendos calculos intra vesicam*, qualem illam
anonymus Auctor huius lithotomi in diario Verdu-
nenfi dedit *.
- p. 69. Sequuntur *litterae* Cl. L E C A T ad *Auctores*
diarii eruditorum super lithotomo occulto **: et lit-
p. 82. *terae* eiusdem Cl. L E C A T ad Cl. D * * *, quae
responsionem ad epistolas anonymi auctoris litho-
tomi occulti continent, atque hic quodammodo
p. 129. auctae et correctae iterum publicantur ***. His
addita est *epistola* Cl. L E C A T ad Cl. B * * *, vnum
ex auctoribus diarii eruditorum, quae quaedam ad-
p. 145. denda ad priores epistolas continet. Hanc exci-
piunt auctoris diarii Verdunensis expositio caussa-
rum, ob quas defensionem Cl. L E C A T diario illo
non inferuerit, et litterae cuiusdam D E M O M Y,
paullo iocosius scriptae, qui pacem inter Cl. Viros
L E C A T, L O U I S et fratrem COSMUM restituere
p. 152. cupit. In responsione Cl. L E C A T ad hanc expo-
sitionem et litteras D E M O M Y, pacificatoris, mul-
tum de in iustitia et partium studio Auctoris huius
diarii conqueritur.

Longe

* vid. *Recueil de pieces import.* T. I. p. I. Comment.
nost. supp. III. p. 546.

** vid. *Recueil* l. c. p. 51. Comment. nost. l. c. p. 547.

*** v. *Recueil* p. 113. Comment. nostr. l. c. p. 547.

Longe vero magis attentione dignus est, com- p. 171.
mentarius Nostri Auctoris, qui responsionem ad
duo Auctoris lithotomi occulti scripta continet, sci-
licet ad *iudicium ex iis, quae rem probant, repetitum*
(jugement tiré d'après les faits) * et ad eiusdem Au-
ctoris *animadversiones in commentarium Cl. LE CAT*
de situ aegri in lithotomia academiae Rothomagensi prae-
lectum **, de quibus superius ***. Praemissae vero
sunt litterae Cl. LE CAT ad censores horum libello-
rum Cl. PVZOS et FALCONET, in quibus de iis,
quae acerbius contra illum ibidem dicta sunt, con-
queritur, horumque Virorum Cl. ad hasce litteras
responsiones. In ipso vero commentario Auctor p. 193.
primum probat lithotomum occultum, quamvis
perfectior sit scalpellis occultis, ad herniotomiam
propositis, ad quorum formam fabrefactus est, ta-
men instrumentum esse periculosum et noxium.
Afferit archetypum lithotomi esse illud scalpellum
occultum, quod Cl. PHIBAUT ad herniotomiam
proposuit (vid. Tab. II. fig. 5.): Cl. porro CHAGNE-
RUN iam ante aliquot annos de applicatione hu-
ius instrumenti ad lithotomiam cogitasse, et fratrem
COSMUM tantum mechanisum manubrii, cuius
pe magnitudo sectionis definiri potest, et quem
amen ingeniosissimum esse ipse Cl. LE CAT agno-
vit, adiecisse. Deinde comparationem inter actio-
nem scapellorum occultorum et lithotomi huius,
et pericula, quae vulnera vtrisque facta comitan-
tur, instituit, docetque parietem vesicae postero-
rem, qui, vesica collapsa et corrugata, propius ad
vulnus accedit, lithotomo occulto facillime laedi,
etque mechanismo manubrii et regulis a fratre
COSMO

* vid. *Recueil* T. I. p. 154.

** vid. *Recueil* l. c. p. 231,

*** vid. sup. p. 547. et 548.

- p. 225. cosmo datis hoc infortunium auerti posse. Tunc ostendit exempla extractionum calculi, ope lithotomi huius feliciter peractarum, praestantiam instrumenti et methodi fratris COSMI neutiquam probare. Putat enim felices successus eius tanquam exceptiones, non, vt effectus huius methodi considerandos esse, et historias aegrotorum, a fratre COSMO propositas, omnes examinat. Tandem Cl. LECAT comparisonem inter successus felices suae et fratris COSMI methodi instituit, atque ex his quoque concludit, suam omnino huius methodo praeferendam esse. In additamento probat acum triquetram incuruam, quam frater ad punctiōnem vesicae in hypogastrica regione proposuit * non nouum esse instrumentum, sed Cl. DENIS, BELLOQUE et FOUBERT similia fere proposuisse.
- p. 298. Inter scripta vero, quae ad controūersiam de optimo situ aegri in lithotomia spectant, primum est epitome *commentarii anonymi auctoris lithotomi occulti*, in quo horizontalem situm optimum esse proposuit **. Sequitur *commentarius* Cl. LECAT, in academiae Rothomagensis conuentu praelectus, quo consuetus situs defenditur ***, quem EIVSDEM V. Cl. *responsio ad animaduersiones anonymi in hunc commentarium* **** excipit, in qua primum demonstrat, situm horizontalem iam multos alios ante fratrem COSMUM commendasse, neque inter com-
- p. 331. moda lithotomi occulti referendum esse. Deinde de ipsius huius situs praestantia verba facit, docetque in omni operatione chirurgica corpus aegri ita collocandum

* vid. *Recueil* l. c. p. 202. et *Comment. nostr. supp.* III. p. 547.

** vid. *Recueil* p. 186. *Comment. nostr. ibid.* p. 547.

*** vid. *Recueil* p. 212. *Comment. nostr. ibid.* p. 548.

**** vid. *Recueil* p. 231. *Comment. nostr. ibid.* p. 548.

locandum esse, vt pars, in qua operatio fieri debet, chirurgus se eo modo offerat, vt tuto et facile sectionem instituere et omnem operationem absolueret possit: porro situm corporis, quantum quidem fieri potest, egressum et extractionem corporum extraneorum per vulnus promoueri debere: tandemque in calculi extractione ex vesica, illam eum situm obtineri debere, vt commode incidi vesica, calculusque prehendi et extrahi possit, sine laesione aliarum partium. Ex quibus quidem momentis, quae per consuetum aegroti situm obtineri asserit, praestantiam eius prae horizontali situ demonstrat, in quo calculum saepe in posteriorem partem fundi vesicae delabi et forcipis actionem effugere demonstrat. Atque cum Auctor lithotomi occulti sibi persuadeat horizontali situ pressionem intestinorum in vesicam minui sic, vt nullae rugae exinde oriantur, aut paries posterior facile laedi possit; Cl. LE CAT contrarium probare annititur, et ostendit, vesicam tamen in rugas contrahi, et, calculo posterius descendente, periculum et difficultatem extractionis vehementer augeri, quod variis dimensionibus pelvis et vicinarum partium magis declarat, variosque errores aduersarii perstringit.

Adiecta est huic commentario *relatio de variis p. 392. experimentis, in cadaueribus lithotomo occulto* per Cl. LE CAT institutis, quae usum huius instrumenti periculose esse luculenter probant. Proponit tamen Cl. Auctor modum quoque correctionis instrumenti et operationis fratris COSMI. Clauditur p. 409. tandem hoc volumen variis scriptis, epistolis et testimoniis, quae veritatem nonnullarum rerum, in ipso opere propositarum, probant. In tabulis aeneis praeter instrumenta varia, situs partium in pelvi vario modo, satis apte, delineatur.

Tertium

T. III.

Tertium tandem huius collectionis volumen contra additamentum ad collectionem scriptorum fratris COSMII, quod alterum volumen collectionis illius constituit * directum est. Continet vero primum quinque epistolas, in quibus Cl. LE CAT

P. I. 17. 33. propositas, defendit, et in tribus potissimum prioribus ostendit, omnino euentus operationum, lithotomo occulto peractarum, minime felices fuisse.

p. 49. Quarta epistola litteras Cl. VANDERGRACHT, de infelici successu eiusmodi sectionis continet, atque felicem successum operationum Cl. LE CAT

p. 65. defendit. Quinta tandem probatur plures chirurgos celeberrimos methodum Cl. LE CAT sequi.

p. 1. His addita est epistola alia Cl. LE CAT, qua relationes quaedam, quas de libro eius auctores diarii eruditorum huic diario inseruerunt, examinantur, atque illos minime sine omnium partium studio in hac re versari probatur.

Epistola tandem Cl. LE CAT ad Cl. DUMONT filium de calculis ad vesicam adhaerescantibus agit, atque potissimum contra libellum Bruxellis, occasione mortis aegri, in quo calculi sectio ope lithotomi occulti facta est, editum, directa est. Hinc ab initio ad varia alia respondet, quae in vniuersum ad hanc circa lithotomum occultum et varias operationes, mediante illo factas, pertinent. In ipsa vero

p. 21. dissertatione docet, sententiam de vera adhaesione calculi ad vesicam et rationi et experientiae contrariam esse. Vera enim adhaesio aut cohaesio partium, vel propter homogeneam duorum corporum naturam, vel compressione fluidi cuiusdam vniuersalis v. c. aeris, vel ope substantiae cuiusdam intermediae v. c. glutinis, vel mutua infertione diuersorum corporum (*entrelassement*) fieri solet. Haec


vero

* vid. Comment. nostr. Supp. III. p. 548.

pro omnia in coniunctione calculi et vesicae locum non habere pluribus demonstratur. Hinc nulla haesio existere potest, sed calculus tantum in vesica, aut ob nimiam magnitudinem, aut ideo retinetur, quoniam sacco, aut loculamento (poche) inclusus est. Oritur vero eiusmodi loculamentum, vel duplicatura tunicarum vesicae, si calculus, per iterum descendens, eo in loco haeret, ubi venter per duplicaturam tunicarum oblique transit: quo casu tumor, vel ad vesicam, vel ad abdominis vitum percipitur, ubi nulla excussio fieri potest: vel tunica vesicae tantum interna formatur. Quodsi enim illa hinc inde inflammatur, et in supurationem abit, tunc loca haec, cicatrice nata nullam amplius extensionem permittunt. Cum vero nec in vicina sana parte locum habeat, eiusmodi sacci formantur, in quos calculi parvi se intromittunt, et incrementa ibidem capiunt, aut in iis urina stagnante oriuntur. Nonnunquam etiam, vesica fungosis excrescentiis repleta est, calculi pro illos haerent, nunquam vero cum iis concalescunt. In altera sectione plura Cl. Auctor loca et observationes scriptorum aliorum commemorat, atque ex iis omnibus ostendit, calculum nunquam cum vesica concrefcere, sed semper in cystide parva, aut intra fungos reconditam esse, qua occasione plures adnotationes ad Cl. HOUSTET super hac re commentarium proponit *.

p. 34.

* vid. *Mem. de l'Acad. Chirurg. T. I. p. 395.*



XXVIII.

Raccolta de principali maravigliosi effetti della
Cavata di Sangue nel corpo animale con-
frontati con diverse riflessioni raccolte da
piu insigni medici e Notomisti tanto antichi
che moderni, utili a chiunque desidera d'esser
beneficato e non pregiudicato dall' uso odier-
no di medicare; da G I A N - A N T O N I O
V A N U C C I, Dottore di Medicina e di Filo-
sopia, in Genova presso Bernardo. Tarigo
1755. 4. pl. 14.

h. e.

Collectio praecipuorum et mirandorum effe-
ctuum sanguinis missionis in corpore ani-
mali, comparata cum diuersis celeberrimo-
rum antiquorum et recentiorum medicorum
et anatomicorum sententiis. Auctore IO-
A N T O N I O V A N U C C I.

Cum Cl. Auctor abusum venaesectionis in variis
morbis cognosceret, simul tamen de egregio
vfu huius auxilii persuasus esset, libellum hunc eo
modo adornauit, vt, praemissis nonnullis propo-
sitionibus, naturam sanguinis et circulationis humo-
rum concernentibus, in viginti quatuor aphorismis
sententias auctorum, qui venaesectioni et saepe ni-
mium fauent, proponit, et de iis iudicium fert,
adscitis aliis celeberrimorum virorum opinionibus.
Cum vero haec cuncta ordine recensere superfluum
esset, quod Auctor tantum generales nimis propo-
sitiones aliorum limitet, sufficiat, quaedam exem-
pla commemorare, ex quibus idea libelli satis ap-
parebit.

Sanguinis

Sanguinis missio ad abundantiam huius humo-
is spectat; quamobrem medicus aegrum suum hoc
poso auxilio a periculo sufflaminati humorum mo-
us, rupturae venarum et abolitione sensus et mo-
us liberat. Spirituosae enim sanguinis partes, ab
uius nimia quantitate suppressae, magis liberae
unt, ideoque omnes actiones liberiores reddunt.
Recte vero monet Noster plenitudinem hanc non
n uniuersum periculosam esse, nimiam etiam san-
guinis missionem crasin eiusdem deteriorem redde-
e, humorum copiam, per varias causas in corpo-
bus auctam, quotidie etiam per secretiones dissi-
ari, et perspiratione sola multos humores exi-
e, qua ideo praesente, plethora vltra modum
ix increfcit, hinc cum vasa cedant, finistros il-
os effectus a qualibet abundantia non timendos
sse.

Quanquam ex vena et bonus et corruptus san-
guis simul fluit, nonnulli tamen correctionem
massae relictæ ideo fieri asserunt, quod emissa, par-
e quadam corrupta, motus sanguinis ad veras le-
es circulationis reducuntur, per quos eius corre-
io fit. Vrget autem Noster non tantum partem
orrupti, sed vim boni sanguinis quoque diminui:
uod si igitur minor portio corrupti euacuatur,
amnum inducitur, si aequalis sani et corrupti san-
guinis portio subducitur, inutilis est eius missio;
nc in eo tantum casu, vbi corrupti sanguinis co-
a maior emittitur, concedenda esset. Quilibet
ro cognoscit, haec cuncta circulationi et mixtio-
i sanguinis non respondere.

Sed hanc mixtionem mutari porro asserunt
nnulli, quod post euacuationem motus et ideo
oque situs et nexus minimarum particularum mu-
tur, quæ mutatio secretionibus fauet, quam-
rem in morbis facta sanguinis missio aegrum,

aut sanum reddit, aut ad sanitatem postea acquirendam disponit. Noster vero monet, concessa etiam particularum post venaesectionem mutatione, eam non semper in bonam, sed etiam in malam partem inclinare, et ideo morbos excitare, vel augere, inprimis cum mixtionis ratio in aegris non cognoscatur.

P. 34.

Postquam de venaesectione, resolutionem crudarum et viscidarum particularum adiuuante, variis disputata sunt, asseritur, sanguinis missionem motum huius humoris intendere, ex ea causa secretionem liberiores reddere, atque correctionem humorum necessario sequi. Si enim, resistantia sublata eadem vis impellens manet, celeritas augetur, et ideo resolutio sanguinis deprauati et transitus per organa secretoria liberior fit. Sed Cl. Auctor, qui semper spirituosas particulas, ut causas motus sanguinis assumit, ex hac ratione illas diminutas iudicat, et celeriores motum negat, porroque ostendit, motum progressivum per venaesectionem non vndique promoueri.

P. 43.

In febribus omnibus venaesectionem suadendam esse, nonnulli autumant, contrarium tamen variis testimoniis euincit Auctor, quod etiam ratione haemorrhagiarum monendum est, in quibus impulsus ad locum affectum imminuit quidem interdum

p. 70.

non tamen absolute. Diminuta sanguinis quantitate, spatium vasorum augeri, quo facto coagula et congestiones tolli posse nonnullorum opinio est; vas vero non depleta et vacua manere, sed successiuè se constringere et hac ex ratione mutationes commemoratas succedere, Noster vrget.

P. 78.


Sanguinis missionem turbidam, impuram et terrestrem magis sanguinis partem subducere, hancque rem variam faciem sanguinis in vas planum immitti declarare multi arbitrantur. Hanc opinio-

ner

nem Cl. Auctor impugnat et varias observationes medicorum addit, qui fallax iudicium ex sanguine venoso sumi contendunt. Et omnino certum est, collectam in vasis sanguinis venosi partem naturam et indolem in venis relictam non semper accurate definire. Et grumofum sanguinem, qui polyposis concretionibus ansam praebet, per venaesectionem, ita subduci, ut minima vasa ab obstructione, inde timenda, liberentur, falso assumitur: tenendum enim est, concretiones molecularum magis fieri in sanguine, ex vena misso, neque tuto ad crasin sanguinis moti concludi inde posse.

Quod sanguinis missio venosum sanguinem p. 83. tantum subducit, multi credunt, inutilem tantum et spirituosum, ut dicunt, et gelatinosum ad motum et nutritionem aptis particulis eum destitutum esse, ideoque ex sanguinis missione nullum damnum corpori induci posse, sed Noster vrget, sanguinem venosum particulis spirituosum non prorsus carere, et relictas etiam partes saepe non tantam vim habere, ut viuiam et sufficientem vim in mouendo reliquo sanguine exercere queant.

Sed subsistamus in his breuiter indicatis, cum satis appareat, nec in opinionibus falsis de venaesectionis auxilio, nec in discussione earundem ad veram solidorum et fluidorum corporis humani indolem, nec in se, nec in mutua relatione respicere eos, qui de effectibus sanguinis missionis iudicant. Nihil certe venaesectionis abusus, qui a Nostro impugnatur, experientia sola non restringitur, nisi ratio hanc experientiam definiat et confirmet.



XXIX.

IGNATII GERVASII a Montefalisco Medici
Romani de usu frigidae in haemoptysim et
quodcunque sanguinis profluuium Diss. me-
chanico - physica ad Illustrissim. et Reueren-
dissim. D. Ianuarium de Simone vtriusque
signaturae Referendarium etc. Romae 1756.
ex typogr. Io. Zempel 4. pl. 14½.

- L**audabile aequae ac necessarium iuniorum me-
dicorum studium, lectio nimirum HIPPO-
CRATIS, Nostro haec scribendi dedit occasionem.
Cum enim in libro eius epidemiorum quinto il-
lum felicem morbi valde complicati, quo labo-
rabat vxor Gorgiae, solo usu aquae frigidae legeret
euentum, vltius inquirere instituit in vim frigidae
ac praecipue quidem in eius efficaciam haemorrha-
giarum variarum sedandarum. Breuiter itaque hi-
storia morbi narrata, quae breuius haemorrhagiam
vterinam, febrem ardentissimam, neruinas conuul-
siones et molam continet, indagatur Noster, quo
modo haec omnia a frigida aqua praestari potuerint.
Omnia enim sunt sedata et mola promota est. Qui-
bus explicatis, quaestionem mouet: num aqua fri-
gida, HIPPOCRATICUM remedium in vterinis
haemorrhagiis, etiam in sputo sanguinis et alia cruo-
ris effusione tuto possit adhiberi?
- p. 23. Effecit igitur analogiam mechanico physicam
historiae HIPPOCRATICAE, iamiam commemora-
tae, demonstrauique usum frigidae, nec rationi
nec antiquati, nec experientiae contrariari. Ac
p. 26. primum quidem sanitatis omnino haec ratione et
circulo sano sanguinis explicato, in causas inquit
haemorrhagias efficientes, quae partim in solidor-
um peruersitate, vbi de laxitate et rigiditate nimia
vasorum

vasorum differit, partim in fluidorum vitio, quod
 potissimum ponit in acrimoniis, ac inprimis qui- p. 32.
 dem in alcalina, quaerit. Modum praeterea at-
 que rationem perquisiuit, qua vasa percissa post p. 37.
 sanguinis eruptionem resiliant atque coalescant.

Quibus peractis, perpendit, num aqua frigida
 haemorrhagiis eorumque causis consulat et vasis
 percissis medeatur? Requirat autem tria adhuc p. 40.
 ad vim aquae frigidae efficaciorē reddendam: vi-
 tum nimirum tenuissimum eumque frigidum, seu
 subfrigidum, repetitas venae sectiones et tandem
 animi et corporis quietem, quibus auxiliis cuilibet
 haemorrhagiarum causae resistere posse aquam fri-
 dam Noster arbitratur. Quae enim simul sumta,
 partim solidorum laxitatem atque rigiditatem mu-
 dando, quo facilius motum fluidorum possint susti-
 nere, partim sanguinis acrimoniam resoluendo, quo
 vasa non ulterius erodantur, partim sanguinis co-
 agulam imminuendo, quo nimius fluidorum motus
 cedat, et tandem animi et corporis quietem con-
 ciliando, ne ideae variae animi et inquietus corpo-
 ris motus sanguinem exaestuēt, efficiunt, ut vel
 vulneratae partis cicatrix coalitione externe forme-
 tur, vel disruptum vasculum interne obducatur. Id
 quod ut theoretice demonstrat, sic et exemplis il-
 lustrat tum veterum, cum recentiorum.

Quod ad veteres attinet, praecipua ex HIPPO- p. 47.
 CRATE desumpta sunt insimulque ad ea respondit
 Noster, quae in eo contra usum aquae frigidae oc-
 currere videantur. Exemplo sit illud: *frigida quasi* p. 61.
ix et glacies pectori inimica, tusses mouet, sanguinis
profluuium et destillationes. Sed hic usum aquae fri-
 dae non interdixisse HIPPOCRATEM, sed nimis tan-
 tum frigidae et algentis, patere Nostro videtur ex
 his locis, ubi legitur: *qui sanguinem vomunt, si sine*

febre accidat, salutare est, si cum febre, malum. Curatione vero refrigerandi et adstringendi vim habentibus perficitur; et alio loco; quae frigefaciunt, fluere prohibent. Dein et alios laudavit Noster veteres pari-

- p. 67. ter, ac recentiores auctores, CELSUM, ARETAEUM, PAULUM AEGINETAM, AETIUM, et inter recentiores ANTONIUM ET VERGILIUM COCCHI, PETRUM ANTONIUM MICHELOTTI ET MARTINUM CHISI, qui omnes usu frigidae non solum haemorrhagias, sed etiam capitis dolores, rheumatismos, arthritidem, oculorum hebetudines, epilepsiam, tremores, convulsiones, sudores ac omnes omnino inanitiones et immoderatas corporis excretiones, partim penitus curarunt, partim quodammodo iuvarunt.

- Quapropter, nec incertum, nec periculosum, nec temerarium Nostro hoc videtur esse medellae genus, quod optimorum clinicorum veterum aequae, ac recentiorum, qui felicissimos huius medellae eventus literis suis mandarunt, auctoritate, experientiaque nititur, nec theoriae contrariatur; seu (ut cum Nostro loquamur) quod nec rationi, nec antiquitati, nec experientiae repugnat. Tandem p. 79. varias collegit Noster haemoptoicorum curationes per aquam frigidam, quae partim ipse vidit, partim a Cl. IOS. MARIA SPERANZA nosocomii sancti spiritus medico, cum eo communicatas, accepit. Sunt tredecim morborum historiae, quarum sex Cl. Auctoris, reliquae SPERANZAE antea commemorati, ubi felici cum successu, aqua frigida simul cum saepe iteratis venae sectionibus, victu parco et quiete tum animi, cum corporis interne et externe adhibita est. Interne parum aquae, sed frequenter exhibuit, externe spongas, aqua frigida imbutas, applicuit et, sedata quodammodo haemor-

hemorrhagia, nonnullis lac et ad leniter nu-
tendum, et ad salinam sanguinis acrimoniam in-
fluendam dedit.

XXX.

theses anatomico-chirurgicae de hernia incar-
cerata. Praeside M. RAPHAELE - BENE-
VENTO SABATIER. Lib. art. et chir. Ma-
gistro et Reg. Chir. Acad. socio. Responden-
te *Thomas Coste*, Parisino Art. lib. Magistro.
Parisiis typis viduae Delaguette 4. 1757.
pl. 1.

Continet haec dissertatio omnem de herniis
incaeratis doctrinam, breuiter quidem, sed
elegantius propositam, recentioribusque chirurgo-
rum Gallicorum inuentis auctam, ita vt omnia
quae hac de re scripta sunt, in ea compre-
endantur. Enterocelen autem primum Cl. Au-
tor considerat, de cuius repositione monet, in ea
maxime cauendum esse, ne caput puluinaribus ma-
is, aut minus, quam par est, eleuetur. Si enim
epressius est, muscoli sterno-mastoidei et recti ab-
dominis contrahuntur: si vero sublimius, collo ni-
is inflexo et compressa aspera arteria, respiratio
et repositio quoque herniae impeditur. Situm
vero a Cl. SHARP * propositum, in quo aeger in-
uerso capite, femoribusque sursum eleuatis, ali-
quamdiu continetur, absque successu aliquoties
adhibitum fuisse, Cl. Auctoris est obseruatio. In
herniae sectione semper saccum aperire Noster

p. 2.

p. 3.

Nn 5

iubet,

* vid. *Enquir. of Surgery* p. 23. Comment. nostr.
sup. III. p. 531.

- iubet, etiam in herniis minoribus et recentioribus, in quibus Cl. PETIT saccum vna cum contentis partibus in abdomen reponebat. Annuli dilatationem in inguinali hernia Cl. GARENGEOT versus lineam albam, Cl. vero DE LA FAYE versus ilei spinam instituere notum est. Putat vero Noster illam versus utramque partem sine ullo periculo celebrari posse, cum epigastrica arteria in inguinali hernia supponatur et instrumentorum acie non attingi queat. De hernia gangraenosa potissimum Cl. LOUIS monita Auctor proponit, tandemque de epiplocele et hernia vesicae inguinali breuiter agit. Tunc ad cruralem herniam, exomphalum, ventralem et herniam foraminis oualis progreditur et differentias in hisce speciebus, a diuersa locorum natura deducendas, exponit. Quae vero omnia cum Lectoribus satis iam cognita sint, sicco pede transimus.

XXXI.

Thef. Anat. et chirurg. *Vtrum, cataractae tutior extractio forficum ope?* Praeside IOANNE LE BAS Art. lib. et chir. Magist. Respondente Henrico Dauiel Massiliensi, Art. lib. Magist. Nosocom. Castrensis. Regisque exercitus Chirurgi primarii, Adiutor. Parisiis typis viduae Delaguette 1757. 4. pl. 2¹/₂.

- Praemissa est brevis fabricae oculi descriptio, in qua b. ZINNIIUS Gottingensium quondam Professor longe meritissimus, vbi de eiusdem descriptione oculi sermo est, sub nomine Cl. GOTTFRIED, quod praenomen eius est, citatur. Deinde de cataracta in vniuersum Cl. Auctor disserit, lentem-

ntemque crySTALLINAM aliquando in ea perfecte durari, probat obseruatione Cl. MORAND, qui museo suo humorem vitreum osseum fere, cum crySTALLINO propemodum petrefacto, seruat. Cataractam, a fulgure viginti quatuor post ictum horas subito ortam in foemina nobili fuisse, Cl. Praefidis est obseruatio. Confirmat Auctor patris sententiam, ad operationis felicem successum minime requiri cataractae, vt vulgo loquuntur, maturitatem, sed solam coecitatem, in qua aegrotantes praeter lumen et colores nihil vident, operationem iam indicare. Nimiam remediorum multitudinem, qua pharmaceutica via cataractae curationem medici nonnulli moliuntur, noxiam saepius esse contendit, solamque operationem, tantum certissimum remedium proponit. Ex curationibus vero cataractae, quae manu fiunt, de P. 12. extractione, a patre respondentis proposita, tantum sic disputatur.

Hanc alii, vt Cl. LA FAYE, POYET, SHARP, ENON et quem acriter Noster perstringit, eiusque hamulum et volsellam, vt nociua reiicit, Cl. BERENGER, * forficum vsu remoto, scalpello tentant, alii Cl. DAVIEL patrem secuti, forficibus, modo hic fusius descripta, instituerunt. In lentis magnitudine nimia ipsam pupillam iridis, sectione facta, dilatare iubet, qua sectione symptoma, quae ex dilaceratione eius oriuntur, vitantur. Forficum vero vsum instrumentis secantibus praerendum esse ex eo Auctor Cl. probat, quod se- P. 15. tantia instrumenta non describant lineam semicircularem in coniunctione corneae cum sclerotica et superficiem conuexam et bulbi inuoluntarias agitationes: Deinde, quod corneae sectio difficilis et imperfectius fiat, et post humoris aquei effluxum

* v. Commentar. nostr. Vol. X. p. 518.

effluxum, qui primo punctiōnis tempore accidit. iris saepe laedatur. Tandemque, quod, cochlear deficiente, in plurimis methodis, saepe parva frustula lentis aut capsulae remaneant, et dictas methodos cicatrix inaequalis et staphyloma saepius sequantur.

p. 17.

Addit punctiōnem a latere secantibus instrumentis difficulter institui: sinistrae manus usus requiri, quae non in omnibus perfecto labori apta sit: manum operatoris vacillare posse, atque saepius corneae sectione scalpelli ope facta, partem vitrei humoris vna cum cataracta prorumpere, ob nimiam musculorum bulbi contractionem determinatam ab instrumento in corneam traiecto, cuius vi antrorsum oculus attrahitur, operantis adhibito conatu, partis ut inferioris corneae sectio conficiatur. In Auctoris vero methodo semper dextra manus tantum sufficit, quae probe fulcita est. Cornea quoque apte inciditur, et instrumenta, si necessitas vrget, eximi iterumque immitti possunt, ita ut nulla laesio iridis extimescenda sit, et perfectior fiat cicatrix.



XXXII.

De methodis amputandi brachium in articulo.
Theses anatomico - chirurgicae. Praefide
STEPHANO PETRO LE LAUMIER Art.
Chirurg. Magistro, Respondente *Francisco*
Poyet, Claromontensi, Art. lib. Mag. et no-
focomii Regii Charitatis Chirurgo praeci-
puo. Parisiis. Typis P. Al. le Prieur 1759.
4.pl. 1¹/₂.

Initio dissertationis huius Auctor Cl. humeri cum
scapula articulum, musculos et vasa considerat,
et ex hac partium in humeri amputatione ex arti-
culo discindendarum descriptione, varias regulas
in hac operatione obseruandas proponit. Diuersi-
tas vero methodorum extirpandi humerum posita p. 6.
est in ratione, qua ligatura vasorum axillarium et
sectio musculorum instituitur. Has ex Cl. LE DRAN,
GARENGEOT et DE LA FAYE scriptis, Cl. POYET
proponit, tandemque historiam operationis, qua
ipse noua methodo in puella quatuordecim anno-
rum ob cariem ossis humeri illud ex articulo excidit.
Sectionem scilicet secundum longitudinem deltoidis in- p. 9.
stituit, partem ossis humeri, carie disiunctam, extrahit;
labia vulneris superiora, ex utroque latere a circum-
ferentia articuli scalpelli ope separat: tum capsulam
diuidit transuersim versus partem posteriorem progre-
diendo; statim scalpellum conuertit, et pone bicipitis
tendinem articulare pellit, foras educendo, ut resece-
tur; diuisione fauente digitos in articulum iniicit, ca-
put humeri arripit et omnino separat, laterales remouen-
do adhaesiones mediante scalpello; atque cognita et di-
gitis compressa arteria axillari, brachium sectione or-
biculari, quatuor digitis infra articulum aufert, atque
deinde

deinde ligaturam vasorum et deligationem instituit.

In vniuersum autem in hac amputatione ligaturam externam vasorum, vt inutilem reiicit, et internam tanquam magis certam et faciliorem commendat. Scalpelli quoque vulgarem caeteris instrumentis ad amputationem hanc aptiorem esse iudicat. Methodum a Cl. GARENGEOT propositam, qua brachii amputatio in articulo vnica et circulari sectione fit, plane reiicit, cum maiora naturae conamina requirat ad cicatricem, quam omnes aliae methodi. Ex reliquis vero methodis illam, quam Cl. DE LA FAYE proposuit, praefert. Suam tandem methodum ideo imitandam esse contendit, quia sectionum et segmentorum numerus in ea imminutus sit. Atque cum porro in ea segmentum sit vnicum, et capsulam in orbem complectatur, sectioque longitudinalis in parte carnosa deltoidis instituatur, denique in ea nulla duplicatura cutis et carni fiat, non solum cicatrix celerius inducitur, sed et pus bene effluere medicamentaque cauo glenoideo applicari possunt, ita vt omnino haec methodus attentione et imitatione aliorum chirurgorum digna sit iudicanda.



Contenta in hac parte.

GINANNI Opera postume Tom. secundo	p. 387.
LE ROI de aquarum mineralium natura et vfu	389
BÜCHNER Diff. de noua methodo surdos reddendi audientes	398
WINKLER de ratione audiendi per dentes	403
DE HALLER Diff. sistens experimenta circa corpus callosum, cerebrum cet. in animalibus viuis instituta	405
OEDERI Diff. de irritabilitate	407.
I. FABRI sulla insensitiuita et irritabilita Hal- leriana opuscoli di vari Autori, raccolti. Tom. I. et II. cum suppl.	409
II. COE a Treatise on biliary concretions	423
WIPPACHER genuina ratio, cur, pleuritide vera sueuiente, venaesection affecti lateris	433
LOVIS Memoire sur une question chirurgicale relative a la jurisprudence	435
EXTON a new and general system of Mid- wifery	436
I. GRVNER <i>die Eifsgebürge des Schweizerlan- des</i>	438
II. BURTON an Essay towards a complete new system of Midwifry	456
V. EIVSDEM a lettre to WILLIAM SMELLIE containing critical and practical remarks uppon his Treatise of Midwifry	461
V. OSBECK Dagbok ofver en Ostindisk Resa etc.	462
VI. SCHVLZ Berattelse om Koppers ympande	478
VII. SCHEVCHZER Diff. de alimentis farina- ceis	483
VIII. PVZOS Traité des Accouchement etc.	485
XIX. FAR-	

XIX. FARMER Select. Cases in Surgery	p. 506
XX. HEISTERS <i>medizinisch, chirurgische und anatomische Wahrnehmungen</i>	507
XXI. POTT Observations on the disorder of the corner of the Eye	510
XXII. Institutes of experimental Chymistry	514
XXIII. HEATH a natural and historical Account of the Islands of Scilly	526
XXIV. PERRY a mechanical account and Explication of the hysteric passion	528
XXV. SHARP a critical enquiry into the present state of Surgery	530
XXVI. Recueil de pièces importantes sur l'operation de la taille faite par le lithotome caché etc.	544
XXVII. LE CAT Pièces concernant l'operation de la Taille. Recueil. I. II. III.	550
XXVIII. VANVCCI Raccolta de principali Effetti della cavata di sangue	562
XXIX. GERVASI de usu frigidae in haemoptysin etc.	566
XXX. SABATIER Diff. de hernia incarcerata	569
XXXI. LE BAS Theses: vtrum cataractae tutior extractio forcicis ope?	570
XXXII. LE LAVMIER Diff. de methodo amputandi brachium in articulo	573

